



होमियोपैथिक

६५२८

# पारिवारिक चिकित्सा ।

द्वितीय संस्करण ।

होमियोपैथिक चिकित्साकी अत्युत्कृष्ट पुस्तक ।

श्रीमहेशचन्द्र भट्टाचार्य एण्ड को० द्वारा

संगृहीत और प्रकाशित ।

नं० ११ बनफोर्ड लेन,


कलकत्ता ।

[All Rights Reserved]

सं० १२६८ ।

२०००-२५-७-१४.

दाम ७ वारह आने ।



11/25/2011

[illegible]

(Similia Similibus Curentur) होमियोपैथीका बीज मन्त्र भारत और चीन देशमें उद्धारित हुआ था, परन्तु अभी केवल एक ही मदी (मतादि) हुई है कि महात्मा हनिमानने प्राणपणसे चेष्टा करके हमका माधन और प्रचार किया है तथा चिकित्सा जगतमें एक नवयुगका प्रचार कर दिखाया ।

**हनिमान कौन थे ?**—होमियोपैथीक प्रवर्तक मैसुधल हानिमानका जन्म सन् १७५१ ईस्वीमें जम्बूनी देशमें हुआ था । उन्होंने बड़े कष्टसे निखना पठना भीखा और ग्रीक, हिब्रु, फारसी, मैटिन, फारसि, जम्बूनी, इंग्रजी इत्यादि भाषा तथा चिकित्सा और रसायन विद्यामें पूर्ण पण्डित हो गये । १७८० ईस्वीमें कालेनके निरि कुप "मेटेरिया-मेडिका" नामक ग्रन्थ पतुवाद करने समय महत्ता उनके हृदयमें यह नवीन भाव उदय हुआ कि कुदनाइन सुख शरीरमें ज्वर पैदा करता है तथा उसी प्रकार ज्वरघ भी है । हृदयके इस भावको उनकी आपसी "ममः ममं ममयति" वाली राह पर लाया । इसके बाद छ. वर्ष पर्यन्त उन्होंने नाना प्रकारके ग्रन्थ, भूयोदर्शन, गरलविज्ञान इत्यादि अध्ययन करके और नाना प्रकारके विषोंको स्वयं सेवन करके यह निश्चय कर लिया कि "होमियोपैथी सत्यताके चटल पर्यंत पर प्रतिष्ठित है—यह कल्पना या अनुमान झूठा नहीं हो सकता । १७८६ ईस्वीमें उनके इस नवीन मतका प्रचार होते ही चारों ओर खुसखुशी भी मच गई । मत्वानुरागी कई एक वैद्य

उनके शिष्य हुए। तथा उनी तरह और चिकित्सक तथा नीच प्रकृतिवाले वैद्य डाक्टर उनके घोर विद्वेपी होगये। १८२१ इस्वीमें जर्मन कुलतिलक निर्वामित होगये सही परन्तु उस वीरहृदयकी दुर्दम उद्यम वलौ ठग्लौ नहीं हुई। जीवनके अवशिष्ट दारह वर्ष उन्होंने जिन कष्टने फ्रान्समें काटा था, जिन प्रकारसे वहां हजारों कठिनसे कठिन रोग चारोग्य किये थे, उन यश और कीर्तिकी ध्वजा समस्त मध्य देशमें व्याप्त हो गई। २री जुलाई मन् १८४३ इस्वीमें मद्रास—विधानाचार्य यहांके महाव्रतका उद्घाटन करके अमरधामको चले गये।

१८५१ इस्वीमें उक्त महापुरुषके देशके लोगोंने उनकी लीलाभूमि "लिपजिक" नगरमें उनकी पीतलकी मूर्ति स्थापन करके अपने पूर्वकृत अपराधका कुछ प्रायश्चित कर डाला।

**दिग्विजय अथवा होमियोपैथीका विस्तार—**

लोक हितैषी हानिमान आप धन्य हैं! आपने व्याधिविमोचनका यह उपाय निकालकर जैसा जनममूहका उपकार तथा कल्याण किया है उनकी याद आते ही कौन ऐसा पुरुष होगा जिसके हृदयका उच्चास बड़े वेगसे आपके श्रीचरणोंकी ओर न दौड़े। आज जर्मनी, फ्रान्स, आस्ट्रिया, इंग्लैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया इत्यादि सभी आधुनिक सम्यदेश समूहने आपकी चिकित्सा प्रणालीकी शिर भुक्ताकर ग्रहण कर लिया है। एक युक्तराज्य अमेरिकाहीमें १०२ अस्पतालों में सबसे कम ६ हजार रोगी आश्रय पाकर आपही की जय

घोषणा घोरनादसे कर रहे हैं। राजेन्द्रनाथ दत्त, इंग्लैण्डमें रहनेवाले भारत मन्त्री सभाके सदस्य मैयद हसनविन्पार्थी, डाक्टर बेरनी, बहासी मास्त्रके गौरव श्रीमहेन्द्रनाथ मरकार, अद्वैतपद ए भूनाथ—बाबा—( ईशापन्थी ) इत्यादि समाधारण पद्मवन्माथ गुप्तमें पाञ्च बंगदेशके प्रत्येक गांव घोर नगरमें तथा भारतके नाना स्थानोंमें तुमारी ही जयपताका फहरा रहे। • चौपध निर्वाचनकी जैसी सुगम घोर मराल गह पापने दिखाई है, उसके निधे वर्तमान घोर मविष्यतके सभी लोग मदा मधेदा पापके निकट कृतघ्नताके फन्देमें बंधे रहेंगे।

[illegible]

## सूची-पत्र ।

### १ । उपक्रमणिका ।

#### होमियोपैथी ।

होमियोपैथी क्या है—	१
होमियोपैथी कितने दिनकी है—	१
हनिमान कौन थे—	२
होमियोपैथीका विस्तार—	३

विषय ।	पृष्ठा ।	विषय ।	पृष्ठा ।
--------	----------	--------	----------

### औषध प्रस्तुत प्रकरण । औषध प्रयोग प्रकरण ।

भेषज और भेषजबह	१	औषध किस तरह रखना	
औषध दो तरहके	१	चाहिये ?	४
विचूर्ण ...	१	औषधका प्रयोग किस तरह	
घरिष्ट ...	२	खिलाना चाहिये ?	५
क्रम ...	२	क्रम निरूपण ...	५
निम्न, मध्यम और उच्चक्रम	३	औषधकी मात्रा	६
एकबुंद औषध इतना फायदा		औषधि कितने कितने देर	
करनेवाला क्यों है ?	३	पर देना चाहिये	६
शक्ति नहीं क्रम	४	औषध प्रयोगके सम्बन्धकी	
		कई बातें	६



विषय ।	पृष्ठा ।	विषय ।	पृष्ठा ।
शानुपट्टिक चिकित्सा	७	२ । शोणित रोग ।	
रोग भक्षण और औषध		हैजा	१०
निर्द्वाचन ।		माघातिक हैजा	१८
रोगका भक्षण कहनेसे		सामान्य हैजा	१८
क्या सम्भन्ना चाहिये ।	८	पूर्ववर्ती कारण	२०
औषधका भक्षण कहनेसे		उत्तेजक कारण	२०
क्या सम्भन्ना चाहिये ।	८	पतिषेधक उपाय	२१
औषध निर्द्वाचन	८	हैजेकी १ चरम्याये	२२
रोगका भक्षण किम तरह		हैजेकी प्रधान चिकित्सा	२२
जानना चाहिये	८	पाकमण्डावस्था	२५
गरीरकी गर्मी	१०	पुन विकमितावस्था	२६
नाड़ी व्यव्दन	१२	हिमाङ्ग चरम्या	२७
प्याम प्रग्नाम	१३	पतिक्रियावस्था	२८
नाड़ी प्याम और गरीरकी		पणिमावस्था	२८
गर्मीका चापमर्म		चिकित्सा	२८
मध्यम—	१२	कैम्बर प्रयोगकी मात्रा	३१
जिह्वा परीक्षा	१३	पाकमण्डावस्थाकी	
मुखमण्डल	१३	चिकित्सा	३१
मात्र चर्म	१४	पुन विकमितावस्थाकी	
कै और दिग्दी	१४	चिकित्सा	३१
वेदना	१५	शानुपट्टिक उपाय	३८
पचव्यव	१५	हिमाङ्ग चरम्याकी	
मन	१६	चिकित्सा	३८
मूत्र	१७	मात्रा	४१

विषय ।	पृष्ठा ।	विषय ।	पृष्ठा ।
प्रतिक्रियावस्थाकी		पथ्य	५५
चिकित्सा	४१	मैलेरिया जनिन मविराम	
परिणामावस्थाकी		ज्वर	५६
चिकित्सा	४१	पथ्य	६५
ज्वर और विकार लक्षणमे	४२	माद्विषातिक विकार ज्वर	६५
मूवनाश और तन्द्राटोष	४३	शामज्वर	७०
हिचकी	४४	चेचक	७२
वमनकी इच्छा या वमन	४५	संयुक्त वमन	७२
उदरामय	४६	असंयुक्त वमन	७३
पेटफूलना	४७	चिकित्सा	७३
दुबलता	४७	आनुषङ्गिक उपाय	७४
स्मोटक और कर्णमूल		जल वमन	७४
प्रदाह	४७	विमर्ष	७५
फुमफुल प्रदाह	४८	उपभिक्षी प्रदाह	७७
श्लेष्म ( महामारी )		बहुव्यापक सर्दी	७८
श्लेष्म ...	४८	धातु रोग ।	
प्रतिषेधक ...	५०	वातव्याधि	८२
चिकित्सा ...	५०	पुराना वात	८२
आनुषङ्गिक चिकित्सा	५२	गठिया वात	८४
ज्वर ।		उपदंश	८५
ज्वर ...	५२	बाघी	८७
सामान्य ज्वर	५३	गरुडनाला	८७
एक ज्वर	५३	दन्ताकान	८८
लक्षण	५६	बहुमूल	८९

विषय ।	पृष्ठा ।
शोथ	८४
रक्त क्षयता	८७

### ४ । स्नायुमण्डलके रोग ।

संक्षिप्त और संक्षिप्त	
आवरक भित्री प्रदाह	८८
मिरः पीडा	१००
मसगम	१०३
अपभार या शरीर रोग	१०६
गुच्छ या मूर्च्छागत वायु	१०८
धनुष्टकार	११०
कलातड	१११
दवाधान	११२
मर्दी गर्मी	११३
स्नायुगूल	११४

### ५ । चक्षुरोग ।

चक्षुप्रदाह	११७
दृष्टि शक्तिकी क्षयता	११८
तारकामण्डल प्रदाह	१२०
आम दृष्टि	१२१
धूम दृष्टि	१२२
अश्रुता	१२३

### ६ । कर्णरोग ।

कर्ण प्रदाह	१२७
-------------	-----

विषय ।	पृष्ठा ।
कर्णगूल	१२३
कर्ण ग्रन्थ	१२४
कर्णनाद	१२५
कानमें घोष	१२५
बधिरता	१२६

### ७ । नाकके रोग ।

नाकमें फोडा	१२७
नाकमें रक्त बहना	१२८
नासा	१२८

### ८ । रक्त संचालन

#### यन्त्रकी पीडा ।

हृदहृदि	१३०
हृत् गूल	१३१
हृद स्पन्दन	१३२
मूर्च्छा	१३३
मनमण्ड	१३४

### ९ । श्वास यंत्रके रोग ।

मर्दी	१३५
वायुनामा प्रदाह	१३७
श्वकनी । दमा ।	१४०
कुम्फुम प्रदाह	१४०
श्वाना	१४१







विषय ।	पृष्ठा ।	विषय ।	पृष्ठा ।
शिशुके बदनका चमड़ा		चोट	३२६
निकलकर घाव होना ३१८		माथेमें चोट	३२६
शिशुके सर्गी रोग ३१८		मुड़क	३२७
बुध खांसी ३१८		कुचल जाना	३२७
मस्तिष्कका भित्री प्रदाह ३१८		चलनेके समयका बमन ३२८	
मस्तिष्कमें जल संशय ३१८		कौड़ीजा काटना ३२८	
बाल्मास्य विकृति ३२०		ग्राम रोध ३२८	
धातुदोष या कुलज रोग ३२०		चाँद या कानमें कौटादौ	
मृण रोग ३२०		प्रवेश ३२८	
गण्डमाला ३२२		मर्पदंशन ३२०	
शिशु उपदंश ३२२		मेघज लक्षण संघट्ट ३२१	
सुखण्डी ३२२		कई एक कठिन शब्दोंका	
धवल रोग ३२३		अर्थ ३४५	
१६ । आकस्मिक दुर्घटना			
आगमें जलना ३२५			

### १०४ प्रयोजनीय औषधोंकी सूची ।

इस लोग साधारणतः १२, २४, ३०, ३६, ४८, ६०, ८४	
और १०८ शीशुओंके वक्त्रमें नीचे लिखे औषध दिया करते ।	
औषधोंका नाम क्रम मा. डा. । औषधोंका नाम क्रम. मा. डा.	
एकीनाइट ३	बेनेडोना ३
थामेनिक ३०	तार्यानिया ६
कार्बोमिज ३०	चायना ६

श्रीषधोका नाम क्रमः माः डाः	श्रीषधोका नाम क्रमः माः डाः
क्यूप्रम ऐसिट	वैप्टेशिया ३
इपिकाक	कैन्यरिम ३
नक्कभमिका	स्पष्टिया ६
पलमेटिला	स्याइजीलिया ६
भेराइम एल्बम	भेराइम भिर ३
मलफर	एमिड नाइड्रिक ३०
एमिड फम	ऐण्टिम क्लुड ६
आणिका मण्टेना	सूामोनिया ३
मिकैलि कर	कैनाविम स्यैट ३
मिना	यजा ३०
ऐण्टिम टार्ट	हैमोमेलिम ३
हेपर मलफर	कक्यूलम ६
जेलमिमियम	डालकैमेरा ६
कलोमिव्य	इग्नेशिया ३०
मार्क्युरियस कर	सिव्यूटा ३
मार्क्युरियम मोल	माइलीमिया ३०
रमटक्क	इस्तरा ३
कैमोमिला	कैल्केरिया कार्व ३०
रिसिनम	मिमिमिफियूगा ३
साइकोपोर्डियम	पोडोफाइलम ६
ओपियम	सौपिया ३०
टेरिबिन्यना	कैलिवाइक्रम ६
क्यूप्रम मेट	लैक्सिम ३०
हायोमाइमम	मैविना ३
फमफोरम	डिजिटेलिम ६



किया जाता है। यहाँ चूर्ण किया हुआ मोहा इत्यादिको "त्रिचूर्ण" ( त्रिटीउरमन् ) कहते हैं। परन्तु चूर्ण किये जानेके पश्चिमे उक्त मोहादि औषधीका नाम "मूल औषध" (crude drugs) है ।

**परिष्ट ।**—पेड़ पत्तियोंके रस निचोड़ कर सुश-  
मारके माथ मिथाने हुए पदार्थको "परिष्ट" ( टिष्टार ) कहते  
हैं। इसी निकाले हुए रसेमें मूल पदार्थके सभी गुण विद्य-  
मान रहते हैं। ( सुशमारके माथ मिथानेमें लाभ केवल  
इतना ही होता है कि बहुत दिर्नतिक खराब नहीं होते ) इसी  
लिये इस पदार्थको "मूल परिष्ट" ( मादार टिष्टार )  
कहते हैं।

**क्रम ।** "मूल औषध" या "मूल परिष्ट" दूधको  
चर्ने या सुशमारके माथ मृत्तम मृत्त चर्गमे बाँटा जाकर  
जो दवा प्रयुक्त होता है उसको "क्रम" ( attenuation )  
कहते हैं। जैसे एक भाग मूल परिष्टको ८ भाग सुशमारके  
माथ मिथानेमे, प्रथम दशमिक क्रम १०० प्रयुक्त होता है ;  
ऐसा एक भाग मूल परिष्ट को ८८ भाग सुशमार के माथ  
मिथानेमे प्रथम १०० वा क्रम प्रयुक्त होता है। इसी  
तरीके पश्चिमे क्रमकी परिष्ट १ भाग, ८ भाग, वा ८८ भाग  
सुशमारके माथ मिथानेमे, १० वा या १०० वा क्रम प्रयुक्त  
होता है। इस परिष्टके क्रम को "इन्फ्यूजन" कहते हैं।

औषध प्रस्तुत करनेके यदि पूरे पूरे भेद जानने हो तो “मेपजविधान” ग्रन्थकी देखना अत्यन्त आवश्यक है ।

निम्न, मध्यम और उच्चक्रम ।—१<sup>x</sup>, ३<sup>x</sup>, ६, १२, १८ में मध्यम अर्थात् छोटे क्रम है । १२, १८ ये मध्यम अर्थात् बिचले दर्जेके क्रम हैं और ३०, १००, २०० इत्यादि उच्च क्रम ।

अमेरिकान होमियोपैथिक फार्माकोपियाके मतमें १<sup>x</sup> में लेकर ३० तक यह भी छोटे ही क्रममें गिने जाते हैं । तीसके उपर होनेसे उच्च क्रम गिना जाता है ।

एक बूंद औषध इतना फायदा करने-  
वाला क्यों ?—छोटे में छोटे अंशमें औषध बाटे जानेसे उसकी रोगनाशक शक्ति और भी बढ़ जाती है । कविराजी अर्थात् वैद्यक मतसे बनाया हुआ सोना सूक्ष्ममें सूक्ष्म अंशमें बंटा रहता है, वही स्वर्ण आयुर्वेदीय मतसे एक बड़ी रोगघ्न दवा है । नमक, गन्धक, मोना, कस्तूरी, धतूरा इत्यादि लड़, जीव और उद्भिद पदार्थ होमियोपैथी मतके अनुसार छोटे में छोटे अंशमें बाटे जाने पर उनकी रोगनाशक शक्ति का प्रभाव देखकर स्तम्भित हो जाना पड़ता है । यही शक्ति रोगीके शरीरमें पहुँचते ही विजलीकी भांति अपना काम कर दिखाती है, वही एक बूंद औषध सञ्जीवन मन्त्रकी भांति

मरते हुए को नया जीवन प्रदान करता है । इसी लिये एक गताश्रित भीतर ही मध्य जगतमें इतना जल्द आदर हुआ है।

“शक्ति नहीं कम” ।—कम पद्यतिके अनुसार प्रसुत को हरे होमियोपैथिक दवाका ऐसा प्रभाव देखकर उस “कम” शब्दको जगह “शक्ति” (Potency) शब्दका प्रयोग किया जाता है । “छठी शक्तिका धारणा” कहनेसे “धारणा छठे कमका” समझना होगा । महाविद्वान् डाक्टर एलेन श्यादि बड़े बड़े डाक्टरोंने होमियोपैथीमें “डार्व्यूगन” (कम) शब्दको उठाकर उसके बदलमें “पोटेन्सी” (शक्ति) शब्दको प्रचलित कर दिया है । Vide The North Western Journal of Homoeopathy for July 1891 page 107।

## घोषध प्रयोग प्रकरण ।

घोषध किस तरह रखना चाहिये ?—घोषधको किसी विषयमें घोषधालयमें रखीदना चाहिये क्योंकि इसको जल करनेका सम्भव है । जिस घरमें घोषधकी मन्दूज रखी जाय वह घर साफ सुथरा तथा सूखा होना चाहिये । धूप, धूल, किसी चीजकी तेज सुगन्ध, धूम्रा इत्यादिका उसमें कदापि प्रवेश न होना चाहिये । इसके प्रतिरिक्त कपूर चक्र, दा एनापैथिक कोई घोषध वा सुगन्धित द्रव्यके पास कभी

यदि न रखना चाहिये। तथा एक गोमोर्वा दवा या गोमो दूधो गोमोमें कदापि नहीं देना चाहिये। यदि घरमें धूना इत्यादि जलाना हो तो दवाका दूध दूधमें घरमें रख देना चाहिये।

शोध विम तरह सिमाना चाहिये।—पूरे दवा को मुँहमें डाल देना ही काफी है। यदि दवाको अनुपात भिन्नवर्ग में माघ देना चाहिये; अर्थात् दवा अथ निर्मल पानी में माघ सिमाना चाहिये। जहाँ माफ किया हुआ पानी न मिले वहाँ गोमो छोटी गोमो या दूधको पानी में माघ सिमाना उचित है। शोध भवन करने के पहिले मुँह अच्छी तरह माफ कर लेना चाहिये। गोमो के मुँहपर काम लगाकर शोध टालनेका कायदा है नहीं तो बूँद निकालनेवाले यन्त्र द्वारा दवा टालनी चाहिये। लेकिन जब जब दवा निकाली जाय तब तब उस यन्त्रकी जल और सुराभारमें धो डालना चाहिये।

क्रम निरूपण।—कम्पर इत्यादि शोध मूल यदि छोटे क्रममें और नेदाम इत्यादि बड़े क्रममें व्यवहार किया जाता है। जब तक तजुर्वा न हो तब तक क्रम निर्णय बड़ा ही कठिन है। तब यह याद रखना चाहिये कि नये रोगमें छोटा और मध्यम तथा पुराने और जीर्ण रोगोंमें बड़ा क्रम व्यवहारमें लाना चाहिये। परन्तु हैजा इत्यादि नये रोगोंमें अब्ब्या भेदके अनुसार बड़े क्रमका शोध भी व्यवहारमें लाना पड़ना है। किम रोगमें कौनसे क्रमका प्रयोग

करना चाहिये यह (इस प्रत्यक्षमें लिखे हुए रोगीकी चिकित्सा-कालमें) प्रत्येक औषधके पीछे लिख दिया गया है ।

**औषधकी माता ।**—ज्वान आदमीके लिये दवा १ बूंद सवाभर पानीके साथ देनी चाहिये । गोली २, चार छोटी गोली ४, पूर्ण १ पेन । लड़कोंके लिये १ बूंद दवा सवाभर पानीके साथ दो बार, गोली एक चार छोटी गोली दो देनी चाहिये । छोटे बच्चेको एक बूंद दवा दो तोला जलके साथ ४ बार । छोटी गोली १ तथा बड़ी गोली कभी नहीं देनी चाहिये ।

**औषध कितने कितने देर पर देना चाहिये ।**—नये रोगमें १, २, ३, चयवा ४ घटेके ऊपर, चार ऐसेही कठिन तथा प्राणनाशक रोगमें १०, १५ वा २० मिनिटके अन्तर पर दवा देनी चाहिये । पुराने रोगमें लिख, चयवा सप्ताहमें एक या दो बार । नयी पौडा चयवा रोगमें जब देखे कि तीन चार बार दवा देनेमें भी औषधका कोई फल न हुआ तो वही दवा दूसरे क्रमसे प्रयोग करनी चाहिये ।

**औषध प्रयोगके सम्बन्धकी कई बातें ।**

होमियोपैथिक दो या तीन दवा एक साथ मिलाकर कभी रोगीको नहीं देनी चाहिये । एक समय पर एक ही दवा देनी चाहिये । यदि ऐसा ही कोई बुरा लक्षण दिखाई दे और ऐसी ही जरूरत सम्भवी जाय कि दो दवा देना बहुत ही

जरूरी है तो पर्याय क्रममें एकके बाद दूसरी देनी चाहिये (Vide Hughes Principles and practice of Homoeopathy) परन्तु डानहाम् प्रमुख चिकित्सकगण पर्यायक्रममें दवा देनेके विरोधी है ।

जिम समय तक कुछ खाया न हो तथा प्रातःकालमें ही औषध सेवनका प्रधान समय है । बारम्बार सेवन करते रहने पर आहारके एक घण्टा पहिले और एक घण्टा पीछे दवा देनी चाहिये दवा खानेके एक घण्टा पहिले या पीछे पान तमाकु खाना मना नहीं है । गरम समाला या कपूर नहीं खाना चाहिये । दूसरी प्रकारकी किसी चिकित्साके बाद यदि होमियोपैथिक दवा देनी हो तो पहिले दो एक बार कैम्फर खिलानेके बाद तब दवा देनी चाहिये ।

**आनुसङ्गिक चिकित्सा ।**—औषध प्रयोग करते रहने पर भी अर्थात् उमके साथ ही साथ कभी कभी दूसरा उपाय भी करना पड़ता है जैसे फोड़ा होनेपर, तीसी या अलसी वा अंगारकी पुल्टिस देकर फोड़ा पका कर चौरदेना उचित है औषधके द्वारा यदि दस्त न होता हो तो सुसुप्त होना गरम पानोंके साथ भावुन घिस कर पिचकारी देनी चाहिये । विकारमें माया यदि गरम हो जाय, बड़े जोरकी मस्तकमें घोड़ा हो, या नाक मुहमें रक्त गिरता हो तो बरफ या ठण्डा पाना देना चाहिये गरम जलका सेवन या फ्लानलिनके

बल बढ़ना, रातके ११ बजे घटना, बदन दबानेमें आराम मिलना, करवट बदलने या चलनेमें षोडाका बढ़ना, बाँट करवट मोनेमें आराम मिलना इत्यादि) प्रभृति विषयोंको धीरे धीरे उसे पढ़ लेना चाहिये । इसके बाद बाहरी लक्षण सब (जैसे शरीरकी गरमी, नाडी, जिह्वा, चर्म, वसस्थान, पायखाना, पेशाब इत्यादि परीक्षा द्वारा ) स्वयं नियंत्रण कर लेना चाहिये । किम तरहमें शरीरके गर्मीकी परीक्षा करनी चाहिये यह भी लिखा गया है ।

**शरीरकी गर्मी ।**—शरीरकी गर्मी क्षिणिकाल थर्मामिटर ( तापमान यन्त्र ) द्वारा निर्णय करनी चाहिये ।

( यह पारेमें भरा हुआ छोटे छोटे चिन्होंमें चिह्नित एक कांचकी गमो है, भस्के नीचे धारा है, उसके ऊपर कई एक छोटी बड़ी रेखायें चार चंद्र चिह्न हैं । पहिली बड़ी रेखा ८० या ८५ डिग्री । उसके बाद ४ छोटी छोटी रेखायें हैं, हरएक एक डिग्रीका पचिसांश बताती है । प्रत्येक बड़ी रेखा एक एक डिग्रीकी है । ८८ डिग्रीके ऊपर दुमरो छोटी रेखा पर एक तौरका चिह्न है, यह मनुष्यकी स्वाभाविक गर्मीको बतानेवाली है । थर्मामिटरका पारेवाला चंश रोगीके थगलमें या जीभके नीचे थपवा गुच्छाद्वारमें प्रवेश करके शरीरके तापकी परीक्षा करनी पड़ती है । ५ से १० मिनट तक स्थिरभावमें बगलमें रखकर तब बाहर निकालना चाहिए । पारेवाली जगहमें एक पतली पारकी

लकीर उठकर जहां पर जा कर ठहर गई हो, शरीरमें उतनी ही डिग्री गरमी समझनी चाहिये । )

अच्छे शरीरमें ८८°४' डिग्री, सुहमें ८८°५' डिग्री पर्यन्त गर्मी रहती है । लड़कोंके वदनमें जवानोंकी अपेक्षा कुछ अधिक गर्मी रहती है तथा जवानोंकी अपेक्षा ४० वर्षसे ऊपरी अवस्थावालोंके वदनकी गरमी कम होती है । निद्रा और विश्रामके समय शरीरकी गर्मी १॥ डिग्री कम हो जाती है । गात्र ताप यदि २॥ डिग्री अधिक हो जाये तो डरनेकी कोई बात नहीं है पर एक डिग्री कम होना निःसन्देह भयदायक है । मस्तककी आवरण केशोंमें जलन, फुस-फुस प्रदाह, आरक्तज्वर, मोहज्वर और शीतला रोगमें गात्र-ताप १०६° से १०७° डिग्री तक बढ़ जाता है । अन्यान्य ज्वरमें मचराचर १०३° १०४° या १०५° डिग्री तक गर्मी बढ़ती है । शरीरमें १०० डिग्रीसे अधिक वा ८७° डिग्रीसे कमकी दूरी पर यदि पारा ठहर जाय तो समझना चाहिये कि किसी प्रकारकी बीमारी अवश्य हुई है । १००° से १०१° डिग्रीमें सामान्य और १०५° हो जानेसे प्रबल ज्वर समझना चाहिये । १०७° सांघातिक ज्वर, १०८° वा ११०° होनेसे समझना चाहिये कि रोगी शीघ्र ही मरेगा । टाइफाइड या प्वाण्डुलिक ज्वरमें दृढर सप्ताहमें मरनेके समय गात्रताप १०२° या १०३° होनेसे सामान्य ज्वर, परन्तु १०५° होनेसे भयकी बात हो जानी है, सूतिका ज्वरमें साधारणत



१०५° तक गर्मी बढ जाती है। ८०° से ८०° डिग्री तक पतन चक्का समझी जाती है। हैजेके रोगमें कभी कभी छाड़ा मालूम होकर ८०° डिग्री तक गर्मी रह जाती है। नये और मतल रहने वाले क्वरमें, पुराने खय रोगमें, गर्मीका सहसा खुब कम हो जाना चार्जका जनक है।

**नाड़ीस्पन्दन ।**—जन्मसे १ वर्षकी उमर तक प्रति मिनिट में १५० से १४० बार तक, २ से ५ वर्षकी उमरतक ११० से १०० तक, ६ से १५ वर्षकी अवस्थामें ८०, १६ से ५० वर्षकी अवस्थातक ७५ बार और मुढ़ापेमें ७० बार नाड़ी स्पन्दन होती है। स्वाभाविक स्पन्दनकी अपेक्षा २० बार कम होनेसे जीवनी शक्तिका कम होना समझा जाता है।

**श्वास-प्रश्वास ।**—शरीरकी अच्छी अवस्था रहनेपर जवान आदमी २० बार मांस लेता है। श्वास प्रश्वासकी गति यदि धीमी हो, तो यह लक्षण अच्छा समझना चाहिये। मांस यदि शीतल या जल्दी जल्दी चलता हो तो इसे मृत्यु लक्षण समझना चाहिये, वलस्त्र या फुमफुसमें पीड़ा होनेसे मांस तेज चलने लगता है और दुर्बल अवस्थामें कम चलता है।

**नाड़ी, श्वास और शरीरकी गर्मीका आप-समें सम्बन्ध ।**—शरीरकी गर्मी यदि १ डिग्री बढ जाय तो नाड़ी १० बार अधिक चलेगी और मांस दो बार अधिक चलेगा। शरीरकी स्वाभाविक गर्मी ८८° ४, नाड़ी स्पन्दन

०५ तथा सांसकी २० बार चलती है । शरीरकी गर्मी यदि १००° हो तो नाड़ी स्पन्दन ८२ बार और सांस २३ बार चलेगी । साधारणतः दो बारके सांस लेनेमें सात बार नाड़ी चलती है ।

**जिह्वा परीक्षा ।**—यह भी रोग निर्णयका एक प्रधान सहाय है । इसके रंगके हेरफेरसे रोग तुरन्त ही पहिचाना जाता है । तीव्र सन्निपातिक विकारमें नयेज्वरमें तथा प्रति दुर्बलता होनेमें जीभ सूख जाती है । लाल जीभ स्फोटकज्वर या पाकस्थलीके सम्बन्धका कोई रोग बताती है । यदि जीभ पर उजला लेपमा चढ़ा मालूम हो और उसपर लाल लाल दाने दिखाई दें तो उसे चारक ज्वरका लक्षण समझना चाहिये । जिह्वाका पिछला और अगला हिस्सा यदि सूखामा दिखाई दे तो उसे पैत्तिक ज्वर समझना चाहिये । यदि जिह्वा कफ मयुक्त दिखाई दे तो समझना चाहिये कि यह रक्तहीनता और दुर्बलताका लक्षण है । सूखी जीभ यदि तर हो जाय और पीछेकी ओरसे माफ होती जाये तो समझना चाहिये कि यह आरोग्यताका लक्षण है । काली या बैंगनी रंगकी जीभ बताती है कि नाड़ियोंमें रक्त मंचालन बंद हो रहा है । अच्छी अवस्थामें जीभ सदैव तर रहती है ।

**मुखमगडल ।**—यह रोगका साइना है । इसलिये

मुँह देखकर भी शरीरकी असुख्यताके विषयमें जाना जा सकता है। प्रसव सुख सुख्यताका चिह्न है। परन्तु वक्षस्थलकी पीड़ा या चौर किमी पीड़ाके बाद रोगीका प्रशान्त या प्रसव वदन गुभ लक्षण दिखानेवाला नहीं हो सकता। पुमपुममें दर्द होनेसे मुखपर चिन्ता, संकोच, ग्लानकट इत्यादि लक्षण दिखाए देते हैं। मलज्वर मुखमण्डल धातु-दौर्बल्यताका चिह्न है। ज्वरके साथ कमियत होनेसे मुख भनिम, लाल, तथा चोठ काली हो जाते हैं।

**गात्रघर्म्म ।**—वदन रुखड़ा, सूखा चौर गरम हो तो ज्वर समझना चाहिये। शरीरकी गर्मी कम हो साथ ही साथ यदि चौर चौर लक्षण भी कम होते जाय चौर पसीना हो तो इसे थण्डा लक्षण समझना चाहिये। समस्त शरीरमें पसीना न होकर यदि किमी एक ही स्थानमें हो तो यह स्थायिक दौर्बल्य चौर उस स्थानके नीचे प्रदाहका लक्षण दिखा रहा है। विषम चौर प्रादाहिक ज्वरमें पसीना होनेके बाद चौर चौर पीड़ा यदि न दूध तो इसे बुरा लक्षण समझना चाहिये। विषमज्वर, मलेरियाज्वर, मूतिकाज्वर चौर दूमेरे दूमेरे ज्वरमें जाड़ा चौर कंपकंपी भी मान्य पड़ती है।

**कौ (वमन) चौर हिचकी ।**—पाकस्थलीमें दोष मलक सम्बन्धी पीड़ा चौर वक्षस्थल, पुमपुम जरायु इत्यादि

यन्त्रोंकी क्रियाके विगड़नेसे कै होती है। क्रिमी, चंवासा और यकृतके प्रदाहमें हिचकी आती है।

वेदना ।—यदि एक ही स्थानमें दर्द मानृत हो, दर्द-  
वार्त्ता जगह गरम हो और दवानेमें पीड़ा बढ़े, तब उसे प्रदा-  
हजनित वेदना समझना चाहिये। हिलने डोलनेमें यदि  
दर्द बढ़े तो उसे घसुर्नी (पेशी) की दर्द समझनी चाहिये  
खायगूलकी दर्द दवाने या घूमने फिरनेमें बढ़ती या घटती  
है। यकृत प्रदाहमें दाहिने कंधेमें दर्द और हृत्पिण्डकी  
पीड़ामें बायें हाथमें दर्द होता है। घसुर्नी पीड़ामें पुरपा-  
ङ्क के अग्रभागमें पीड़ा होती है।

वज्रस्थल ।—वज्रः पर्माक्षा प्रधानतः तीन प्रकारकी होती है । (१) दंष्ट्रकर (२) हृत्कर (३) मुनकर ।

देखकर ।—रोगीको स्थिर भावसे बैठकर देखना चाहिये कि सम्पूर्ण वक्षस्मय विज्ञान प्राप्त है, निकुड़ा हुआ है और प्रत्येकद्वार मान होने और छोड़नेमें उन्हा होता है कि भुज जाता है या कोई स्थान सूज गया है या नहीं । (२)

हूकर या ठीककर—बायें हाथसे वरतन्त्रकी रोगीके वक्षसे ऊपर रखकर टाईनें हाथसे तर्जनें अंगुलीमें उमें ठोकना चाहिये, यदि ठन् ठन् हल्ले के तो स्वाभाविक चक्का मन मन चाहिये यह यह हल्लेमें रुम रुम पटक यह हल्ले इत्यादि मसमना चाहिये बहुत हीन हल्ले के तो मसमना

हैजेके रोगीके दस्त और कै भे एक प्रकारके कीड़े ( Bacillus ) देखे जाते हैं, ये विषाक्त होते हैं। इन्हीका विष पचछे शरीरमें प्रवेश करनेमें मनुष्यको हैजा होता है। यह बराबर देखा गया है कि जिस ताम्बावमें हैजेके रोगीका मल मूल फेंका जाता है या कपड़ा धोया जाता है उसका जल पीनेमें यह रोग उत्पन्न होता है (Vide Macnamara's 'Treatise on Asiatic Cholera' )

सन् १८१७ इस्वीमें बंगालके यमोहर जिल्लाके चम्तर्गत नन्दडाड़ा नामके गावमें एक बड़ा भेला जमा हुआ था उस समय वहाँ यह रोग उत्पन्न हो कर धीरे धीरे पामके जिल्लामें फैल गया। चौद्वे लिखा, चण्डामन इत्यादि टापुसोंको छोड़ कर और सब देशोंमें इस रोगने अपना आधिपत्य जमा लिया है।

हैजा दो तरहका होता है एक सामान्य और दूसरा साधातिक। सामान्य हैजेकी प्रबल चर्जीर्न भी कहते हैं। और साधातिक हैजाको ( एम्बेराटिक कलेरा ) प्रकृत हैजा कहते हैं। कभी कभी सामान्य हैजा भी साधातिक हैजा हो जाता है। चिकित्सकोंके मूर्वीभाके लिये दोनों हैजेका पार्यक्य नीचे अलग २ दिव्याया जाता है।

होमियोपैथी ।

## सांघातिक हैजा

## सामान्य हैजा

१। यह कुछ जरूरी नहीं है कि यह हैजा आहार के दोषहीन पड़ा हो ।

१। यह अधिकतर आ दोष में ही उत्पन्न होता

२। इसमें अधिकतर नाचे के पट्टों में ( खामकर जाघमें) दर्द होता है ।

२। इसमें नाभिक चारो खींचनेकी तरह पीड़ा होती है ।

३। इसमें दस्त के अधिक या कम हो पर रोगी तुरंत कमजोर हो जाता है ।

३। इसमें अधिक कै दस्त होनेमें भी रोगी वैसा कमजोर नहीं होता ।

४। इसमें एकाएक बदन की गरमी कम हो जाती है ।

४। इसमें बदनकी गरमी धीरे २ कम होती है ।

५। इसमें शुरूहीन चावल के धोवनकी भांति पायखाना होता है ।

५। इसमें पहिले पेटन जमन और दर्दके साथ पित्त संयुक्त दस्त होता है तथा पीछे पित्त नहीं रहता है ।

६। इसमें पहिले हाथ और पैर की अंगुलि छे ठती है फिर मसूदा हाथ पर छे ठने लगता है

६। इसमें पहिले पेटमें छे ठन होता है पर ऊर्दाइमें नहीं होता है

७। इसमें पहिले नाखून फेर पाछे समस्त अंगों में नाला ग हो जाता है

इसमें रोगी का धोखा रोग बदन जाता है

ऊपर लिखे हुए दोनों तरहके हैजेके समाने एक तरहका और भी हैजा होता है, उसमें दस्त के या पेटमें कुछ भी नहीं होती ; पर पेशाब बन्द होना सुप्ती, प्यास और दाह इत्यादि हैजेके बाकी सब लक्षण दिखाई देते हैं । इस तरहके हैजेको “सूखा” हैजा ( Dry Cholera ) कहते हैं । यह सांघातिक हैजेका एक प्रकारान्तर मात्र है । यह रोग जटायु रोगीको हो जाता है और तुरंत ही शरीर नीला और ठण्डा हो जाता है तथा नाड़ी शून्य, स्वरभङ्ग और जीभ खर हो जाता है और पेशाब बन्द होना आदि सांघातिक लक्षण दिखाई देते हैं ।

**पूर्य्ववर्त्ती कारण ।**—जब कल मूल, खड़ी या मड़ी हुई चोर्जाका भोजन, गन्धी हवामें फिरना, गन्धा और मिना माफ किया हुआ पानीकी पीना, अपरिमित पाहार, नयीनी चोर्जाका अधिक सेवन रात्रि जागरण, अतृप्त परि-वर्त्तनादि इसके पूर्य्ववर्त्ती कारण हैं ।

**उत्तेजक कारण ।**—पहिले लिखे हुए कौडे । यही कौडे ( Bacilli ) प्रधानतः हैजेके रोगीके मल मूत्र वमनमें देखे जाते हैं । परन्तु ये कौडे किस तरह उत्पन्न होते हैं । इसके बारेमें अभीतक कोई बात स्थिर नहीं हुई है ।

**प्रतिशेधक उपाय ।**—हैजेके समय मैले और दुर्गन्धयुक्त स्थानमें रहना, अधिक भोजन, अपरिष्कृत जलपान, और अधिक परिश्रम, और मड़ा मट्टली मांस इत्यादि भोजन, बिलकुल मना है। यह रोग जब फैला रहे उस समय चित्तमें डर न पैदा हो ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिये। रातमें अधिक जागरण, ठण्डी और दुर्गन्धित वायुका सेवन कभी न करना चाहिये। घरमें जो जो स्थान नौधा, तर या दुर्गन्धित हो उसको कार्बोन्निक एमिड चूना अंगार इत्यादि छौड़वाकर माफ कर लेना उचित है। महामारीके समय किउप्राम ३० या सल्फर ३० का व्यवहार करना चाहिये। गीगा का के या दन्त पानी या खानेकी चीज किमी के माघ पेटमें न जाना चाहिये। हैजेके रीगाके मल या वमन को अलकतरा या चूनामें डालकर भट्ठीमें गाड़ देनेमें फिर अधिक भय नहीं रहता। यदि माको हैजा हो जाय तो लड़कों कभी उसका दूध पीने देना न चाहिये।

---



## कैजेकी ५ अवस्थाएँ :—

- १ । आक्रमणावस्था :— इसमें रोगीको अचानक घोर वेदना होने उद्गमय रहता है ।
- २ । पूर्णविकसित अवस्था :— के दस्त घोर गिंटन इसके प्रधान लक्षण है ।
- ३ । विमोह या घटनावस्था :— इसमें समस्त शरीर काफ का नाश टण्डा हो जाता है तथा नाईं नीचे होनी जाती है ।
- ४ । मृतिक्रावस्था :— इसमें फिर शरीर काफ हो जाता है और मलिव्यामें नाईं पाई जाती है ।
- ५ । पशिलावस्था :— १४ व दिवस बाद मृतिका ।

## कैजेकी ५ धान चिकित्सा :—

कैजेके दुखीके ५ प्रकार की अवस्था तथा उसका घरा घरा विवरण और चिकित्सा चांगी बिया गया है परन्तु यदि शिशुअर्धको समूचा घल घट जाता तथा उसमें लक्षणीय रोगी रोगीको शीघ्र निकालना एक प्रकारसे सम्भव है क्योंकि उस समय समूचा घल घटनेमें चिकित्सा कासेका समय नहीं मिलता नहीं नहीं निमा भी हो जाता है कि कोई दूरय यात्रा मेंत्रुद नहीं है और अचट वेदनें नहीं मिलता उस समय लक्षणी । दनें बिदेको के चिकित्साका धन दान करना पड़ता है । इमे नियुक्त इसमें लक्षणी व घल कह एक धान

शोषधीकी सहायता से हम राग री मोटासोटी चिकित्सा निचि निचो जाती है ।

अधिक करके के शीर दस्त तथा कपालपर ठण्डा पर्माना दिवाइं दे तो, मेरादम है देना चाहिये । जैसे यदि हाय पर वा रीचना या पेंटन अधिक दिवाइं दे (विशेषकर हाय परमें ) तो जिउप्राम है देना चाहिये । यदि के शीर दस्तके साथ प्यासभी प्रबल हो तो, बदनमें दाह रहते भी रोगी दस्त इत्यादि से बदनको ठाँके रखना चाहें बड़ी मुस्ती दुर्बलता और अस्थिरता हो तो चार्मिनिक है, के शीर दस्तके साथ पेटमें ज्वाला या बड़ी दहें मालूम हो, नृत्य भय हो, और रोगी हटपटाये तो आकीनाइट रेडियम माटर के व्यवहारमें आरुध्यमें डालनेवाला फल दिखलाई देगा । के वा अधिक जोर और के होनेपर भी उमकी शान्ति न होने पर इपिकाक है, परन्तु यदि के हो जाने पर फिर के होनेकी इच्छा न रहे तो गैंग्लिमटार्ट है देना चाहिये । गरम दस्त गरम के प्रबल प्यास या प्यासका एकदम न रहना, लड़कीकी दांत उत्पन्न होनेके समय उदरामयमें तथा शिशु विशुद्धिकामें डाक्टर मर्शर पडोफाइलम है व्यवहार करनेकी राय देते हैं । रोगीका शरीर ठण्डा रहे लेकिन पेटके भीतर सदा ज्वाला रोगीको मालूम हो, सदा हवा करनेको कहे, बदनका कपड़ा निकालकर फेंक दे । बराबर दस्त होना गुहादार खुला रहना आदि लक्षणमें मिर्कलि है उपयोगी है । हिमांग, मद्य शरीर



सकता है । प्रतिक्रिया अवस्था आरम्भ होनेके तीन चार घण्टे बाद पथ्यकी व्यवस्था की जा सकती है । पेशाब होने के बाद ( या जिस समय स्पष्ट रूपमें मालूम हो कि मूत्र मूत्राधारमें जमा है और रेशाब उतरता नहीं ) तब साबुदाना पानीमें बनाकर उसमें थोड़ा चीनी या निमक देकर खिला देना चाहिये । मलमें पित्तका भाग दिखाई देतो पानीमें आँटाया साबु वाली या जन्के साथ बहुत थोड़ा दूध देना चाहिये । कैसा भी कोई कारण क्यों न हो रोगीको के दस्त आरम्भ हो लानेके बाद कभी स्नान न करने देना चाहिये । बहुत से आदमी विचारतेहैं कि गरमीमें “कै” “दस्त” हुआ है स्नान करनेमें या “ठण्डा” व्यवहार करनेमें रोगका उपशम हो जायगा परन्तु ऐसा कभी विचारना न चाहिये, के दस्त होने पर स्नान या खाकर कितने ही लोगोंने अपने अपने प्राण गवाये हैं ।

(१) आक्रमणावस्था ।—रोग आरम्भ की सूचना पर्याप्त चाबलके धीधनकी तरह दस्त होनेके पूर्व आक्रमण अवस्था रहता है । इस अवस्थामें शरीरकी गरमी धीरे धीरे कम होती जाती है । दुर्बलता फुगतीका कम हो जाना, शिरका घूमना, नींद न आना, अनम्रव वमन की इच्छा, अरुचि श्वास, मुँहका बे-स्वाद हो जाना, पेटमें भारीपन या दर्द मालूम होना, कभी जाड़ा, कभी गरमी मालूम पड़ना, कानमें

मौं मौं या दम् दम् शब्दका होना, उदरामय इत्यादि लक्षण दिखाई देने से हैजेका कीड़ा जिस दिन शरीरमें प्रवेश करता है, उसी दिनमें एक सप्ताहके भीतर रोगी निश्चय ३७ बार पेट ऐंठकर या बिना पेट ऐंठे ही रग बिरगो पतना मनव्याग करता है। मस कभी पित्त मिना हुआ और कभी दूसरी तरहका होता है।

(२) पूर्ण विकमितावस्था।—जब कि चावलके धोवनकी भांति दस्त और के हो उस समय दूसरी अवस्थाका प्रारम्भ होता है। इस अवस्थामें चावलके धोवनकी तरह दस्त और के होता है या जो मचलाता है। तेज प्यास, चेहरा मलिन, पांखें बैठ जाना शरीरका विवर्ण हो जाना, मस शरीरमें ठण्डा पसीना होना ( विगंध करके मस्तकमें ) फिर पेशाब बन्द हो कर नाडोका खोप हो जाना, पांखोंके चारों ओर नीलो रंग प्रभङ्ग घेठमें दर्द, पाकस्थलीमें जलन, पेटका गड़गड़ाना, शरीरके स्याज स्याजपर त्रिगुणकारके हाथ पैरकी पगुलियोंका ऐंठना शरीरकी अवसक्तता और चम्बिता। मुँह और पीठोका सूख जाना इत्यादि लक्षण प्रगट होते हैं। कभी कभी इन लक्षणोंमें कभी बेगो हो जाते हैं। जैसे किमी रोगीकी दस्त अधिक होता है पर के कम होता है। किमी को दस्त ही कम होता है पर के और के की इच्छा अधिक होती है। इसी विकमित अवस्थाके ये सब लक्षण यदि ८२ घण्टे तक रहे तो

मलके साथ पित्त ( अथवा पीला या हरे रंगका दस्त ) होनेसे और उक्त लक्षण कम होनेसे रोगी धीरे धीरे आराम हो जाता है। परन्तु ऐसा न हो कर यदि ममस्तु गर्गर रीतल, मुखाकृति बिगड़ी हुई और नाड़ी नुन प्रायः इत्यादि लक्षण दिखाई दें तो पतनावस्थाके निकट ममभूता चाहिये। इस अवस्थामें बहुतों रोगीमर जाते हैं, और यदि १२ घण्टा बचा रहे तो जी भी सकता है।

(३) हिमाद्र अवस्था।—यही हैजेकी प्रकृति अवस्था है। यही पतनावस्था बड़ी भयानक है। और इस अवस्थामें प्रायः रोगी का मृत्यु होता है। द्वितीय अवस्थामें के दस्त महाना कम हो जाता है, रोगी ध्यानमें चस्मिर होता है लेकिन ध्यानके साथ के इतना बढ़ जाता है कि उक्त पीनेके साथ ही अत्यन्त कष्टकर वमन होकर तुरन्त पानी उठ जाता है। बारम्बार के होने होते रोगी अत्यन्त निस्सौज हो जाता है और धीरे धीरे मण्डिबन्धन भी नाड़ी नोप हो जाती है यहाँतक कि बांहकी इङ्गटक नाड़ीका पता नहीं लगता। धीरे धीरे जीवनी शक्तिका हान होता है, और बदन वस्त्र की तरह ठण्डा हो जाता है। आँठ नीला, नव गर्गर मलिन या मोले रंगका हो कर आँखें बँठ जाती हैं, तथा प्रभाशून्य और आरक्त हो जाती हैं। चक्षुनाश फैल जाता है मान लेंनेसे बड़ा कष्ट होता है स्वर भंग हो गलेमें बड़ी ही दर्द हुई आवाज निकलती है। ऐसी कि बातें तक

सुनाई नहीं पड़ती) पेगाब बन्द हो जाता है और हाथ पैरकी चंगुनियोंका अग्रभाग मिकुड जाता है ( जैसा कि बहुत देरतक पानीमें भीगी रहनेमें हो जाना है ) प्रभृति लक्षण दिखाई देते हैं । अत्यस्त बदनमें दाह हो जानेके कारण रोगी शय्यापर छटपटाना है बदनका कपडा यहाँतक की धोती-तक उतारकर फेंक देता है । कभी कभी सुँह पर बूंद बूंद पसीना दिखलाई देता है । इस अवस्थामें प्रायः बेमालुम दस्त ही अधिक होता है या दस्त बन्द होकर पेट फूल जाता है । तीसरी अवस्थाके अन्तमें रोगी ऐसा निमोत्र हो जाता है कि उसको करबट भी लेनेको शक्ति नहो रहती, परन्तु “हैजा” रोगमें मरने के पहिले तक रोगीको चान रहता है । इस अवस्थामें दस्त के बन्द होनेके छोड़ी ही देरबाद मृत्यु हो जाती है अथवा २१२ घण्टा चुपचाप पड़े रहनेके बाद मृत्यु हो जाती है । यदि कै दस्त बन्द होनेके चार पाँच घण्टा बाद तक रोगी न मरे तो (A) प्रतिक्रियावस्थाका आरम्भ सम्भना चाहिये ।

(४) प्रतिक्रियावस्था ।—छतौयावस्थाके अन्तमें कै दस्त बन्द होर नाडों नाँप हॉन परभी मृत्यु न होनेमें फिर मणिवस्थमें नाई पाई जाती है । इसके साथ तीसरी या पूर्णविकसित अवस्थाके लक्षण धीरे धीरे फिर पाये जाने हैं । यदि व्याप्य या व्याभाविक्र प्रतिक्रिया आरम्भ हो तो बदन गरम हो कर फिर पित्त मिला हुआ कै और दस्त हो कर जीवनी शक्ति ब्रि होनी है पेगाब होना है या मूत्रागममें जमा होना





करना उचित है । डाक्टर फेरिड्टन कहते हैं कि दस्त कम, कै अधिक, मर्वाइ गीतन, स्वरका बदलना, यह सब लक्षणोंमें “कैम्फर” देना । घीम या ठण्डके पत्रौर्ण या उदरामयके बाद हैजा हो जानेमें कैम्फर उपकारा होता है । इस रोगकी आक्रमणावस्थामें जब छोड़ा जाड़ा लगना, दुर्बलता, ग्लाम-प्रदाममें कष्ट, पाकस्थलीमें जनन, मायाका घूमना, इत्यादि लक्षण मालूम होंतो उस समय “कैम्फर” प्रयोग करना चाहिये । दस्त घोर के जिम हर्जमें नहीं है उसका कैम्फर हो एकमात्र औषध है । अत्यन्त आर्यविक अवसद्धता, मर्वाइ बरफकी भाति गीतन, पमाना ॥ होना या एक दम ठण्डा पमाना होना, हाथ पैर बंदम ग्लामकष्ट, आंखें स्थिर, गाड़ों लीण, मर्वाइ नौलवर्ण इत्यादि लक्षणोंमें कैम्फर उपयोगा है । हिमाइ अवस्थामें जिम समय कै दस्त बन्द होकर प्रतिक्रियावस्था आरम्भ हो तो उस समय कैम्फर दो एकबार जरूर देना चाहिये । इस अवस्थामें बृहदन्त्र, हृत्पिण्ड घोर पैशांसे पला-घान होनेमें घोर “कार्पोभिन्न,” “कैम्फरम” इत्यादि औषध प्रयोगमें कोई लाभ न दिखाई देनेपर “कैम्फर” देना चाहिये । आग्नेपर्वाम, हैर्जमें या आर्णविक हर्जकी विकसित अवस्थामें कैम्फरमें कोई फल नहीं होता । अधिक मात्रा बार बार कैम्फर प्रयोग करनेमें यदि आमाशयमें जनन, मानसिक अवच्छेदता इत्यादि कष्टकर लक्षण दिखाई दे तो दो एक बार “कैम्फरम” लिक्वात्रिमे से नीच लश हो जाने दे ।

कदिराजी, हकीमी या एन्डोपथिक चिकित्सा के बाद  
हामिथोपैथिक चिकित्सा यदि करना हो तो पहिले दो एक  
बार प्रेम्पुअर बिनाकर तब दूसरी दवा खिलानी चाहिये

कैल्पर प्रयोगको मात्रा । १०।१४ मिनिट के बाद एक एक मात्रा रविर्नाका वंस्पृष्ट चर्मा या वतामाके माध्य स्थिताना चाहिये । लडकोंके लिये ३।४ घट, पार गुप्ता या लडके लिये ( रोगके उपता के अनुसार ) ५ से २० घट तक प्रयोग करना चाहिये । दो डोजके के बीचसे ८।१० घाट वंस्पृष्ट प्रयोग करने पर भी यदि थोड़े लाभ न दिखाने दें तो दूसरी दवा देना चाहिये ।

१) आक्रमण अवस्थाकी चिकित्सा ।

उद्दामपक्षी शिक्षितपक्षी: मरणम् । इमं पद्यम् "उद्दामपक्षी  
शिक्षितपक्षी पश्यन्" की दृष्टिः

(२) पूर्ण विरसितावस्थासौ विहितना —

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ  
ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ

[illegible]

अवसन्नता तथा अत्यन्त प्यास और सूतवत् मुखारुति—  
आर्मेनिक प्रयोगके प्रधान लक्षण है। हैजेकी सभी अवस्था-  
ओंमें आर्मेनिक प्रयोग किया जा सकता है।

### किउग्राम नेट ६-१२-३० ।—हैजेके दूसरे

सब लक्षणोंके साथही साथ जिस समय आघेप उपस्थित हो  
वस समय किउग्राम देना चाहिये। मर्म्माङ्गुलीतल (या नीलवर्ण)  
हो कर, हाथ पैर विशेष करके हाथ पैरकी चट्टलिया और  
पैरके पिंडुलीमें यदि ऐंठन हो, बच्चैर्नीके कारण रोगी छटप-  
टाता हो, तारकी तरह पतली नाडी, या सुप्तप्राय नाडी,  
आँखें उलटी या धम गई हुई, जानमें कम सुनाईदेना या  
एकदम बन्द हो जाना। पानी पीतेही गलेमें कन् कन् या ठक्  
ठक् शब्द होना, ठण्ठी चीर्जीकी अपेक्षा गरम चीज खानेकी  
इच्छा, बमन या बमनिच्छा साथही साथ पेटमें दर्द, ठण्ठा  
पानी पीनेमें बमनका बन्द होना, कै करते समय आँखोंमें  
पानीका निकलना। पाखानेकी जगहका खुजलाना, जीभकी  
जड़ताके कारण आँतका साफ न निकलना। फटा हुआ और  
मट्टेकी तरह पतला दस्त और कै, मूत्रत्यागकी इच्छा लेकिन  
मूत्रका न होना, घन घन प्यास प्रभ्यास, धनोप चिह्नाना।  
हाथ पैरमें खैचन दांतपर दातका घिसना इत्यादि लक्षणोंमें  
यह प्रयोजनीय है।

आघेपयुक्त साक्षातिक हैजे में जिस समय आघेप बड़ा

नालीकी ऊपता हो तथा शीघ्र या कोइ द्रव्य पेटमें जाते ही कै हो जाय उम समय किउप्रामके प्रयोग करनेमें पेट या खाद्यद्रव्य धारण करनेकी सामर्थ्य हो जाती है । डा० प्रक्टर कहते हैं कि किउप्राम ऐंठनकी प्रति उत्तम दवा है ।

रिसिनास ३-६ ।—बटना हीन कै या दस्त; अधिक चावलके धोषनकी भांति दस्त, पेगाब बन्द इन सब लक्षणोंमें उपयोगी है ।

सिकेलि-कर ३-६ ।—किउप्राम प्रयोग करनेमें पाइप आदिकी निवृत्ति यदि न हो और अधिक करके निम्न-लिखित लक्षण दिखाई दे तो—सिकेलि प्रयोग करना उचित है । स्तब्ध, आँखोंका बैठजाना, कानमें कम सुनाई देना, मुख मनिन । गुष्क और रक्त हीन, नाफ और सुफेद रंगकी जीभ और उममें भी रह रह कर कम्यन, बड़ी ध्यान और भूख बसन या बसनच्छा पाकस्थलीमें बनन, नूतरोध, वलस्थलके बाय नरफ ऐंठनकी भांति दटे, नाई मृज्ज और लुप्तप्राय, हाथ पैरके अर्धस्थलमें ऐंठन या टेढ़ा हो जाना, शरीरमें बनन इसमें बटना पर कटका न रखना, हाथ पैरका कापना और चिन्नन सब टेढ़ा होना जीभ ऐंठना और मलत्याग इत्यादि लक्षणोंमें सिकेलि दस्तान उपयोगी है । ऐंठनके पतनस्थान यह प्रथम पाएव है

हाथ पैरमें ऐंठन, मर्ब्बाइ विशेष करके मुखमण्डल नीला, धनुष्टंडारकी भांति पीछे टेढ़ा हो जाना, क्रिमि या ऐंठना के करना, बमनके बाद चाराम मिनना इत्यादि इस औषधके प्रधान लक्षण हैं ।

एकोनाइट वैडिक्स०, १५ ।—दस्त केके साथ साथ मर्ब्बाइ ग्रीतन, समस्त शरीर नीलवर्ण, साम लेने और छोड़नेमें कष्ट । पेटमें बड़ी दर्द, मुख मलिन, पानी सा पतला दस्त, हरा, कामा, पित्त बमन, सूत्रावरोध, भिरमें दर्द, सोम ठण्डी, सुप्तप्राय चींग नाड़ी और कभी कभी पेटमें ऐंठन इत्यादि लक्षणोंमें देना चाहिये ।

हिमाइ अवस्था और प्रतिक्रिया अवस्थामें बदन गरम न रहने पर एकोनाइट वैडिक्स १० देना चाहिये ।

पतनावस्थामें हृत्पिण्डके क्रियाकी चींगता रहने पर भी हृत्स्पन्दनकी समता ध्याकुलता और मृत्युभय, पतनावस्थामें सेषामय चटचटा दस्त छोड़नेमें एकोनाइट वैडिक्स १० । हैजेकी परिणामावस्थामें ज्वर हो चाहे ती वेनडोना ३० और एकोनाइट वैडिक्स १० पात्रापात्रोंमें देना चाहिये ।

गिगिटम टार्ट ६, ३० । पूर्ण विकसित अवस्थाके शेषभागमें जब केके बादही तुरत मूर्छा या मूर्छावैश हो और फिर बमनके समय चैतन्यता हो उस समय गिगिटम टार्ट देना चाहिये । उपरोक्त लक्षणोंके साथही साथ बसस्यन्तमें जलन

या दर्द हो, रोगी तन्त्रामें रहै या सुस्त पड़ जाय किसी बातका जवाब न दिया चाहता हो, बार बार बड़े कातर स्वरमें बोलता हो, ज्ञान अधिक, प्रज्ञास कम, नाड़ी चीग और मन्द, जलवत् या फेनीला हरा मलत्याग, अत्रानावस्थामें मलत्याग, कटकर वमनच्छा बड़े कटसे थोड़ाना वमन, आंखोंका बैठ जाना और दृष्टि हीनता इत्यादि लक्षणोंमें एण्टिम टार्ट देना ।

पतनावस्थामें यदि हृत्पिण्डकी क्रिया लोप होती देखी जाय तो एण्टिमटार्ट । भैराद्रम और एण्टिम टार्टके लक्षण प्राय एकही प्रकारके होते हैं । तब सांमपेथी कम्पन और बेहोश अधिक रहनेमें एण्टिमटार्ट और हृत्पिण्डकी दुर्बलता या पचाघातमें भैराद्रमने यदि कोई फल न हो तो एण्टिमटार्ट देना चाहिये ।

पाइरिन भार्म ३४ — नाभिके चारो तरफ और पेटमें दर्द हो कर खड़ा बड़बू, निचि के टस्त हो, सादा या प्रित्त मिना हुआ टस्त हो, अम्ल वमन तथा पित्तयुक्त पतला टस्त, अधिक रात बैठ जानेपर कटका बटना, खाई हुई चीजका कै करना फिर पित्त कै करना और कै कै डाढ़ साठ टाढ़, पसैना और मुखमें जलन इत्यादि लक्षणोंमें उपर लिखे लक्षणोंके साथ टार्ट मल्लार्ड हीनता से जो इन लक्षणोंमें कोई उपकार न होगा

इपिकाक ३५. ६

हैजेके और और जलनके साथ

घोर, लान रुद्ध दस्त होना (उक्त रक्त दस्त होनेके साथ शेष्मा न रहे) ।

माक्यूरियस कर ३ ।—इजेके अन्यान्य लक्षणोंके साथ (चावलके धोषनकी भांति दस्त न होकर) रक्त मिला हुआ शेष्मावाह होनेमें अजीर्णके (उदरामय) बाद ईजा होनेमें सार्ज कर विशेष उपयोगी दवा है ।

क्रोटन टिग ३, ६ ।—महमा पिचकारीकी तरह जोरसे पतला दस्त होना । पेटमें बड़ा दर्द हो और पानी या पतला पदार्थ पीतेही कै हो जाना इत्यादि लक्षणोंमें ।

ज्याट्रोफा ३, ६ ।—चावलके धोषनकी भांति दस्त होनेके बदले घटघटा उज्रसे रगता पतला दस्त हो । पहिले कै पीछे दस्त, मय चङ्ग गीतल, पसीमा ठण्डा, हाथ पैरमें ऐंठन, पेटमें गड़ गड़ या कल कल शब्द ।

माखा ।—रोग की तेजीके अनुसार १०।१५।२० मिनिट या चार्धे चार्धे घण्टे पर एक एक माखा चौपध देना चाहिये ।

आनुसङ्गिक उपाय ।—रोगके प्रारम्भावस्थामें रोगीको सुते और माफ घरमें सुलाना चाहिये । रोगीके घरमें सदा माफ सुथरी हवा आनी चाहिये ऐसा उपाय अवश्य करे । घरमें धुना, कपूर, गन्धक इत्यादि जलाना अच्छा है । दूसरी अवस्थामें रोगीको पथ्य कभी न दें । प्यासके निये ठण्डा जल या बरफ भी दिया जा सकता है । घरमें बहुत दूर मल, भूत, जमन इत्यादि मिट्टीमें गाड़ देना चाहिये ।

**हिमाद्र अवस्थाकी चिकित्सा ।-** कितनेही रोगों में जो जो पूर्णविकसित अवस्थामें भी दिखे जाते हैं और हिमाद्र अवस्थामें भी उनकी जरूरत पड़ती है। जो रोगों में एकबार पूर्णविकसित अवस्थामें खिन्नाया जा चुका है उसीको फिर हिमाद्र अवस्थामें खिन्नानेमें कोई लाभ होना सम्भव नहीं है।

पतन अवस्थाके पहिले यदि कोई रोग प्रयोग करनेमें रह गया हो चर्मात् न खिन्नाया गया हो तो पहिले ही २५ बार कैम्फर प्रयोग करनेमें यद्यपि उपकार होगा। सांघातिक हजेके प्रथम अवस्थामें २५ दस्त के होते ही रोगी हठात् निश्चित हो जाय चैतन्यता जाती रहे, सब शरीर नौना पड़ जाय, मुँह खुल जाय, दृष्टि स्थिर रहे, सब शरीर बरफकी तरह ठण्डा हो जाय, जीभ जकड़ जाय या खुरभड़ हो, हाथ पैर एंठने लगे तथा नाड़ी लुप्तप्राय हो जाय तो ऐसी अवस्थामें विवेचना करके २५ मात्रा कैम्फर देनेहामें लाभ दिखाई देगा।

पतनावस्थाके पहिले यदि आर्सेनिक, मेराइम क्रिउप्रान, मिक्लेनि कर और ऐकोनाइट इत्यादि रोग प्रयोग न किए गये हो तो हिमाद्र अवस्थामें यह सब रोग नष्टके अनुसार प्रयोग किये जा सकते हैं।

कार्वोमेज ६-१२-३० ।—हिमाद्र अवस्थामें कार्वो-



भोज विशेष उपकारि औषध है । मत्र शरीर बरफकि भांति शीतल, जीभ ठण्डी तथा नीली, नाड़ी सुप्तप्राय, पांखिं धसी हुई, कपान चौर गले पर पर्मानाका बूद, स्वरमद्ध या चम्पट वाक्य के दस्त बन्द हो कर पेट फूला हुआ, मांस लेनेमें बड़ा कष्ट, पत्यस्त दाह, मत्र शरीर नीला इत्यादि लक्षणोंमें काज्वी-भोज दिया जाता है । यदि इस अवस्थाके पहिले भराइम या आर्सेनिक प्रयोग न किये गये हो तो ये दोनो पारापारी देनेसे यष्ट उपकारकी सम्भावना है । पेट फूला रहनेके साथ यदि दुर्गन्धित मल भी निकले तो काज्वीभोज अवश्य देना चाहिये ।

एसिड हाइड्रो १, २ ।—मृतवत् पाक़ार, मांसका धीरे धीरे चलना, पर्माना ठण्डा, नाड़ीका मोप हो जाना, मत्र शरीर ( विशेषतः जीभ ) शीतल पांखी या पुरी 'पांखिं' फटी, हाथ पैरके मध्य नीली चौर आंगिका भाग कुचित, अवैतन्या-वस्था में पड़े पड़े बड़बड़ाना इत्यादि इसके लक्षण है ।

आसेपिक ऐजेर्की पहिली अवस्था हाथ पैरमें ऐंठन बलम्यममें लेकर मज्जितक पीडा, पेट बैठ जाना, चौर दर्द, हाथ पैर अवश तथा मत्र शरीर नीला हो जाता है ऐसी अवस्थामें ऐमिड फ़ारडो देना चाहिये ।

ऐक्रोनाइट मेपेनाम = ११ ।—हृत्पिण्डकी क्षीणता लेकिन हृत्सम्पन्नकी समता, बड़ी बेचैनी, सत्युभय, मत्र बदन ठण्डा चौर मृतवत् पाक़ति इत्यादि लक्षणोंमें इसे प्रयोग करना

चाहिये । ऐकोनाइटसे नाड़ी तेज तथा जीवनी-शक्ति उत्ते-  
जित होती है । उक्त र माल्जर कहते हैं कि एक बूंद  
मादरटिंचर ३ आउन्स पानी में मिलाकर ५ से ३० मिनिटके  
अन्तर पर एक एक ड्राम खिलाना चाहिये ।

कोव्रा ६ ।—शरभ्वार श्वास रोध हो, पेट फूला हो,  
सब शरीर नीला हो, और रक्त पूर्ण शिराये फूलना इत्यादि  
लक्षण में ।

मावा ।—अवस्थानुसार १०।१५।२० मिनिटका अन्तर  
पर एक एक मावा औषध देना चाहिये । कैम्फर, मेरा-  
ड्रम, किउग्राम, आर्सेनिक, या मिकेलि लक्षणानुसार आवश्यक  
हो मक्ता है । लक्षणादि—चिकित्सामें देखो ।

४ प्रतिक्रियावस्थाकी चिकित्सा ।—स्वाभा-  
विक प्रतिक्रिया आरम्भ होनेपर किसी तरहके औषधकी जरू-  
रत नहीं है उस समय पथ्य इत्यादिकी चेष्टा व्यवस्था करना  
ही उचित है । प्रतिक्रिया आरम्भ होनेपर यदि १-२ दस्तकी  
भी हो तो औषध प्रयोगकी कोई आवश्यकता नहीं है । यदि  
कष्टकर हो जाय तो लक्षणविशेष विचारकरके जो सब औषध  
रोगकी प्रबल अवस्थामें प्रयोग किये गये हों वही सब औषध  
कम मात्रामें देव करके देना चाहिये ।

(५) परिणामावस्थाकी चिकित्सा — (क) रोगकी पुनरा-  
क्रमण अवस्थामें ।—बहुत जगह प्रतिक्रियावस्था आरम्भ होनेके

वाट भी रोजेका छिन् चाक्रमण हो जाता छै । साधारणतः क्रमिक कारणमे यक्ष चपला होतो छै । अंशान्विधिय विचार करत परिश्रमे निगे दुग चोपध देना चाहिये ।

(ख) ज्वर चौर विकारमूलनर्मे । प्रतिक्रियाव्यभि' यदि चौर चौर उपसर्गे न हो कवल ज्वर हो तो भिर्क गिकी-भाइट देनेचामे ज्वरका नाश होमा । परन्तु यदि ज्वरको साथ हो मूलनर्मे रक्त मद्युय होकर चामि' माल हो गर्छे हो, कपाल चौर कनपटाको मव गिरामे दण दण करतो हो, माया मरम इत्यादि लक्षण वलमान हो तो बेलाउलोना ६, या ३० ।

गोमा विहोनिध भागनेका कोजिग को या विहोनेके कपडे मव र्थानि या धोकि धोकि चाप हा चाप बने तो चापचोमावमम ६ ।

पटम कुमि रक्तनम कारणम दानि कड कड करे, माथका चपला भाग लुत्रमणि, मूत्रमे प्रल निजमे चौर गिरनेद इत्यादि लक्षणोंके साथ प्रभाव बने तो मिना ३० या ३०० ।

इत्यादि चोचानि चानरन चो' रामम मद्युय रक्तनम काटनेको जाला इत्यादि लक्षण हो तो दुमोमियम ६ । चौर निद्राको

भर्ति अनेकक चपला'म वडा हो, चोरी चामि लुला हो तो चो'रियम ६, या ३० । ज्वरक साथ कुल कुलम वडा' हो तो

कचो'रियम ६ चो'र कुलकोरम ६ । चो'र लक्षणमे द'द ललन द' वडा' हो तो चो'रियम ६, ललनभ'मका ३० । या ३००

या कचो'रियम ३० । द'द ललन चो'र वडा'च'क हो



(घ) उदरागम—प्रतिक्रिया चारम्भ होनेके बाद पथरा सूखसावके बाद यदि थोड़ा थोड़ा उदरागम हो तो डरनेकी बात नहीं है । पथकी चौर दृष्टि रखनेमें यह महजड़ी में आगम हो सकता है । यदि वह आगम न हो कर बढ़ता ही जाय तो रोजकी रोज चक्कामें जोन जोनमें औषध प्रयोग किये गये थे चक्कामें विजिपमें उन्ही मद्य औषधियोंका लंबा काम, कलकी मात्रामें प्रयोग करना चाहिये । इन मद्यके व्यवहारमें भी यदि शक्ति न हो तो मक्षणानुसार नीचे लिखे औषध देना चाहिये ।

पेगाव होनेके बाद उदरागम चौर साधारण दुर्बलताके मक्षणमें एमिड कम ६ या १० । यकृतमें दर्द तथा पित्तयुक्त पतला दस्त होनेमें पोडोफाइलम ६ । पेट कुछ फूला हो चौर पेटमें मद्य गड़गड़ कल कल शब्दके साथथोले रंगका दुर्गन्धयुक्त पतला दस्त थोड़ा हो तो चाइना ६, १० । फेरम चौर चाइना एकके बाद दुमरा, पर्यायक्रममें देनेमें उदरागम चौर दुर्बलता दूर होती है । चटपटा घेष्मामय कभी रक्त मिश्रा हुआ मल, यकृतमें दर्द, कुछ मपेट चौर वीर्जों पायों चौर मर्हमें दुर्गन्ध इन मक्षणमें मार्क-थम ६ । कुछ काले रंगका पतला दस्त होनेमें कमटस या रिमिनाम ६ । रक्त दस्त होनेमें आर्बोभिन्न ६ । चौर साल रंगका दस्त हो तो इपिकाज ६, या १० ।



भेज ३ । मुँहमें थोड़ा-समुझमें घाय होनेसे यमिह नाइदिक ३,  
दिपरमनकर ३, या काब्योभेज ३, पाँखमें घाय होनेसे  
चायना ३, मलफर ३०, घनमिट्टिना ३ ।

(अ) कुमकुम प्रदाह ।—ऐकोनाइट ३ थोर कमफोरम ३

इसका प्रधान औषध । इस घत्यका “कुमकुम” प्रदाह  
 देखी ।

## प्रे ग ( महामारी ) ।

### PLAGUE

सिगर देश इस महामारिका सतिका गृह है, जसमे कम  
 २४०० वर्ष हुए होति कि उस देशमें यह रोग उत्पन्न हुआ  
 था । १६०१ छट्ठामे १८३३ मदी तक इसका पराक्रम प्रकाश  
 हो रहा है । १८१४ मजमें मना जाता है कि हमने भारत-  
 दर्यमें घातमान किया । जसमान महामारी १८१६ हो की  
 में भाइ मने यह कुमजरी विमारी है । एक प्रकारका विष  
 किसी किसीका सत है कि काहा । किसी  
 किसीका सत है जसमानका सत । जस या भास  
 हान हाहामें जसमे यह रोग पड़ा होता है । रोगकी  
 यह लक्षणसे जसमे हाहामें विष प्रवत जसमे मुहमें





विशेष करके आक्रान्त होता है पर्याप्त सूखी म्यामो कनेजिमें ददे, मांस मेनेमें कट इत्यादि भक्षण दिखार देते हैं ।

४। इन्टेस्टाइनल (Intestinal) ग्रेग ; इसमें चन्दाई विशेषरूपसे आक्रान्त होता है, पर्याप्त पीठ, पेटू और कमरमें ददे होती है । पेट फूल जाता है । दस्त के इत्यादि भक्षणोंको अधिकता दिखार देती है ।

प्रतिषेधक—एक इन्नेमिया-बीन (Ignatia-Bean) बीचमें छेद करके सुत बांधकर दाहिने या बायें बाँहमें पचवा कमरमें पट्टा देना चाहिये ।

## चिकित्सा

१। चटुगवस्था—इन्नेमिया १ ।

२। ज्वरावस्था—

(क) मान्धर्म ( बहना भहना रहने ली ) बेन्नाडोना ४ ।

(ख) पूर्ण विकारमें, जिस समय रक्त दूषित होकर सुहोई मज दस्त आक्रान्त हो जाय ( पर्याप्त भिष्टिभूमिक भक्षणमें ) ग्यात्रा ७. ४ ।

(ग) गिन्टो निरुक्त चार्नेमें ( पर्याप्त चिडकोनिक भक्षणमें ) ग्याडियामा १५ भक्षण और ग्याडियामा १५ गिन्टोके उदर मसाना चाहिये । इस चोटधर्री भगानेमें गिन्टो घंटभरती है और ददे ज्वरटो पावाम जाता है ।

(घ) पुनःपुनः आक्रान्त होनपर (अर्थात् मृमोनिक

लक्षणमें) -- फमफोरम ६, ६० ।

(ङ) अन्तर्ही आक्रान्त होनपर (अर्थात् इगरे-ट्रांसन्याम

लक्षणमें आर्मेनिका ६, ६० ।

(च) हिमाद्र (Collapse) होनपर हाइड्रोमियानिक

एमिड ६ ।

कोव्रा या न्याजा ६ विचूर्ण इस रोगकी प्रधान दवा है ।--

निम्नलिखित लक्षणोंमें यह विशेषरूपमें उपकारी होता है :--मव अर्द्धीमें पीड़ा, बेचैनी, मांस सेनेमें कष्ट, अवसन्नता (निशाखीरोंकी भाँति) संज्ञाशून्यता, जीवनीशक्तिका घटना, रक्त निःसरन, लुप्तनाडो, मव शरीर नोला । निगलनकी शक्ति नहीं रहने पर यह औषध हाइपोडार्मिक पिचकारों द्वारा रोगीके शरीरके चमड़ेके भातर प्रवेश कराना चाहिये । उपर लिखे लक्षणोंमें डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार निम्न लिखित औषध अवस्था विशेष विचार करके प्रयोग करनकी सलाह देते हैं इन्फेमिया, गैकोनाइट, वेलाडोना, कोव्रा, कोटेलाम, लैकैमिम, इलेफ, फमफोरम आर्मेनिक, माखरियम करोमा इभम, व्याप्टिमिया, काव्वालिक एमिड, गर्ण्टमोनियम टार्टरिकम्, काव्वाणनिसेलिस, काव्वाभाजटैवलिस, पाइरोजेन, एन्थ्रामिनम्, कैलिफम, लर्यामिन, डाम टका, एडलान्याम, म्यूरियार्थिक एमिड फाइटोलाका, ओपियम्

भिराम, चोपियम, हाइपो-मायसम, ट्रामोनियम, इपिकाक ऐण्डिसक्रूड, हेपार-मान्फ, मिनिक्का, चोर आडियामा ( *Vide Calcutta Journal of Medicine for Nov 1897 & Sircar's Plague 3rd Edition* )

चानुषट्टिक चिकित्सा ।—रोगीको इशदार घरमें रखना चाहिये । दूध, मासु, बार्नि चाराफट, मांस या मसूरकी दानका जूस रोगके समय ( चावश्यक होनेमें विचकारो हाग ) दिजाना चाहिये । पकजानेमें गिल्ट्रीके उपर पुन्टिम देना चाहिये चौर फट जानेमें या ( चारे जानेमें ) कैलेण्डूना का तेल फटे हुए जगहमें लगाना चाहिये ।

### ज्वर ।

गरोरकी तरकीका बहुतानाहीं माधुरगत: "ज्वर" कहा जाता है । गरोरके किछा चंग हा यस्वता मदाह, या किछा तरकमें कोई विष रक्तमें मिस्र जानेके कारण ज्वरकी उपपत्ति होती है । ज्वर बहुत तरकका है । उसमें सामान्य ज्वर, एकज्वर, रविगम ज्वर चोर साविपातक विचार ज्वर हम देखने में पवन है ।



लक्षण ।—पहिने थोड़ा जाड़ा मानस होना, पीछे कंपकंपी हो कर ज्वरका आरम्भ होना । कभी जाड़ा कभी गरमी मानस होना, बदनमें दाह, चमड़ा सूखा और खुटड़ा, बचैनी, प्यास, जोभका सूखना और मफेद, नाड़ी तेज मांसका जोगमें चलना, पेशाब थोड़ा और लाल, कमरमें तथा पीठकी रीढ़में दर्द । कभी कजियत कभी सूत्र दृप्त होना, मिरमें दर्द, चर्बि इत्यादि हमरे प्रधान लक्षण है ।

चिकित्सा । एकोनाइट ३१ ।—नाड़ी मृच्छा, तेज, कठिन और छद्मलती हुई । बदन उष्ण और गूष्क । कभी जाड़ा कभी गरमीका मानस होना, बारबार हिचकी और बचैनी, मिरमें बड़ा दर्द, मांस तेज, रगतमें रोगका बढ़ना और सामान्य प्रमाण । गर्भकी नाड़ीका चलना, पर्मोना होनेमें एकोनाइट बन्द कर देना चाहिये ।

बेनेडोना ६, ३० ।—साथ और गर्भकी मामोमें जमन, थोड़ा जाड़ा, चखल दाह, पर्मोनाका न होना या थोड़ा होना, चर्बि लाल, नींदका न चाना, प्यास, मूत्र और पीठ मूखे । एकोनाइटके मत्र भस्मकी माघ यदि चखल दाह और मिरका दर्द हो तो यह एकोनाइटके माघ पर्यायक्रममें खिनाना चाहिये ।

बायोनिडा एमडा ६, ३०, ३० । मिरका भारी मानस होना, गर्भकी मिरा, मिर, गरदन, हाथ, पंख और पीठमें दर्द ।



## मैलेरिया जनित सविराम ज्वर ।

### INTERMITTENT FEVER

यह ज्वर संशान्तिमें अधिक होता है । इस ज्वरमें धीरे धीरे पित्तही यज्ञत आदिकी हृष्टि, पाथीका बोखार, हठ्ठोका ज्वर दोनी गामका ज्वर, शीघ, उदरी इत्यादि बहुत तरहकी कठिन रोग उत्पन्न हो जाते हैं । इसीमें सब ज्वरोंकी चिकित्सा एक साथ ही निम्नी गई है ।

ज्वर कुछ दिनों तक छूट कर फिर आ जाये तो उसे सविराम ज्वर कहते हैं । प्रतिदिन एक बार आकर यदि छूट जाये तो उसको एकाहिक या दैनिक ज्वर कहते हैं । आड़ा बोखार (पाथीका ज्वर) एकदिन अन्तर देकर यदि ज्वर आये तो उसे हाहिक । दो दिन अन्तर दे कर आये तो साहिक और तीन दिनोंका अन्तर हो तो चतुर्साहिक ज्वर कहते हैं । दिन रातमें दो बार यदि ज्वर आये तो उसे होकाभीन ज्वर कहते हैं । यह होकाभीन ज्वर अत्यन्त कठिन होता है । इसकी दवा बड़े ध्यानमें करनी पड़ती है । पित्त जनित ज्वर एक दिन अधिक और एक दिन कम आता है । कोई २ ज्वर निय एक ही समयमें आरम्भ होता है और किसी किसीमें जिस समय आयेगा उसकी स्थिति नही रहती । कोई २ ज्वर आज एक समय आयेगा तो कम दो चण्डा दहिमें आ

जायेगा। यह ज्वर भयंकर होता है। र्मीका उन्हा यदि दो घण्टा बाद आवे तो अच्छा होता है।

प्रधानतः कुडनाइनके अपघ्नवहारेमें ही झीहा और यकृत की दृष्टि होती है तथा शोथ और उदरो भी आरम्भ हो जाता है।

मेलेरिया एक प्रकारकी विष मिनी बुई हवा है। यह विष गले हुए उद्भिज की भाष है।

इस ज्वरमें साधारणतः तीन अवस्था देखी जाती है—शीतावस्था, उष्णावस्था, घर्मावस्था (पर्मोना चलना)। शीतावस्थामें पहिले शीत, फिर कंपकंपी। कभी २ एक माघ ही शीत और कंपकंपी इतने जोरकी होती है कि शीत लहाफ उठाने परभी जाड़ा कम नहीं होता। बदनमें दर्द, मांसमें दर्द, प्यास, कभी मूछा खांसी भी इसमें होती है। उष्णावस्थामें प्रायः सिरमें दर्द, मुंह लाल, बदनका चमड़ा मूछा, प्यास, मांस लेनेमें कष्टः बदनकी गरमी १०१से १०७ डिग्री तक हो जाता है। बदनमें दाह होने ही से जाड़ा कम हो जाता है। कई एक घण्टेके बाद घर्मावस्था अर्थात् पर्मोना आना शुरू होता है और ज्वर छूट जाता है।

चिकित्सा।—लक्षणकी ओर विशेष दृष्टि रख कर चिकित्सा करना चाहिये क्योंकि उपरोक्त सब प्रकारके ज्वरोंकी दवा एकत्र लिखी गई है। ज्वर जिस समय न रहे उस समय दवा खानी चाहिये।



यूपेटोरियम-मार्फी ३ । ज्वर चानेके पहिले ही जी मिचलाये और पीठमें आड़ा मानूम हो कर ज्वर चारम्भ हो; आड़ा लगनेके पहिलेमे लेकर ऊष्मावस्था तक प्यास, पानी पीनेके साथही को, पित्त बमन और ऊष्मावस्थाके बाद सामान्य पसीमा चाना । हड्डी और जोड़ोंमें दर्द । दर्दसे रोगी छटपटाये परन्तु करघट बदननेमें पीड़ाकी शान्ति न हो ।

थामेनिक एल्बम ६, १२, ३० ।—पुराने विषम ज्वरमें तथा उसके साथ ही साथ ग्रीहा और यकृत आदिकी यदि हडि हो तो थामेनिक से बढकर कोई दूसरी दवा नहीं है । विषम ज्वरमें जिस समय ग्रीह, दाह या ऊष्मावस्थाका विकास न हुआ हो या कोई एक प्रयत्न हो या किसी एकका अभाव हो, पसीमा न हो, दाह अवस्थाके बहुत देर बाद बहुत पसीमा हो, ग्रीहा और यकृतकी हडि हो, ज्वरके समय अस्थिरता अधिक हो । दर्द अधिक हो अथवा रोगी बकता हो, -और ज्वर छूटने पर भी इन सब उपमर्गोंके साथ दुर्बलता और अवसन्नता हो तो यह दवा विशेष फलप्रद है । एक दिन, दो दिन, तीन दिनके आड़ा बोखारमें प्रतिदिन दो तीन बार ज्वरमें, कुइनाइनके अपस्थवहार जनित विषम ज्वरमें, छड्डीके ज्वरमें ग्रीहा यकृत मयुक्त पुराने ज्वरमें शीथ हो तो, यह बड़ा गुणकारी दवा है । हाथ पैर ठण्डा हो



पीछे प्रधान लक्षण जब मव स्पष्ट प्रकाशित हो जायेंगे : तब उसी लक्षणके अनुसार दवा देने की चाहिये ।

सुविख्यात डाक्टर जार कम्पज्वरके प्रारम्भमें केवल इपिकाक ३० मिर्क एकघर प्रयोग करनेकी मलाह देते हैं। बहुत जगह इसी तरह व्यवस्था करनेसे बहुत अच्छा फल दिखाई दिया है ।

इन्ने मिया ६, १२, २० ।—विषमज्वरमें, शीतकी अवस्थामें, प्यास, दाह अवस्थामें प्यासका अभाव, बाहरी गरमीसे शीतका उपशम ; बाहर ठण्डा, भीतर गरम या भीतर ठण्डा और बाहर गरम, दाहकी अवस्थामें माथा भारी मानस होना, सुखमण्डन मूखा इत्यादि लक्षणोंमें इन्ने मिया प्रयोग करनेसे अच्छा फल होता है । मविराम ज्वरमें मव चढ़ीमें खुजली, बदनीमें प्यासवातकी तरह घमांगी। चेहरके एक भागमें बड़ी दाह ; पसीना कम या केवल चेहरेही पर होना ; तीमरे पहरकी मव चढ़ीमें बड़ा गरम मानस होना लेकिन प्यासका न होना इत्यादि लक्षण है ।

एण्टिम् कूड ६ ।—विषमज्वरमें नाडीका वेग नियमित होना, बड़ी भर्दी, ऐसा तेज कि गरम मकानमें भी उसका कम न होना प्यास विनकुल बन्द, रातमें परो के तनुवेका ठण्डा हो जाना, सुबहकी जागनेके समय पसीना, जीभ भारी, कोष्ठबद्ध



दाढ़ और बारबार खासपखास लेना, फिर शीतावस्थामें बूंद बूंद पसीना होना । बड़ी प्यास पीठमें दर्द, तलहट्टी बरफकी भांति ठण्डी ।

चायना । ६, १३, ३०, २०० । नाड़ी शुद्ध दृढ़ तथा अनियमित; बाह्यार्क चर्ममें नाड़ीका वेग कम तथा तन्द्रा-वेश, झींझा तथा यकृतकी रुद्धि और दर्द; जलकी भांति गीदकी तरह चटचटा या पित्तमिना बुधा उदरामय; शीत और उष्णावस्थाके पहिले या पीछे प्यास; स्वर चारम्भ होनेमें ही हृस्विण्डका धक धक करना, मिरमें बड़ी दर्द; बाहरकी सब घिरायेका फूलना; शीतावस्थामें मिरमें दर्द; मर्माङ्गमें शीत, वमनोद्यम तथा प्यास बन्द, दाहकी अवस्थामें मुँह और पीठ सूखे तथा उनमें जलनका मामूम होना, दाहावस्थाके बाद प्यास और खूब पसीना । कुरनाहनके अपव्यवहार जनित विषम स्वरमें चायनामें कोर फल नहीं होता (कदाचित् चायना २०० कुछ लाभ करे) । चायनाके लक्षणवाला स्वर रातको कभी नहीं आता ।

जेनमिमियम १८. ६ । नाड़ी चीज, कोमल और दृढ़; पीठमें शीत देकर स्वर चारम्भ, पीठमें या मत्र पट्टीमें दर्द, गेज दो पहरको स्वरका चारम्भ होना; हाथ पैर बरफकी भांति ठण्डा, मस्तक गरम तथा घेहरा खान होना इस अवस्थामें

रोगी स्थिरभावमें पड़ा रहता है ; प्यास प्रायः नहीं रहती ।

मक्खभमिका ६, १०, ३० । सुबहकी अनिशाते ज्वरमें, दोपहरमें, शामके बह्य या रातकी ज्वर आते ही हाथ पैरोंमें श्वसना; भातर मर्दों, बाहर गरमी या भीतर गरमी और बाहर मर्दों, अत्यन्त ठांहावस्थामें चोटनेका बह्य हटाने पर मर्दों मगना ; दर्शनछूटा, मांसका भारी मालूम होना, कीठबह्य हाथपैरके नख नीले ; बाहरकी गरमीमें भी आड़ाका कम न होना शीतावस्थामें कंधकंपी देकर आडा ; पाना पीनेमें आड़ाका बढ़ना ; शीतके पहिने तथा पीने गरमी ; सुबहकी या शामकी छोड़का पसोना ।

नेडम-प्युरिफिकन १० । १०-११ बजनेके समय बड़ा आडा तथा प्यास लिये ज्वर आते और उमरे बाद निम्ने दहें ; अगर बड़ा ही सुस्त ; आडा और बहनकी दहि और दहें ; ज्वरके दृष्टनेपर निस्तेजभाव और बहुत पसीना ; कुहनाइन या चर्मनिशके अत्यन्तद्वारजित ज्वरमें ।

एम्मेटिका ६, १०, ३० । पाकालके शिपकी शिज-  
वपना या ऐमिक ज्वरमें, दोपहर एक दहमें १ बहने शीत  
ज्वर आता ; आडा और बहनकीका शिजवपन दहना ;  
उमावायम्मा छोटी, प्यासका मद्य न रहना ; शिज ज्वरमें ही

बड़ी गरमी, विशेष करके सुबह और शामको ; हाथ तथा पैरों में जलन ; कभी कभी जाड़ेके थोड़ी-ही देर बाद गरमी ; या दोनों साथ ही मान्द्र होना ; एक पार्श्वमें विशेष करके केवल चेहरा पर पसीना ।

फिरामेन्ट ६. ३० । कुश्नारनर्क अपव्यहार जनित त्रिषम च्चरमें , विशेष करके झींझकी हडि और माथ ही माथ शीथ तथा उदरामय ; पूर्ण और कठिन नाड़ी क्षण क्षणमें जाड़ा और कंपकंपी , शरीरको गरमी मान्द्रसे भी कम ; रक्तशून्य या पीले रङ्गका शरीर ; छाया हुआ पदार्थ बमन । बहुत देर तक स्थायी पसीना ।

पयिम-मिल ३. ६. ३० । नाड़ी पूर्ण और द्रुत ; घोंठ, कमर और यकृत म्यानमें पीड़ा, मुँहका स्वाद तीता । कौभ पीना ; माथा भारी और उसमें दर्द ; कभी जाड़ा कभी गरमी मान्द्र होता ; पित्त आदि बमन या बमन करनेकी इच्छा , खांसीमें बड़ा कष्ट ; शामके यकृत दाहिने पट्टमें शीत , खुले जगह की अपेक्षा कोठरीमें अधिक जाड़ा मान्द्र होना ; प्यास ; मन्दाक गरम ; कभी अधिक पसीना ।

मिराडम भिगिड ११-३ । नाड़ी पूर्ण, द्रुत, कठिन और चहलती हुई, बदनकी गरमी तेज ; हृत्स्पन्दन प्रबल ; बमनोर्ध्वगके साथ जाड़ा ; प्रबल आग्नेय ; माथेमें रक्त मण्डप ।

नारंगी पोस्टिम १०, ३० ।—तीसरे पहरकी ४ घंटे

ज्वर आकर रातकी ८ घंटे हटे, कंपकंपी जाड़ा अधिक ;  
सब चीजोंमें मर्दी जानूस होना ; कीठबह, पेटका फूटना,  
यकृतके स्थानमें दर्द, दाह ।

मिठुन १५, २५ वा ३० ।—मस्तिष्कमें रक्त सञ्चय ; पसीना

घोड़ा या पसीना बिम्बकुल इन्ध, जाड़ा और कम्पकम्पी देकर  
ज्वर और नित्य एकही समयपर ज्वरका होना और ठीक  
एकही समय तक रहना ।

पथ्य ।—नये ज्वरमें ज्वरकी प्रवृत्तताके समय रोगीको  
ठण्डाशन होइकर और कोई चीजें पच्य न देनी चाहिये ;  
ज्वर हट जानेपर मागू, आरगोट, डानी, बिदाना, मिंघाड़ा,  
मिर्ची इत्यादि लघुपच्य देना चाहिये । पुराने या पारीके  
दोषारमे—ज्वरके दिन लघुपच्य और नारंगके दिन पुराने महीन  
चावलका भात, महर्नीका शोरवा और घोड़ा दूध देना चाहिये ।

## सान्निपातिक विकार ज्वर ।

(Remittent fever with Typhoid Symptoms)

यह ज्वर अधिक करके शरीरके भीतरी भाग पर आक्रमण  
करता है, इसलिये इसे आन्तिक ज्वर भी कहते हैं ।  
इसका दमरा नाम वातश्लेष्मा विकार है । पुराना मझा हुआ  
गुह, नानी (Dingo) और गले हुए मुर्दोंमें एक प्रकारका



विष निकलता है जो इस रोगके उत्पन्न करनेका प्रधान कारण है। यही विष शरीरमें प्रवेश करनेपर भी ५।७ दिनोंतक इसका कोई उपक्रम दिखाई नहीं देता फिर रोगका विकास होता है, उस समय रोगी शय्यागत होता है और नीचे लिखे उपक्रम होने लगते हैं—पेटका फूलना, पेट दबानेमें दर्द, यकृतके नीचे चट्नीमें दबाने पर एक प्रकार शब्द होना, उदरामय, और कभी कभी चंतड़ीमें रक्तका निकलना। पित्तहीका बढ़ना, चायलका धोचन, या दालके पानीके तरह मल, मांस लेनेमें ऐसीनियाजो गन्ध, मस्तकके चर्म दर्द, मायाका भारी माम्बुम होना, जानमें भों भों शब्द होना, नींद न आना, कभी कभी नाकमें रक्तका गिरना, अस्थिरता, बकना भकना, नींदमें चमक उठना या सुपचाप चाखि चाधो खुर्ची हुई रहना, इस ज्वरके चारम्भमें अन्त तक, पेट, पीठ, छाती, हाथ, पैर, और मुँहपर लाल लाल दाने दिखाई देते हैं, दिशाव नाल और थोड़ा होता है। रोगके पहिले ५।६ दिन शामके पहिले शरीरकी गरमी १०० में १०२ डिग्रीतक बढ़ जाती है पर सुबह को ज्वर कम हो जाता है। ७।८ दिनके बाद शरीरका उन्नाप १०१ में १०४ डिग्री तक होता है। २।१ हफ्तेतक ऐसाही रहकर यदि शरीरकी गरमी कम हो जाये तो अच्छा भक्षण समझना चाहिये, और बढ़ जानेमें बुरा। इस ज्वरमें चंतड़िया छिन्न हो जाती है और चन्दावरणकी भिन्नी मदाहशिशिट

होमियोपैथी ।

होकर नृविकार, पुमपुमप्रदाह इत्यादि हो जानेसे रोग  
मर जाता है । जीभ पहिने मरम, फिर मैनी और लाल  
रंगकी हो जाती है । इन रोगका भोगकाल साधारणतः  
२१ से ४२ दिन तकका होता है ।

**चिकित्सा ।**—घार्मेनिक ६, १२, ३० ।—दुत कठिन

नाड़ी, अत्यन्त अचमत्कता, शरीरका चमड़ा रुखड़ा, ज्वालाकर  
दाह, पसीना ठण्डा बड़ी ध्यान लेकिन छोड़ेहो पानीमें छिपि,  
प्रदाहयुक्त लालवर्ण जीभ, बदनमें घर्माँरी और मायही अतिमार ।

घार्मिका मण्टेना ११, ६, १—नांस नेनेमें दुर्गन्ध, शरीरमें  
लाल, काली तथा पीली घर्माँरियां, मनका भाव कहने तथा  
समझानेमें असमर्थ, प्रलाप या अचेतन अवस्था, बिहानी कड़ा  
मानस होना और बार बार करवट बदलना ।

एनिड फस, ६, ३० ।—कम्यकर्म्य और जाड़ा, ध्यानका  
अभाव, हाथ पैरकी अंगुलियां दरफकी भाँति शीतल, दाहकी  
अवस्थामें बड़ी गरमी लेकिन ध्यानका न होना, भीतर गरमी  
और बाहर जाड़ा, रातकी और सुबहकी अधिक पसीना  
पाना, दृनर औरधोमि विकारका उपशम होनेपर भी बल  
दुर्लभके लिये इसे देना ।

एनिड न्यूर ६ ।—स्वायविक क्रियाकी विलक्षणताके कारण  
अचमत्क, गलेमें घाव, हाथ पाव ठण्डे, जाड़ाका सहन  
शोना, नाड़ी धीमा और दुत, पीठोपर मरुद रगने, राने,

मुँहमें घाव, उदरामय, गुप्तावरक पेशीमें पचाघात और शरीर पर दाने होना ।

कार्बोभिज ३ बिचूर्ण या ६, १२, ३० ।—हाथ धेर ठण्डा तथा पथीना ठण्डा, ममस्त शरीर शीतल, जिन समय रोगीके जीवनी शक्तिका काम हो, दृष्टि शक्तिमें भी व्यतिक्रम हो और कान बहरे हो जायें ।

वैपटेशिया १५, ३० ।—नरम, मोटी और भी द्रुत नाड़ी, प्रलाप, गिरमें दर्द, वदनमें दर्द थोड़ा और जोभ सूखी, चम्बिरता, अचेतन्यता, शय्याका गड़ना, गलेमें घाव सांस लेने तथा छोड़नेमें दुर्गन्ध, वमन या वमनीयम इत्यादि लक्षणमें ( रोगकी पहिली अवस्थामें ) ।

प्रायोनिआ पैम्प्रा ६, १२, ३० ।—मुँहका स्वाद तीता, जोभ रुखड़ी तथा मैली, गिरमें अमल वेदना, खाँसी और पश्चरमें दर्द इत्यादि लक्षणमें; विकार यदि धीरे धीरे मानूम हो तो प्रायोनिआ और यदि तेजीसे विकार बढ़ता दिखाई दे तो काम-टका देना चाहिये ।

वेन्नाडोना ६, ३० ।—गिरमें दर्द, मुखमण्डल लाल, गलेके शिराका स्पन्दन, अक्षुतारा विस्तृत, प्रलाप, चौककर उठ बैठना, दाँत में काटने को जाना ।

कामटका ६, ३० ।—पेट फूलना, पेट दर्शनमें दर्द अचानकता, अवमयता, बीच बीचमें अलसत् प्राममय अतिमार,

विचारका भूलजाना, गतको अस्थिरता, टिकने तथा, गमती तथा जाड़ा देकर ज्वरका जाना, एक पार्श्वमें पसीना ।

मेराइम ऐन्ड्राम् ६, १०, ३० ।—इच्छा न होने पर भी खावलीके धोइनकी भांति ठण्ड, दमन तथा दमनोद्यम, उपर ठंडे, पसीना ठण्डा, नुंगत निम्नेज ही जाना ।

मार्कुरियम मम ६, विदूर्ण ३ ।—घन्टीकी पन्दिमें घाव होकर रह बहना मायही ज्वरकी दृष्टि, जीभमें चमक, मुँहका स्वाद तीता या फीका, गलेमें या दांतोंके चट्टीमें घाव ।

हाइपोमाइमम ३, ६ —ठुन, पूर्ण और कठिन नाड़ी, मुखमण्डल उत्तम, गर्गारका झिलना, धीरे धीरे प्रत्याप, विशादनका कपड़ा इत्यादि खींचना और एकाएक दिहावन परने लाग जानेकी चेष्टा, आरही मलमूत्रका निकल जाना ।

टैरेबिन्दिना ६ ।—घन्टीमें रह बहना, मूत्रका रुकना ; आमाश्वमें ज्वला, आम और ज्वरवत् मल, नाकमें रह निकलना, गैरके उपरान्तके समय पर दृष्टि घन्टीमें घाव ही और उमैके कारण दृष्टि बार बार ठण्ड हो तो टैरेबिन्दिना प्रयोग करनेमें विशेष लाभ होता है ।

रीरका उपरान्त होनेपर दुर्बलताको नाश करनेके निधि ऐनिड फल ; आइला, ऐमोनकार्ब, नल्लमनिका ।

पथ्य ।—रीरके समय ठण्डा पानी, चवड़ा मण्ड, मादू, दानी, आगरोट, गीरी अथवा दुग्ध ही जयितोमागुर

मज्झीका मोरवा या थोड़ा दुध । रोगी कभी चक्रेला 'न  
रखा जाय ।

## हामज्वर—(Measles).

यह बहुत ( मज्झीकासक ) होता है । लड़कोंको जो  
यह रोग हो जाता है और युवकों को कभी कभी होनेमें  
बड़ा कष्टित हो जाता है । गौत चयवा बमलज्वरमें  
हम रोगको उत्पत्ति जानें है । हमका विष गरीरमें  
पेय्य हो जानेके १-११२ दिन बाद मदी, खाँसी और  
हँसि ब्यादि होना है । मारुमें पानी बहता है चरि  
मान तथा पानीमें भरी रहना है, कथाममें ददं तथा व्याभंग  
दुध खाँसी हो जाना है । गिरमें तथा पीठ, हाथ और पैरमें  
पीड़ा देखर ज्वर पाय्य होना है फिर ४-५ दिन बाद चाम  
होना है । ३१४ दिन चाम रहने पर पायकी गायब हो  
जाता है और ज्वरभी हट जाता है । तत्कालक यह ज्वर  
पाय्य मरीरको मरु १-१५ म १-१ दिवस तक बढ़ जाना है  
और रोग भयंकर पाय्य पाय्य करना है । उभा समय रोगी  
बहना ददं करना है और मरु भी पा दवाना है । चरनि,  
बमल, बमनीदम, कोटकर या ददनामग, भाँसको भाँसमें  
अपन, पुनपुन ददं, मारुबट ब्यादि मय्य दिपाई देने  
मरु है । किमे किमे रोगीको चरिमान या चरनिमान

होकर जीवनमें संशय उपस्थित हो जाता है। हान बैठ जाना या प्रतिश्रुत लाभ या काला रंगना हो जाना मन्दगतर नृपक है ।

**चिक्किता** ।—मानस्य हानने चिक्किताको बोधं प्राप्तिवकता नहीं है ।

**ऐकोनाइट १. ३ ।**—एतन्त ज्वरः पूर्णं, कठिन और तीव्र नाड़ी, वाग्भार हीन, मज्जु इन्तु, कण्ठमें दर्द, मूछी खांसी, गला खन खन करना, जोठबड़, दहसलने दर्द, शूलिरता ।

**एननेटिना ३. ६ ।**—( प्रतिषेधक ) शानके वह और शानको खांसी बढ़ना और रना बड़ बड़ करना, नाकमें गाढ़ा केन्ना बहना तथा वह निकलना, इहरानय, पाकायकी विलहरता ।

**ऐनेडोला ३. ६ ।**—पूर्ण, कठिन नाड़ी, आंख और चेहरा लाल, खांसीके मन्द खरगानीमें दर्द, खरमंग, मज्जु उन्नय, तन्द्रामें रहना पर नींदका न आना, हटात् चमक उठना ।

नाक और आंखमें दर्द पालिशिरे तो **दुजेरिया ३ ।**—दमन या दमनोदमके नाक हरे रंगका पालनय दमन और मूछी खांसी हो तो **इपिकाक ३ ।**—रोग उपरम हो जाने पर भी यदि मूछी खांसी रह जाय तो **एनफोरन ६ ।**—हान पूर्ण-

तथा लोप न होकर बैठ जाय या कुछ रह जाय तो आयोनिया ६ ।

**आनुषङ्गिक उपाय ।**—छोडे गरम पानीमें कपडा भिगाकर बदन पोछ डालना चाहिये । रोमीके शरीरमें ठण्डी हवा न लगनी चाहिये । ज्वरके समय ठण्डा पानी, वाली, मिश्री और थारारोट इत्यादि पथ्य देना चाहिये ।

---

**वसन्त या मसूरिका (चेचक) (Small pox).**

वसन्त (चेचक) बड़ाही कठिन तथा छुतहर रोग होता है । वसन्तबीज (विष) शरीरमें प्रवेश होनेमें हमकी उत्पत्ति होती है । यह प्रधानतः दो तरहका होता है संयुक्त और असंयुक्त ।

**संयुक्त वसन्त ।**—२।१।४ या इसमेंभी अधिक दाने बदनमें एक माघ रहनेमें उमकी संयुक्त वसन्त कहते हैं । इसी तरह गोठियां दाने एककर उममें घीप होजाता है, चेहरा, गला, माथा, नाकके भीतर होनेमें सांघातिक होता है । यह विष शरीरमें प्रवेश करनेके ११।१२ दिन बाद ज्वर आता है । इस ज्वरमें घीत, दाह, मय शरीरमें दर्द, बमन इत्यादि उपमर्ग दिखाई देते हैं । ज्वरके दो तीन दिन बादही दाने बाहर निकल आते हैं । १।६ दिनके बाद इसमें

पानी भरकर पीप हो जाता है और ८।१० दिनके बाद दाने सूखने लगते हैं । इस रोगमें ज्वर अधिक होनेसे बहुतसे रोगी मर जाते हैं ।

**असंयुक्त वसन्त ।**—दाने अलग अलग दिखाई दे तो उसे असंयुक्त वसन्त कहते हैं । इसमें ऊपर कहे लक्षण दिखाई देते हैं पर ज्वर उतना प्रबल नहीं होता इससे यह भयंकर नहीं है ।

**चिकित्सा ।**—वसन्त रोगकी प्रथम अवस्थामें दानोंमें यदि रक्त बहे और रोगी अवसन्न हो जाय तो वैपटेगिया ३५ देना चाहिये । पीठ या कमरमें दर्द, द्रुत नाड़ी, प्रबल ज्वर और जलवत् दस्तमें भेराइम भिर ३५ पीप भरे दाने, सांस नालीमें दर्द, वमनेच्छा वा वमन, ज्वर इत्यादि लक्षणोंमें ऐण्टिमार्ट ६ या १म क्रमका विचूर्ण । इस रोगकी सभी अवस्थामें यह दूसरे औषधके माय पर्यायक्रमसे दिया जासकता है । दूसरी अवस्थामें ज्वर, दानोंमें पीप, गलेमें घाव, रक्त मिश्रित आममय अतिसार, इत्यादि लक्षणोंमें मार्कमल ६ । दाने पूर्ण तथा यदि बाहर न हो या एकाएक बैठ जाय तो रुविनीका स्त्रिट कैम्फर या जेलसिमियम १५ प्रयोग करना चाहिये । गौ-जीजसे छपवानेके बाद यदि दाने बाहर हो और उसीसे और और उपसर्ग प्रकाश हो तो घूजा नूल परिट । दाने पकनेके समय यदि साक्षिपातिक लक्षण प्रकाश हो तो



कामटक ३० प्रयोग करना चाहिये । दाने बाहर होनेके बाद चेहरा और दानेके चारो तरफका स्थान सब धूम जाये और रात्रिमें उसमें खुजलीकी वृद्धि हो तो पघिम-मेम ३५ । दानेमें पीप होनेके बाद खरातिमारका मक्षण यदि दिखाई दे तो चार्मेनिक ६ या ३० देना चाहिये ।

**पानुपट्टिक उपाय ।**—जिम घरमें हवा चाली हो उसी घरमें रोगीको रखना चाहिये । बार बार रोगीका शिक्कादन बदल देना चाहिये और सदा रोगीको कोमल गन्धापर सुलाना चाहिये । दानोमें पीप होकर मूख जानेके बाद गरम दानोमें मास कपडा भिजाकर पोश देना चाहिये । रोगके भाग समयमें मासु बार्नर चारागेट इत्यादि तथा चागम होने पर बन्को पुटिकर पोश खिलाना चाहिये ।

## पानोयमल या जलजमल ।

(Chicken pox.)

जलजमल जमल रोगके लक्षण कुत्तर रोग नहीं है । लइके और छोटे बच्चों को यह रोग अधिक होता है । जल-जमलमें आरम्भ बहुत छोटा दिखाई देता है । दाने बिपटे न होकर खरे और कुत्तर समान होने के समय पीप भी नहीं होता । ३-४ दिनोंमें दानोमें जल भरकर थोमे मरीचा हो जाने के पोर ६-७ दिनोंमें ही मूख जाने के । इसमें प्राण



प्यानोंमें ज्वार, तथा ज्वर भरि हुए फोले, उमके दमनकी जगह फूँधी; सब शरीरमें दर्द, फोलेमें रक्त निकलना और दाह ।

पथिम मेल ३, ६ :—रक्तपूर्ण, तप्त और दाहयुक्त फोले, यह प्रतिशय फूल जाती हैं और क्षत्रुघाति हैं, हूनी भोजनकी नाचें ददे, दाहवानों जगह ज्वार और रक्तपूर्ण न होनेपर भी मित्रोंमें मृज्ज आती हैं ।

धार्मनिक ६, ३० :—ज्वरतं हुए तथा दर्द करने हुए ज्वारे रक्त फोले, पचवा पीप भर फोले सुस्ती, बेचैनी तथा अधिक प्यासमें ।

गिर्कीनाइट १ :—विमर्षकों पीड़िता दाहर होनेके पश्चिमे ज्वर पाकर पात्रात्मक ज्वार प्रदाह युक्त हो ती ।

यदि पात्रात्मक ज्वारमें ज्वामात्र दाह और फोलेमें रक्त मिलने लगे तो कैरेरिम ६ फोलेमें पीप की जानेका हर हो तो धार्मनिक ६ तथा कार्मोभिन्न ६ । मइता हुआ दिव्यां दे तो कैरेरिम ६ । एक जगहके फोले पचने होकर दूसरी जगह उठने लगे तो वर्मटिमा ६ ।

पट्टा १ :—रक्तको प्रथम पचवाये जाय या पानिं कार्मोनाइट और पचने होने पर दवा और मादुर मइ-मैत्रा मीत्रा ।

## उपभिक्षीप्रदाह । (Diphtheria)

यह एक प्रकारका गलेका रोग है । एक प्रकारका विष रक्तमें मिल जानेके कारण यह रोग उत्पन्न होता है । सामान्य डिप्थिरियामें गलेमें दर्द, खानेमें कष्ट, गलेमें छाना इत्यादि इसके लक्षण हैं । रोग मांघातिक होनेमें पहिने प्रबल ज्वर, दस्त-कं, कम्पकम्पी, दुर्बलता, अस्थिरता, फिर भिक्षी आक्रान्त होकर लाल रंगकी होजाती है । टनमिलपन्थि और जीभ फूलकर उसके ऊपर पतला पर्दा पड़ जाता है । वह भिक्षी न निकालनेमें मांस बन्द होकर मृत्यु होजाती है ।

**चिकित्सा ।**—आक्रान्तस्थल प्रदाहयुक्त मुख और आँखें लाल रंगकी, गिरमें दर्द, गलेमें दर्द, पूर्ण और कठिन नाड़ी, कोमल तानू, गलेकी घण्टी और स्वर नालीमें प्रदाह इत्यादि लक्षण दिखाई दे तो एंकोनाइट ३x या वेलाडोना ३x पर्यायक्रममें देना चाहिये । आक्रान्त स्थानमें दर्द दप् दप्, कठिम पर्दा उत्पन्न, तालुमूल और गलकोपमें लाली, जीभ पीली, मांस लेने तथा छोड़नेमें दुर्गन्ध, कोई चीज निगलनेमें दर्द, स्तर बहुत गिरना, गला टवानेमें दर्द, इत्यादि लक्षणोंमें माक्थूरियम सायनेटाम ६ । गलेमें धूसर रंगका घाव, अव-मन्नता, मांस लेने तथा छोड़नेमें दुर्गन्ध रहेतो एमिड स्यूरिये-टिक ३ । रोगकी शेष अवस्थामें नाड़ी क्षीण; चत स्थानमें पीप या रक्त निकले तो आर्मेनिक ६ ।

## बहुव्यापक सर्दी ।

( Influenza )

वायु दूषित होनेके कारण यह रोग होता है। सर्दीके लक्षणोंकी भांति इसके भी लक्षण दिखाई देते हैं, गरीबका चमड़ा गरम और सूखा रहता है, मस्तकके मधुख भागमें तेज दर्द, नाकमें पानीके तरह कफ गिरना, आंखोंमें पानी बहना, बदनमें ऐंठन, बममोह्य, छोक और चक्षुस् दुर्बलता ।

**चिकित्सा ।—**इन्फ्लुएंज़िनम ३० एकही बार देनेमें

यह रोग दूर हो जाता है। परन्तु एकमात्रामें अधिक कभी न देना चाहिये। इसमें यदि ४८ घण्टोंमें कोई लाभ न दिखाई दे तो तुरन्त दूसरी दवा देने की चाहिये। सांस लेनेमें कष्ट, मानों मोनेमें ऐसा मान्नुम हो कि सांस बन्द होता है। नाकमें बहुत पतला, गरम तथा व्यामाकर से का प्रवाह, छींक खरभंग आंखोंमें जल गिरना, चक्कनता, चक्षुस्त्वमें शीतलता, अनुभव इत्यादि लक्षणोंमें आर्मेनिक ३। उल्लिखित लक्षणोंके साथ यदि हडिडर्यीमें तेज दर्द हो तो एण्टीरियम पार्कीनि-  
यिटम ३५। सांस लेनेमें साथ साथ शब्द होना, कष्टकर खांसी, दोआका अधिक गिरना, छड छड शब्द, कमर पीठ और गिरमें दर्द हो तो एण्टिमार्ट ३। खरनाभी और चक्षुस्त्वमें दाह कष्टकर खांसी, कभी मादे कभी पीने रंगके कठिन से साँके साथ खांसी, गैरकी पुरानी चक्कनमें फुमफुम

प्रदाह, दुर्बलता, श्रेष्ठा निकाल देनेमें असमर्थता । किन्तु  
रक्तमय या पीपुर्जा तरफ श्रेष्ठा गिर तो फमफोरम ६ । बार  
बार खांसी होनेमें हाइड्रोमियाज एमिड ६ ।

प्रतिपेधक ।—हेपेटिजिया ६ या इन्फुंटेष्टिनम ६०

निर्भ एक खुराक देना चाहिये ।

— ० —

## धातुरोग ।

वात, यक्ष्माकाम इत्यादि कितनेही रोग पिता माताओं  
रहनेमें लड़कोंको भी होते हैं इसमें इन्हें धातुरोग कहते हैं ।

— ० —

## वातव्याधि ।

### Acute Rheumatism.

लक्षण । शरीरके मन्थियोंमें यह रोग होता है ।  
कभी कभी २१ मन्थियोंमें कभी सभी मन्थियों इस रोगमें भर  
जाती हैं । रोगके प्रारम्भमें ज्वर आकर मन्थिस्थल सूजकर  
लाल लाल रंग प्रदाहयुक्त हो जाते हैं और वही दर्द हिलने  
डोलनेमें दृढ़ जाता है, बदन गरम, पसीनेमें दुर्गन्ध, कन्धकर्ष्या,  
कक्षियत, गिरमें दर्द, प्रलाप, प्यास, तथा हृत्पिण्डकी  
क्रियाकी विलक्षणता नार्डीपूर्य और कठिन, सीम मैली मूत्र  
कभी लालकभी उज्जला, इस रोगमें शरीरकी गरमी १०४।५  
डिग्रे तक बढ़ जाती है तरफ धान रोग, २३ सप्ताह

रहकर अच्छा हो जाता है, या फिर वही अपना पुराना रंग धारण करता है, इस रोगसे छूत्पिण्ड आक्रान्त होकर बायें तरफ दड़ हो जाती है, वक्षस्त्रयमें भी दर्द रहता है । मांस नेने तथा छोड़नेमें कष्ट हो तो सम्भ्रमना चाहिये कि रोग कठिन हो गया है ।

**कारण ।**—जाड़ा या मर्दी लगनेसे । देर तक गीला बल्ल पहिरे रहनेसे या पानीमें भीगनेसे तथा मर्दी भगकर एकाएक पसीना रुक जानेसे ।

**चिकित्सा ।**—एकोनारट रेडिक्स १ ।—मन्थिस्त्रय तथा पेशीमें दर्द, पल्लव ज्वर, आक्रान्त स्थानका मूजन और लाल हो जाना सुधामन्द, मूत्र लाल, तरुण वात रोगके प्रारम्भमें यह अच्छी दवा है ।

त्रायोनिया चान्वा ६, १२ या ३० ।—जाटने या सूई बेधनेकी भांति दर्द, या दवाकर धरनेकी तरह पीड़ा, सामान्य हिमने डोलनेमेंही बुद्धि, बदन गरम, कीठबूढ़, पसीना अधिक और अतिगह्व कम्पकम्पी ।

बेलाडोना १ या ६ ।—आक्रान्त स्थान खूब लाल, दप दप बेदना गिरमें बड़ी दर्द, पांखे तथा चेहरा लाल, रातकी रोगकी बुद्धि ।

कम्चिकम् १, ३ या ६ ।—(बनिष्ठ मनुष्योंकी तरुण वात में) आक्रान्त स्थान सामान्य मूजा हुआ अथवा विस्कुम्भी मूजा

दुष्प्रा न हो । आक्रान्त म्यानकी चंगुलीमें दवानमें मफेद रंग हो जाये । सुई वेधनेकी भांति दट, आक्रान्त म्यानमें पक्षाघात, रातकी हरि ।

पल्मेटिला ३. ६. दा ३० ।—मन्विन्दल सूजा दुष्प्रा और घोड़ा माल, दर्द एक जगहमें दूसरी जगह हट जाये, काटनेके तरह दर्द, जंघा, गुल्फ तथा हाथ पैरकी छोटी = मन्वियोंकी दवा कर धरनेकी भांति दर्द, और उर्मीके साथ गीत, अम्बिरता तथा नींद भी न आती हो ।

डामटक ६ ।—विश्रामके समय, रातमें, सुबह उठनेके समय और शय्याकी गरमीमें दर्दका बढ़ना, सामान्य हिलने डोलने तथा आक्रान्त म्यानमें गरमी प्रयोग करनेसे दर्दकी शान्ति, बड़ी थैनी, ठण्डाहवा असह्य, विश्राम अवस्थामें दर्दकी अधिकता ।

मिमिमिफिउगा ३ ।—बलस्थल और कटिदेश आक्रान्त हो, पीठ और वगलमें सूई गड़ानेके तरह दर्द, उत्ताप और स्तीतताके साथ पैरमें दर्द, बदन कांपना, चल फिर न सकना, सब शरीरमें अस्त्रविहवत् दर्द ।

कलोफाइलम् ३ ।—छुट छुट मन्विजात, विशेष करके हाथ पैरकी मन्वियोंमें और चंगुलियोंमें तेज दर्द, घिरने दर्द, दर्द एक जगह देरतक न ठहरै ।

पद्यादि ।—रोगकी पहिली अवस्थामें मागू, पारारोट, वालि और घोड़ा दूध भी दिया जायकता है । जाड़ा या सर्दी



भगने देना उचित नहीं है । चाक्रान्त स्थान गरम कपड़ा या रुईसे बांध देना उचित है । रोग उपग्रस होनेपर रोटी या भात खानेको देना, गरम पानीसे नहाना ।

## पुराना घात ।

( Chronic Rheumatism. )

इसमें तरुण मन्त्रि घातके सभी लक्षण वर्तमान रहते हैं । केवल मन्त्रिस्थान कठिन होता है । दर्द भी कम हो रहती है परन्तु चाक्रान्त स्थान जन्मसंशय होकर फूल उठता है ।

**चिकित्सा ।**—केलिदाइकी ६, १० । अत्यन्त तीव्र दर्दके कारण बार बार अस्थिआका बदलना, चाक्रान्त स्थान का फूल जाना तथा कड़ा होजाना, रोगीको घूमनेकी शक्ति नहीं रहती है तरुण वातरोगके बाद मन्त्रिकी दुर्बलता, गरमी रोगमें हुआ अन्त्रिवात ।

रडोडेण्डन १० ।—हात पैर तथा अर्धोंमें तथा हातके मध्यमें दर्द, स्थिर रहने पर चार घटिके बाद दर्दका बढना, चाक्षारके समय तथा चाक्षारके बाद दर्दका दब जाना, रातमें खाम करके पिछली रातमें दर्दकी हवि, घटिके पहिले थोर चीभकालमें पोडाका आक्रमण । मन्त्रिस्थानमें सूचक जानेको भांति दर्द ।

हानकैसारा ६ ।—घटिके बाद पानीमें भोजन या भोगी

जगहमें बैठनेके कारण रोग उत्पन्न हुआ हो तो, विग्रामके समय पीड़ाकी हदि, घूमनेमें उपशम, रह रह कर क्षिप्तवत् दर्द, पीठ, बांह और पैरोंकी सन्धियोंमें अधिक दर्द, पसीना, दुर्गन्धयुक्त मूत्र ।—

फाइटोत्याक्ता ३ ।—आक्रान्त स्थान भार और वेदनायुक्त तथा शीतल भी, रीझ और वर्षा ऋतुमें पीड़ाकी हदि, आक्रान्त स्थान सूजा हुआ और नाल ।

कटिकम ६, ३० ।—कन्धमें, उरु और घूटनेमें दर्द, दर्दके कारण बदन हिलानेकी इच्छा, परन्तु हिलने पर पीड़ाका कम न होना, कन्धमें दर्द होनेके कारण माथेकी तरफ हाथका न उठना शामके वक्त दर्दका बढ़ना तथा सुबहकी घटना, रातकी सुखपूर्वक न सो सकना, अंगुलीकी सन्धियोंमें दबाकर पकड़नेकी भांति दर्द ।

मार्कुरियम मल ६, ३० ।—खींचनेकी भांति हड्डियोंमें दर्द और उर्मीके साथ सामान्य त्वर, शीत बोध, आक्रान्त स्थान में अम्ल गन्धकी नाईं दुर्गन्धयुक्त बहुत पसीना, पसीना होनेपर भी दर्दकी शान्ति न होना, रातकी बिस्बावनकी गरमसे दर्दका घटना, समय समय पेट ऐंठकर आनमय मलत्याग ; गरमीके कारण उत्पन्न भये वातमें ( यदि पारा न खिलाया हो ) ।

संचिप्त चिकित्सा ।—घुटना और पैरके अंगुलीकी गाठमें दर्द हो तो पान्थ ३०, विश्रामावस्थामें रोगकी हदि

जो तो जामटक ३०, दिलने डोलनेमें बढ़े तो, मायोनिया १०,  
 छोटी छोटी मशियां चाकाल जो चोर उभीके साथ मर्दी  
 वनमान जो तो मेडम ६, रोगका भोग शेष जो चोर सम्पूर्ण-  
 रूपसे पारोग्य करनेके लिये भस्मकर ३००। कानोंके दातमें।  
कादरों चार्निका, गोदोरे, कस, मिमिमि ।

हृदयलङ्घक दातमें । प्यायजि, डिगिट, ऐको, भराइम,  
जेजटम, त्रायो ।

प्रमेहजनित दातमें । माके रिन चार्, ऐको, एमम, मामा ।

कमरको दातमें । ऐको, चार्निका, मिमिमि, मिर्कल,

एन्ड्रिमाटा, चार्मनिक चोर जामटक ।

उदरमणिक दातमें । कनोमिल, ऐको, काम, चार्म,  
मिमिमि, नच, कादरों । यह सब दवा ३५-३० कस प्रयोग  
 होता है ।

मठिया दातमें । ऐको, कनवि, कंभकाम, मैदिना,  
( तबब धवल्यामे ) एमम काम, कंभकम, कटिकम, कादरों,  
मन्थर ( पुराना धवल्यामे ) । यह सब दवा ३-३० कस प्रयोग  
 होता है ।

पय्यापट्टा । अग्निज जो चोर तेजका बदले भवन,  
 झड़भौ मम तथा मर्दगदाम निर्विह । पुराने पावनका भाग,  
 कीड़ा दूध, दम, मठिया, गोदो, कादरों, मोहनभोग इत्यादि  
 दवा देनी चाहिये ।

## उपदंश ( गरमौ ) (Syphillis.)

उपदंश बड़ा बुरा रोग है। इस रोगके रोगीमें मंगम तथा महवाममें यह विमार उत्पन्न होजाती है। उपदंशका विष शरीरमें घुसनेके १० दिन बादही यह रोग उत्पन्न होजाता है। पहिले मसुरीकी भांति लाल चकत्ते उत्पन्न होते हैं फिर तीन चारही दिनके बाद फोलीकी भांति उसका आकार हो जाता है। पहिले इन फोलियोंमें पानी रहता है पर फिर पीप उत्पन्न होकर गलना शुरू होजाता है। घावके चारों तरफका भाग लंचा रहता है और मध्यका भाग धीरे धीरे गहरा होता चला जाता है। इस उपदंशको कठिन उपदंश कहते हैं। एक प्रकारका और भी कोमल उपदंश होता है जिसका प्रान्त भाग लंचा या कठिन नहीं होता है। कभी कभी यह घाव उत्पन्न होने या सूखनेके १५ या ३० दिन बाद बांधी उत्पन्न होजाती है। कठिन उपदंशके बाद बांधी होकर प्रायः बँठ जाती है ; परन्तु कोमल उपदंशके बाद बांधी हमेशा बनी रहती है। उपदंश होने के कुछ दिन बाद सब शरीरमें खुजली तथा तारखेके रंगके लालन, चकत्ते फूट निकलते हैं। गलेमें फोड़ा, हाथ पैर तथा आंखोंमें ज्वाना, हाड़ हाड़ या मन्धि मन्धिमें दर्द, मिरके केशका उड़ना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं।

**चिकित्सा ।**—मार्कमल ३x विचुर्न ६।—उपदंशकी द्वितीय अवस्थामें जब फोड़ोंमें पीप उत्पन्न होजाता है। फोड़ा धीरे धीरे फैलता जाता है, मन्धि तथा हड्डियोंमें

दर्द, मुँह, गला और मांस लेनेकी जालीमें दाढ़; फोड़ेके प्राग्भागे कठिन, मध्यभाग कोमल और उज्जला । उपदंशके साथ प्रमेह इत्यादि हो, बाघी और दूसरे चर्मरोग तथा फोड़ेमें पतला पीपका बहना इत्यादि लक्षणोंमें मार्क-कर ६ ।

एसिड नाइट्रिक २. ६ ।—उपदंशकी पहिली चवस्थामें प्राग्भाग ऊँचा होकर अधिक रक्त बहता हो तो या लड़के लड़कियोंकी कौनिक उपदंश हो चयवा पारका अपव्यवहार होने के कारण रोगी चीख, दुर्बल और शरीरके नाना स्थानोंमें फोड़ा होगया हो, तो २ ग्राम नाइट्रिक एसिड १ पाउण्ड घागीके साथ मिलाकर रोज फोड़ा घीनेमें चक्का फल दिखाई देता है ।

कैलि हाइड्रो ३० ।—पुराना उपदंश-विष नाश करनेके लिये यह पापध अतितीव्र है, बहुत दिनोंतक गरमी वर्तमान रहे तथा साथही दातकी जड़में फोड़ा हो या मूजा हो, तालू में फोड़ा होगया हो, हाड हाड, मथि मथिमें दर्द हो, सब शरीरमें फोले और उपदंशका फोड़ा गमना दिखाई दे ।

मसफर ६. १२. ३० ।—उपदंशकी सभी चवस्थाओंमें बीच बीचमें मसफर खिलाना चाहिये, विषध करके घावका मध्यभाग पर मफेदरगका लेप दिखाई देतो ।

परम मेटालिकम २ विचूर्ण या ६ ।—मुँह और नाकमें घाव, निद्रमूलके मांसकी हडि (पुराने उपदंशमें) विगेष करके रोगी मदा दुःखित रहे और आत्महत्याको चेष्टा करे ।

कभी कभी हेपर सल्फर ६, आर्मेनिक ६, कैनी कार्बो-  
कम ६, एमिड फस्फरिक ३० इत्यादिकी भी जरूरत  
पड़ती है ।

**साधारण नियम ।**—घाव मित्य माफ करलेना  
चाहिये । जब तक घाव आगम न हो जाये तब तक  
मच्छली या मीठा न खाना चाहिये । ज्वर रहें तो लघु पथ्य,  
और ज्वर न हो तो हल्की पुष्टिकर चीज खिलानी चाहिये ।

### बाघो (Bubo).

बाघी उठे तो उम्र बैठानेकी चेष्टा न करके पुल्टिस  
देकर पकाना वो चिरना चाहिये । पर नासूर, शीष  
इत्यादि अच्छा करनेके लिये, मार्क्युरियस ६, हेपर सल्फर ६,  
आर्मेनिक ६, लैकेमिस ६ का प्रयोग करना चाहिये ।

### गण्डमाला (Scrofula).

१ । रक्त दूषित हो कर शरीरके कई स्थानोंकी (जैसे  
गला, गरदन, वगल या पेट) गांठें उठ आती हैं । कभी  
कभी बत्तखल, आंख, कान, नाक इत्यादि स्थानोंमें घाव हो  
कर रोगीको दुर्बल कर देता है ।

पितामाताको गण्डमाला, या उपदंश दोष, तथा अस्वास्थ-

कर स्थानमें बाम करनेमें, चक्का खाना न मिलनेमें यह रोग उत्पन्न हो जाता है ।

**चिकित्सा ।**—वेलेडोना १. ६ ।—प्रदाहजनित गांठी का फूलना और दर्द; गला फुकानेमें कष्ट ।

केल्केरिया काप्से. ६. १० ।—पांखोंमें जलन, मूखोदर, प्रतिमार, काम या पत्रि नुजी हुई और पीप भरी, नाक सास और नुजी हुई ।

सलफर ६. १० ।—बगलकी गांठ, तानूमूल, नाक और घांठीकी भूजन घुटने तथा दूसरे दूसरे सन्निवृत्त कठिन, पंखोंका फूलना लडके लडकियोंकी छाखोंमें जलन, कानकी पीछे तथा घरीरके दूसरे दूसरे स्थानोंमें दाँने, घरीरका दग्ध आदि लक्षणोंमें ।

मार्क्वरियम आयोडेटाम ११ विचूर्ण ।—तानूमूल में घाव और प्रदाह, गलघत्रि का फूलना और कठिन । तानूमूलमें दप् दप् दर्द ।

माइलमिया ६. १० ।—घत्रिया सृजकर सफेद रंगकी होजाये ती ।

थरम् नेट ६, फमफोरस ६, फेरस ६, चायना ६, सौपिया ६, आयोडियम ६, डामकैमेरा ६, वैडिपगा १५ की भी समय समय जरूरत पडा करती है ।

**पथा ।**—भाफ हवा भजन, और ठण्ड पानीमें धान





होती है कि यही हम बीमारी एकमात्र दवा समय पाकर हो जायगी । डाक्टर जॉन्ट हमसे बड़े भारी परामर्श हैं ।

कैम्बेरिया कार्ड ६, ३० ।—पश्चिमान्ध, पक्ष उद्धार, विशेष करके तैल, घा घाव मोठा पदार्थ शिवन करनेमें, रक्तमें खामी बढ़नेमें, खामिले खामिले कठिन र्छाया, दुर्बलता, रक्त-घाव, डाली कुले चोरे ददं ।

बैमिडोना ६, ३० ।—मुखी खामी, बाहर दवानेमें घाव नालीमें ददं, स्वरभङ्ग, मन्थ्याको बदन गरम हो जाना बहुत दूर तक खामिले खामिले रक्त मिना कृपा कक निजलना, वसन्तजनेमें ददंके साथ (मन्थ्याकी या रक्तकी मोने समय) खामीकी छिदि ।

पायोडियम ३, ६ ।—सबखामीके साथ पालि मुर्जी कुर्द, पेटमें ददं घाव उदरामय बदनका समझा मुखी और रक्तका, बेहता भाव, भूखको अधिजता, दूध, तैल और खमी मिना कृपा पदार्थ पवानेमें समझने, गरीर मोघ मोघ दुर्बल होने जाना ।

जमजोराम ६ ३, ३० ।—बदु और दूत नाङ्गे, मुखी और गरम समझा, कुमकुममें नाव, बरे रक्तका दूर्तमिल कक मिना, प्राण पसीना और उदरामय, देह चोच ।

पेरम सेट ३ विनूने ६ ।—कुमकुममें रक्तघाव, हाथ पैर कुत्रजे, उदरामय, गरीरमें रक्तकी खामी, मुखी खामी, वसन्तजनेमें ददं हो कर रक्त निजलना ।

एथेरेटिका ६ ।—बीमारी पदिभी पदार्थमें पश्चिमान्ध

[illegible][illegible][illegible]

第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

1. संस्कृत 2. संस्कृत 3. संस्कृत 4. संस्कृत 5. संस्कृत  
 6. संस्कृत 7. संस्कृत 8. संस्कृत 9. संस्कृत 10. संस्कृत

WILLIAM A. BROWN, JR., WILLIAM A. BROWN, JR., WILLIAM A. BROWN, JR.

[illegible]

बहुत बर्फ, या ठण्डा भी न लगने देना चाहिये । रातको जागरन, बहुत परिश्रम तथा खी महशुस भी न करना चाहिये ।

## बहुमुख ( Diabetes. )

इस रोगमें कति भारतवन्दु राय, बाग्री, किंगडचन्द मित, राजनानि डिगारद कलदास पाय, चर्मक गुणाधार विश्वामागर महाशय इत्यादि सचोदर्योंने इसी रोगमें अपना अपना प्रान त्याग किया है । इस रोगको उत्पत्तिका कारण यात्रातक निर्णय न हुआ, रोगको पहिली अवस्थामें बसड़ा मुख, धीरे दस्तड़ा, पचनल प्यास, अधिक भुख, दलभूल फुला, कौडबड, बारबार मूत्र त्याग, मरोरिका सोचना, मांस भिने तथा होंडुनेमें दुर्गन्ध, शोभ कटा कटो तथा लाल, क्यत्रकी भांति सल इत्यादि लक्षण दिखाने देता है । धीरे धीरे भुख बन्द हो जाती है । शिथीका जगहू उच्छ्वसन, पुषरकी कास इत्यादि अवल होजाते है । फिर पुषरकम प्रदाह धीरे धीरे व्याप्त इत्यादि लक्षण दिखाने देने लगा है । रोगी ६ मरम ३ - मर तक दिन रातमें मूत्र काम करता है । मुखमें मिट्टाम रहनेमें उम सधुमिह कहने है, मिट्टाम ३ हो तो मूत्रमेव । मूत्र घर छदि मको पोह चेटा मने तो मसखना गर्बितु कि इसमें मिट्टाम है ।

चिकित्सा ।—निर्ज्वरदम प्रेक्षाधिनम । यह कामा चानुनके रोगका लक्षण—रोगी मया अवस्थामें दिता

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥  
 श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible]

१. ११/११/११ २. ११/११/११ ३. ११/११/११ ४. ११/११/११  
 ५. ११/११/११ ६. ११/११/११ ७. ११/११/११ ८. ११/११/११  
 ९. ११/११/११ १०. ११/११/११ ११. ११/११/११ १२. ११/११/११

[illegible][illegible]

नैब्रुका रक्त सिमा हुआ ठण्डा पानी, और चावला छानमें  
प्यासको शांति होती है ।

## गोथ ( Dropsy. )

शरीरके किसी अंगमें जल संचय हो तो उसको गोथ  
कहते हैं । गोथ स्थानिक (जब सादा घेठ इत्यादि शरीरके  
किसी स्थानमें हो ) और सार्वभौमिक ( जब समस्त शरीरमें  
हो ) यह दो प्रकारका होता है । त्वकके नीचे जो गोथ होता  
है वह पहिले पैरके तलवमें उत्पन्न होता है फिर धीरे धीरे  
ऊपर बढ़कर समस्त शरीरमें हो जाता है, घिलहोका  
बटुना, रजोवैमलस्य, मेमेरिया और, अधिष्ठ चार्जेनिक भयन  
कारणोंसे, पुराने उदरामय इत्यादि रोगोंकी ई. व. चवत्थामें गोथ हो  
जाता है । ऊर्मा हरे जगह लाल और चमकदार होती है ।  
चट्टानोंमें बागने में जगह घेठ जाती है, चर्बल, ध्यान बदलना  
चमड़ा सूखा और हलका रहना है ये सब छोटे छोटे चार लक्षण  
होता है । हृत्पित्तके कारण शरीरके कारणसे जब गोथ उत्पन्न  
होता है तब पहिले शरीर और बाह्यमें सूजन होती है । उँहा  
और प्रज्वल्य कारणसे जो गोथ होता है वह पहिले पेटमें  
होता है ( चर्बान् उदरी होती है ) रजोवैमलस्यके कारणसे  
उत्पन्न हुए गोथ पैर हाथ और मुख पर होती है ।

चिकित्सा । - चार्जेनिक ६. १३ टा १० । मध

प्रकारकी शोथमें चार्मेनिक पायदा करता है । इसमें शोथ की पीड़ाके कारण श्वाय, पैर और सब शरीरकी शोथमें श्वाय पिलही रहताहै हटनेके कारण पेटकी सूजनमें, दुर्बलता, मांस बननेकी रुकावट और रक्तही जाम, मूत्र और विषम गति विगिष्ट नाडी, श्वाय पैर ठण्डे, बारबार श्वाय, परन्तु छोडा ही पानी पीनेमें हानि बल्लभमें चापकर धरनेकी नाई दर्द, मोठे समय मांस लेनेमें कष्ट, घटनका रंग पीला, इन सब लक्षणोंमें चार्मेनिक श्वाय देता शक्ति ।

एपिमोन ६ ।—नूतनमें विकार रहनेके कारण शोथ । शरीर खरके बाद शोथमें, गर्भावस्थाके पैरकी शोथमें, तरुण शोथ और श्वाय न रहने पर, प्रलापावस्थामें, हथर उधर दृष्टि घेरनेमें, दात कड़कड़ानेमें, शरीरके चांधे चरके सन्दनमें तथा पेशाब कम और मांघ पर पसीना हो ती ।

एपोमाइन ११ ।—माया भारी, दुर्बलता, सदा तन्द्रा या श्वाय निद्रा, नाड़ाकी गति नदु, कोठबह पर मल कड़ा नहीं, चाप ही चाप पेशाब निकल जाना, पेटके ऊपरमें बल्लभलतरुभारी मानूम होना, बल्लभनकी पीड़ाके कारण रोगी बारबार दीर्घ निग्राम त्याग करे, हृत्पिण्डकी क्रिया हीन हो ।

डिजिटेलिस ३१ ।—दुर्बलता, श्वाय और विषम गति विगिष्ट नाडी, मांस लेने तथा होइनेमें कष्ट, मुखसखल मलिन, रोगी चित न हो सके, हृत्पिण्डकी क्रिया वैषम्य, हृत्पिण्ड और नूतनयि जनित शोथमें ।

हेलिबोराम १२ या ३० ।—मार्चकी शोथ, वक्षकी शोथ, मत्र शरीरकी शोथ, और मूत्रविकारके बादकी शोथमें ।

ब्रायोनिया ६, ३० ।—यकृतकी पीड़ा और कोष्ठबद्धके कारण उत्पन्न हुई शोथमें, गर्भावस्थाके पेरकी शोथमें पनीना बंद होने के कारण या गात्रपीड़काके लोप हो जानेके कारण उत्पन्न हुई शोथमें, मन्थिकी शोथमें, मांसके कष्टमें तथा मूत्रकी खामी और वक्षस्थलकी पीड़ामें ।

फैरस मीट ६, ३० ।—काला या पीले रंगका शरीर, प्रतिशय दुर्बलता, कोष्ठबद्ध, भोजनके बाद वमनोद्देश, रजोवैलक्षण्य जनित शोथ ।

समय समय चायना ६, कल्पचक्रम ६, लैकेसिम ६, नाइकीपोडियम ३०, मलफर ३०, एन्जीनाइट ६ इत्यादि शोषक भी देना चाहिये ।

पथ्यापथ्या ।—तरुण शोथमें, तरुण स्वरकी भांति हलका पथ्य, पुराने शोथमें पुष्टिकर नगु पथ्य । यकृतकी पीड़ा जनित शोथमें दूध या माँठा न देना चाहिये । मांसका शोरवा यदि कोष्ठबद्ध न हो तो देना चाहिये । रोटी यदि उदरामय न हो, ठण्डा पानी पिनाया जा सकता है पर मूत्रविकारजनित शोथमें मना है, उसके बढने खाटी दूध देना चाहिये । गरम पानीसि नहाना अच्छा है । रोग कुछ दबने पर पुराने चावलका भात, मूंगकी दाल, मांसका शोरवा, मजनेका डाटा, पलवल, बैंगन इत्यादि खिला सकते हैं ।

## रक्तस्वल्पता (Anæmia) .

अपरिमित रक्तसाव, शुक्रचरण, अति रजसाव, मैलेरिया, प्रीहाकी हृदि, उदरामय इत्यादि रोग बहुत दिनों तक भोग-  
नेके कारण रक्तकी लाल-कण भाग कम हो जाता है और  
नमकका अंश बढ़ जाता है, इसीको रक्तस्वल्पता कहते हैं।  
पांखें और पीठ रक्तहीन होकर सफेद हो जाते हैं, सब  
शरीरमें पीले रंगका शोथ हो जाता है, सदा हंफनी होने  
लगती है, अरुचि, पेटका फूलना, नूझा इत्यादि लक्षण भी  
देखे जाते हैं।

**चिकित्सा ।**—मैलेरिया रोग भोगने पर रक्तकी  
कमीमें नेशमस्यूर ३०। थोड़ा रज या ऋतु बन्द  
होकर यह थोड़ा उत्पन्न भई हो तो पल्मेटिला ६, और  
फेरामसेट ३०। श्वेत प्रदर शुक्रचरण, रक्तसाव और उदरा-  
मय जनित हो तो चाइना ६ और फसफरिक एसिड ६।  
शोथ, उत्थान शक्ति रहित तथा जीवनी शक्तिकी ह्रास अवस्थामें  
पार्मेनिक ३०। यक्ष्मा खांसीके लक्षण हैं तो फसफोरम ६।  
भदिरा पान इत्यादि अत्याचारजनित हो तो नक्सभमिका ३०।  
उपरोक्त औषधोंसे यदि कोई लाभ न हो तो सलफर ३० दो  
दिन खाकर फिर दो दिनों तक बिना औषधके रहना चाहिये;  
फिर लक्षणके अनुसार उपरोक्त औषधोंमेंसे कोई औषध



## शिरःपीड़ा । ( Headache ).

शिरका दर्द दूसरे रोगोंके लक्षण मात्र है ।

**चिकित्सा ।**—एन्कोनाइट १२ या ३० रक्त मध्यजनित शिरकी भयानक दर्द में ऐसा साम्भूम होता है कि मस्तिष्कके भीतरकी समस्या चीजे ठेककर बाहर निकलती है । समय समय पर कपाल और कनपटीमें टप् टप् करके दर्द हो, यहाँ तककी चाँगे भी दूखने लगे, तथा माथा झिलने, भुक्ताने और रूधर उधर डोलानेमें दर्दकी छवि और बियामकासमें शान्ति ।

**पानिशा ४, ३० ।**—रक्त मध्य जनित या साधारण दुर्मे-लता जनित शिरका दर्द, चाखीके पत्रकका भारी साम्भूम होना, चाखीके चाँगे चंधेरा होना या चागकी कनीका दिखाने देना, चाखे आम तथा जमन, माथा गरम, कपाल, कनपटी और गलेके शिरका अत्यन्त, जोरकर शब्द, रोगनी, झिलने डोलने तथा मोनेमें पीड़ाकी छवि, धिर होकर बैठनेमें कमी ।

**सादीनिया ४, १२, ३० ।** रक्त मध्य और घात जनित शिरका दर्द, झिलने डोलनेमें छवि, माथा भारी, मोपे भुक्तानेमें ऐसा साम्भूम हो कि शिरके भीतरकी सब चीजे बाहर निकल पड़ेंगी । दवानेमें पीड़ाका चप्पटा होना, चाखे कपालमें विशेष खरि दाहिने तरफ दर्द, बारबार आसिधथाना और पित्त हमन करना, शिरमें दर्द होनेके बाद नाकमें लहू गिरना ।

कैलकेरिया कार्ब ३० । मानसिक चिन्ता बहुत होनेके कारण शिरमें दर्द, शिरमें भयानक दर्द, सुबहके समय रातमें शरीरके उपरी भागमें पसीना, खाली पेट रहने पर भी बारबार टेंकार आना और माथा ठण्डा मालूम होना ।

घाइना ६. १२. ३० ।—कानमें गुनगुन शब्द, चेहरा लाल, शरीर दुर्बल और बारबार जंभाई आना ।

इग्नेशिया ३. ६ ।—कठिन शोकके कारण शिरमें दर्द, गुल्मवायुप्रस्त रोगके कारण शिरमें दर्द तथा सुई भोंकनेकी भांति दर्द ।

लिलीयाम टिपी ६ । सनूचे शिरमें दर्द और भार मालूम होना, दोनो हाथोंसे माथा पकड़े रहनेकी इच्छा, खुली हवामें शिरकी दर्द का बढ़ना और शामको शान्ति ।

नक्षत्रमसिका ६. १२. ३० ।—माथा घूमना, कपाल और कनपटीका फुदकना, फटजानेकी भांति दर्द, वमन या वमनो-द्यम, कोष्ठबद्ध, भोजनके बाद तथा मानसिक परिश्रमके बाद मस्तक झुकानेमें पीड़ाकी हृदि, बलवान या रहस्य प्रधान मनुष्योंके शिरका दर्द, अधिकपाली जो दर्द सुबह उठकर शामको अच्छी हो जायें, अम्ल या पित्त वमन ।

पलसेटिला ३. ६. १२ ।—अन्न ठीक न पचनेके कारण या अधिक तेल तथा घी खानेसे स्त्रीके जननयन्त्रकी क्रिया

विकारमें, एक तरफके कानके पिछले भागमें तेजदर्द, ऐसा मालूम होना मानो कोई शिरमें मूर्ख वेध रहा है ।

फमफरिक एमिड ६. ३० ।—धातु दौर्बल्य और सायबिक दुर्बलताके कारण माथेमें दर्द, घ्रण शक्तिका घट जाना, दृष्टि शक्तिका कम होना तथा कानोसेभी कम सुनाई देना ।

सोपिया ६. १२. ३० ।—माथे पर भार मालूम होना तथा मूर्ख वेधनेकी भांति दर्द, रजोवैलक्षण्यजनित वमन या वमनोद्यमके साथ शिरपीडा, कोष्ठबद्ध । दाहिने या बायें पांखपर दर्द ।

साइलिमिया ६. १२. ३० ।—प्रबल शिरपीडाके कारण विवेचना शून्य होजाना, सुबहकी जाड़ा मालूम होना तथा वमनच्छाके साथ दधानेकी भांति दर्द, पांखोंके ऊपर ऐसी दर्द कि पांखें बाहर निकल पड़ेगी ।

मिमिमिफिडगा ३ ।—सायबीय, वात जनित या रजोवैलक्षण्य जनित मिरका दर्द, मस्तक और पांखोंमें तीव्र वेदना, हिंमनेसे दर्दका बढ़ना, कपालमें लेकर गरदन तक दर्द, तेज दर्दके कारण चक्षुतारा विस्तृत, प्रमाय और दृष्टिविकार, गुल्मवायूप्रस्ता स्त्रीको वमनके साथ दर्द ।

सार्डोजीलिया ३ ।—शिरके सम्मुख भागमें भोंच कर फेंक देनेकी भांति दर्द, यह दर्द पांखों तक फैली हुई हो, हिलनेसे या भुजानेमें पीडाकी दृष्टि माथेकी हृदयस्पन्दन या अस्थिरता, जोरमें दधानेमें पीडाका कम होना, पार्थी घोरका दर्द, मूर्खों-

दयके समय वेदनाका आरम्भ होना और दो पहर तक बढ़ना, फिर धीरे धीरे कम होकर मूर्च्छास्त तक अच्छा हो जाना ।

सल्फर ६, १२, ३० ।—कपालमें और कानके पिछले भागमें दप् दप् दर्द, माघिका ऊपरी भाग गरम मानूम होना, प्रातःकालके समय उदरामय ; अर्गमें रक्तसाव बन्द होकर मस्तकमें रक्तका सञ्चय होना तथा शिर घूमना और दर्द ।

मेराइमभीर ६, ३० ।—मस्तक पूर्ण और भारी मानूम होना, सब रगोंका अन्दन, अचेतनावस्था, कानमें भों भों शब्द, वमन या वमनोद्देगके साथ उदरामय ।

**पथ्यापथ्य ।**—दर्दकी पहिली अवस्थामें कुछ भी न खाना चाहिये । अम्लजनित शिरकी दर्दमें दूधके साथ थोड़ा चूनाका पानी मिलाकर पीना चाहिये । दावकर धरनेमें यदि उपशम हो तो भीजा कपड़ा माघमें बांधनेमें अच्छा फल दिखाई देता है ।

## मन्याम (Apoplexy).

अच्छा ज्ञानतमें घूमने फिरनेके समय सहसा गिर पडनेमें विल्कुल या कुछ अर्द्धतन्त्र हो जाये तो उसकी मन्याम कहते हैं । तीन कारणोंमें इसकी उत्पत्ति होता है , माघिक रक्त

बड़ा नाडियोंमें रक्त अधिक हो जानेके कारण । (२) मायिकी रक्त बड़ा नाडी क्रिय हो जाये और अधिक रक्त निकलनेके कारण (३) मायिके हठात् खन सञ्चय होनेमें । यह रोग कभी कभी धीरे धीरे मालूम होने लगता है और कभी कभी यकायक आरम्भ हो जाता है । रोगी अच्छा रहने पर भी कभी यकायक इन्द्रिय-ज्ञान और करण शक्ति खो देता है परन्तु मांस और रक्तमञ्चालन क्रियाका सोंप नहीं होता, नाड़ी पूर्ण और स्रु, चक्षुतारा एक विस्तृत और दूसरा संकुचित, धांधे या समूचे भङ्गमें खैचन, मुख एक और आलस्य इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं । फिर कभी कभी रोगी हठात् अज्ञान होनेके पहिले कई दिनों तक माया भुक्तानेमें बमनेच्छा, मूर्च्छा-भाव, शिरका दर्द, मायिके ऊपरका भाग गरम मालूम होना, कोष्ठग्रह, पेशाब कम, चित्त अस्थिर इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं । एकतरहका और भी मन्दास रोगमें ( कई पात्रमें पचाघात ) माया भारी, नाकसे रक्त गिरना, तन्द्रावेश, कानके भीतर एक प्रकारका शब्द मानुस होना, नाडी पूर्ण और द्रुत, कीर्द कीर्द भङ्ग अवयव, बमनेच्छा, इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं । मदिरापानादि अत्याचार, बहुत खाना, पीना, कांधमें भारी वस्तुका चापमानुस होना, प्रगल्भ वस और सुद्रपीषा, अतिगम्य मानसिक चिन्ता, रजोरोध, द्रुतपिण्डकी क्रिया गडबड इत्यादि कारणोंमें भी मन्दास रोग उत्पन्न होता है ।

**चिकित्सा ।—ऐकोनाइट ३X ।—**पूर्ण और द्रुत तथा मृदुल नाड़ी, वदन सूखा और गरम, जीभमें पक्षाघातके कारण बोली साफ न निकलना ।

**पारिका ६ ।—**हृद मनुष्योंके मस्तकमें रक्तमध्य ।

**वेलेटोना ६ ।—**चैतन्य लोप, वाक्य रहित, मुंह लाल और मूजा दुष्गन्ध, माघे और गरदनकी रगोंका उद्वलना, चेहरा और हाथ पैरका आक्षेप, मूत्र बन्द या आपही मूत्र निकल जाना ।

**ओपियम ६. ३० ।—**तन्द्रा या गाढ़ी नींद, (मंशा रहित) पूर्ण या बृद्ध नाड़ी, विषम शब्दयुक्त सांस, मुंह सूजा तथा लाल, आधी खुली आंखें या चक्षुतारा विस्तृत, हाथ पैर ठण्डे रक्त बहा शिरार्योसि रक्तका बहना ।

**नक्तभमिका ६. १२. ३० ।—**मस्तिष्कके रक्त मध्यजनित मंश्यास रोगमें, माघासि रक्त या रक्त निकलने पर, अतिरिक्त भोजन, मदिरापान या रातमें जागना इत्यादि अत्याचार जनित मंश्यासमें ।

**मात्रा ।—**प्रबल अवस्थामें २० । ३० मिनिटके बाद एक मात्रा ।

**पद्यापद्या ।—**अन्न, व्यञ्जन, दूध, ताजी महलीका मोरवा सुप्य है। चाह, काफी, मांस, हृत या गरम समाना, मड़ी हुई वस्तु तथा उन्नेजक खाद्य निषेध । रोगकी हालतमें हाथ

पैर ठण्डे होने पर गरम जलका सेंक, साथे पर भीतल जलकी पट्टी और पहिरनेका कपड़ा ठण्डा कर देना आवश्यक है । रोगीके पाम शुद्ध वायु मञ्चालनमें ब्याघात न होने देना चाहिये ।

## अपममार या मृगी ( Epilepsy ).

हठात् चैतन्यता लोप हो जाकर रोगी गिरजाय, जिसी किमौको रोग चारम्भ होनेके पहिले माथा घूमना, माथेमें दर्द, शिरमें कीड़ा चलता हुआ मानुस होना, चक्षुष्ट दृष्टि, कानमें भों भों शब्द, कदनमें दर्द, इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं । कोई कोई रोगी हठात् जोरसे रोकर बेहोश हो जाता है । रोगके चारम्भमें सब अङ्गमें आलस, खोवा कठिन और टेढ़ी हो जाती है, चक्षुतारा नीचे या ऊपर उठ जाता है, हाथकी अङ्गुलियां सब सिकुड़ जाती हैं, कसेजा धड़, फड़, करता है, चेहरा पीला होकर फिर लाल हो जाता है, हाथ पैर फेकने लगता है, ठण्डा भाठा चाठा पसीना निकलता है । २०।३० मिनिटमें बेग कम होने पर रोगी सो जाता है । बहुत दिनों तक यह रोगसे भोगने पर धीरे धीरे मानसिक शक्ति खींच होकर उन्माद हो जाता है या सब अङ्गमें पक्षाघात हो जा सकता है ।

गुल्मवायु ( हिष्टीरिया ) रोगमें—मृगी रोगकी भांति एक दम मनुष्य अचेतन्य नहीं हो जाता है या रोगावेगके पहिले





या टिडजियम ६ । धातुकी दुर्बलता जनित शर्मी रोगमें पेमिड कम ६, कमफोरम ६, चायना ६, या फिरम ६ । डरके लिये शर्मी रोग होनेमें ओपियम ३० या पेकोनाइट १५ ।

## गुल्म या मूष्मांगत वायु (Hysteria) ।

वायुर्बिदम् कक्षा कृष्ण गुल्मवायु और हिटोरिया एक ही प्रकारका रोग नहीं है, पर इसका बहुतसा भाग समान मिलता है । साधारणतः सायनिक विकारके कारणसे यह रोग उत्पन्न होता है । उसी कारणसे पेटका फूलना, बिचकी, सोम मेनेमें कट तथा सोम मेने और छोड़नेमें भी बहुत शब्द होता है, ध्वरभङ्ग, पेटमें गले तक कोई गोलार्थी तरह पदार्थका खटना, गिरने दड़े इत्यादि उपसर्ग सामान्य होने लगने हैं । हिटोरियामें ज्ञान पञ्चदमभीष नहीं होता है । जगदु, बिगड़नेमें भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है । अज्ञान स्त्रियोंको और कभी कभी पुरुषोंको भी यह रोग पैदा हो जाता है ।

**चिकित्सा ।** मूष्मांगत मसय रोगोंको कैम्पर वा मम्पुस मुचनेमें रोगी शीघ्र हो चैतन्य हो जाता है । अच्छी चरम्यामें चैतन्य होने पर नीचे लिखा दवाये देनी चाहिये । रोगी बड़ा दुःख, उन्मत्त, स्त्रियों लिये मिल मसदमें अधिक दिन ब्यादे को अधिक रक्त लिखलता या बंद होकर मर्मादमें रक्त जमा होनेके कारण यदि रोग उत्पन्न हो तो



## धनुष्टहार ( Tetanus ).

इस रोगमें शरीर धनुषकी तरह टेढ़ा हो जाता है । यह दो तरहका है पहिला स्वर्यभूत और दूसरा आभिघातिक । रक्त दूषित हो कर स्त्रायविक्रमणुर्भी विज्ञात हो जानेमें जो धनुष्टहार होता है उसे स्वर्यभूत और शरीरके किसी चंगमें भारी चोट लगनेमें चोटकी जगहमें स्त्रायविक उत्तेजना होनेमें जो धनुष्टहार पैदा होता है उसे आभिघातिक कहते हैं । मलेमें दर्द, गरदन कड़ी, चहुँपा बन्ध, रोगीका चेहरा हर्षयुक्त देखा जाय । मुख-मण्डलकी सब पेशियाँ कड़ी होकर चाबेप या एंठन पारभ हो, मुखमण्डलमें दुःख भलक, रोगी एक दृष्टिमें देखता हो, पीछे दंड़ होकर सब शरीर धनुषकी तरह टेढ़ा हो जाये । कोई कोई रोगी आँगोंकी तरफ और कोई कोई पीछेकी तरफ झुक जाता है । यह रोग सभी अवस्थाओंमें हो सकता है ।

**चिकित्सा ।**—स्वर्यभूत धनुष्टहारमें प्रथम चाबेप न हो और चाबेपके समय ठण्ड और पसीना हो चाबे तौ ठिकोनाइट रेडिय । आघात जनित धनुष्टहार रोगमें रक्त रक्त कर चाबेप होना हो और रोगी पीछेकी तरफ झुकता जाय तौ लकूममिका । आभिघात जनित धनुष्टहारमें बड़ा जोरका चाबेप हो तौ एमिडु काइडो । रोगीका सब शरीर कड़ी हो कर टकटकी लगाने देखना हो, देखनेके रोगमें न रहना, नन्हापकाय चम विकृति बद्धन देखके वाट चाबेप हो, कुनहोने

वढ़े, मांस लेने तथा छोड़नेमें कष्ट होता हो, चेहरा लाल, मुंहसे फेन गिरता हो और रोगी पीछेकी तरफ भुके तो सिकिउटा-भिरोसा ६। आघात जनित धनुष्ट्वारमें चेत रहने पर और श्वास रोध होना चाहे या सब शरीर कभी नरम कभी कड़ा हो जाये तो, नकाभमिका ३x। मेरुदण्डके ऊपर बरफ रखना चाहिये ।

**मात्रा ।**—रोगके पूर्व लक्षण प्रकाश होतेही २० मिनिट का अन्तर देकर एक एक मात्रा दवा देनी चाहिये ।

## जलातड्ड (Hydrophobia.)

पागल कुत्ता, सियार, भड़िया या विष्प्लीके काटनेमें यह रोग उत्पन्न होता है। उनके दांत और नखोंमें एक प्रकारका विष होता है जो रक्तमें लगतेही शरीरमें बैठ जाता है। इसके १७।१८ दिन पहिले कोई लक्षण रोगका नहीं दिखाई देता। कपड़े पर काटनेमें विष कपड़ेमें लगना सम्भव कर रोगी उस रोगका कुछ ख्याल नहीं करता है। काटनेके १७।१८ दिन बाद उस काटे हुए स्थानमें जलन, चारो तरफ खुजली स्वभावका क्रोधी हो जाना, रातमें भयङ्कर स्वर दिग्वार्द देना, गलेकी नसोंका मिकुड़ जाना, कोई चीज निगलनेकी शक्तिका न रहना, सांसमें कट, पानी या पानीकी तरह चीज देखनेसेही

रोगीको डर मान्य होना और धीरे धीरे कुछ दिन बाद ऐसाही हो होकर रोगी दुर्बल हो मर जाता है ।

**चिकित्सा ।**—काटतेही चत व्यानके ऊपर बांध देना चाहिये, इसके बाद जिसके दांतमें कोई रोग न हो वह उस काटी हुई जगहका रक्त घुमकर बाहर फेंक दे । फिर मोहागरम करके उस व्यानको दाग दे या कार्बोमिक एमिड या नाइट्रिक एमिड द्वारा उस काटी हुई जगहको जला देनाही अच्छा है, और ट्रामोनिवाम १x भी देना चाहिये ।

## पक्षाघात (Paralysis).

किसी अङ्गका ( या बांध अङ्गका ) स्वर्ग ज्ञान रहित पक्षया पक्ष होनाही पक्षाघात कहलाता है । पक्षाघात कई प्रकारका है, जैसे मेकदण्डके पक्षाघातके कारण पक्षाघात, बिहरेका पक्षाघात, कंधपैके माय पक्षाघात, मोचेके अङ्ग या उपरके अङ्गका पक्षाघात ।

**चिकित्सा ।**—स्वर्ग गतिका काम ही जाना, कंधपैके माय कट्टे आर्टिमियोका मय चंगोका पक्षाघात और भेजरे तथा जौमके पक्षाघातमें बेराइटा कास ४-३० । भेजरा ध्वजामो और मूखामदके पक्षाघातमें कटिकम ४. १३. ३० । पक्षाघात समके होनेसे नहीं मान्य होता परन्तु काटा इत्यादि

गड़ानेमें मालूम होता है और रोगकी जगह भिन्नभिन्न करती है। आधे अङ्गकी अवयवता ( नये पक्षाघातमें ) एकोनाइट १५। लांघमें गठियेकी तरह दर्द, दृष्टिको चीणता, रातमें पेमाव रोकनेकी सामर्थ्यका न रहना, चन्तनेमें कमजोरी इत्यादिमें बेलीडोना ३। बहुत ज्यादा धातुचयके कारण ध्वजभङ्ग या पक्षाघात होनेमें फस्फोरस ६ या ३०। हाथ पैरोंका सन्धन, स्रायुमण्डलके खगंबीके कारण पक्षाघात होती मार्कसल ६। कांटा गड़ानेमें दर्द हो तो और छूनेमें न मालूम हो तथा सब जोड़ोंमें कड़कड़ आवाज होकर आधे अंगमें पक्षाघात हो और नोचेके अंगोंके पक्षाघातमें ककिउलाम ३। बूढ़े आदमियोंके पक्षाघातमें कोनियाम ६। बहुत शराव पीनेमें पाठमें पक्षाघात हो और माथ हो वमन ( कै ) की इच्छा रहे, कदुजियत, अरुचि इत्यादि लक्षणोंमें नक्सभमिका १, आंखकी पलकके पक्षाघातमें जेलसिमियम १।)

## सर्दीगन्गी (Sunstroke).

तेज धूपमें पहिले माथा गर्म होकर क्रिया रहित होनेसे यह रोग उत्पन्न होता है। पहिले गर्मी, प्यास, बदनका चमड़ा सूखा, माथेमें दर्द, आंखें लाल, वमनकी इच्छा, बार-बार पेमाव, फिर धीरे धीरे नुर्द्धा होती है। कभी तेज धूपमें घूमनेके बाद ही रोगी एकाएक नुर्द्धा हो जाता है।

**चिकित्सा ।**—गिरका बहुत घूमना भीतर लज्जा-  
कर गर्मी माथेके पिछले भागमें ददे, यकायक चेतन्यताका  
लोप होना इत्यादि लक्षणोंमें स्नायुज ६, ऊपर निम्ने लक्षणोंके  
माथे पीछे पीर चेहरा यदि आण हो जाय तो वेमेडोना ३,  
रोगी पचान होजाय पीर पावेव न रहे तथा शरीर गर्म  
रहे तब सब शरीर पर ठंडा जल डालना चाहिये । यदि  
प्रबल पनिय हो, नाड़ी दुर्बल पीर चीन हो तो रोगीके  
नाकके पास स्मिगिट कैम्फरको भीगी रख देनेसे चाहिये या  
भीतर प्रयोग करना चाहिये । समय समय पर ऐकोनाइट ३,  
मिगडुमभिर ३, जलमिमियम १५, पीपियम ६, कार्बोमित्र ३०  
प्रयोग करना चाहिये ।

## स्नायुगल (Neuralgia).

खायुकी ददेके कारण कई लक्षणोंमें दप दप तथा सूई धरने  
जैसा तरह या जलनके साथ ददे पैदा हो, तो उसको स्नायुगल  
कहते हैं । स्नायुगल धनेक प्रकारका होता है । जैसे चेहरे  
का स्नायुगल, अङ्गुलीय, पायुगल, यथमो (जसरके मोने)  
मैनाके यन्त्रोंमें पैदा- जैसे, पायामयमे, हृदयिकमे, यकनमे,  
दिवाययमे तथा अङ्गुलीयमे, चेहरेका स्नायुगल पीर यथमो  
गुल जैसा दिखा जाता है । पायान, दातमें कोड़े होना, मर्दे  
जलना, अवावाव जलित लक्षणमय इत्यादि कारणोंमें यह  
रोग उत्पन्न होता है ।

**चिकित्सा ।**—चेहरके सायुगूलमें वेलेडोना, आर्सेनिक, ऐकोनाइट, कलोफाइनम, स्नाइजिलिया और फसफोरस । अर्धकपालीमें—आर्सेनिक, इन्नेशिया, कफिया, चायना, जेलसिमियम, नक्सभमिका, और वेलेडोना । आमाशयके गूलमें—आर्सेनिक, एलोज, कलोमिंथ, नक्सभमिका और लाइकोपोडियम । हृत्पिण्डके गूलमें—कैकटम, वेलेडोना, मेराइम भिर, स्नाइजिलिया । गृध्रसी गूलमें—कैनेमिला, इन्नेशिया, कलोमिंथ, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, इमबम, मल्फर और फसफोरस । यह सब औषध व्यावहृत होते हैं ।

**आर्सेनिक ६-१२-३० ।** रोगी अत्यन्त चञ्चल, व्यथ या विमर्ष, क्रुह, दुर्बल, विग्रामकालमें, शीतल प्रयोगमें, विभीष करती रातके समय रोगका बढ जाना इत्यादि लक्षणोंमें तथा मलेरियाने उत्पन्न भये हुए सायुगूलमें ।

**फसफोरस ६-३० ।**—चेहरके सायुगूलमें ।

**ऐकोनाइट ३ ।**—कपालमें, गालमें और गण्डस्थलकी खंचनमें या चोपनेकी भांति ददने, रहसइय होनेके कारण मुखनण्डलके ददने और गृध्रसीमें ।

**वेलेडोना ६ ।**—अर्धकपालीमें जो दो पहरकी दद जाय और माघ ही चेहरा लाल हो जाय, मुखनण्डलके दाहिनी तरफका सायुगूल और गलेके निचले भागके सायुगूलमें ।

**स्नाइजिलिया ३** —माया और चेहरा काटकर फेंक देनेके भर्त्ति दद दह दद ३३ दह दह तक फल जानें है नद



माया झिलाने या भुज्जनेमें दर्द बढ़ने लगता है और माय की कमीका धड़ धड़ करने लगता है और चम्पिगता (वेधनी) बढ़ जाती है । इत्यादि लक्षणोंमें ।

क्रमोन्मिथ ६ ।—बाधे मिश्रणी दर्दमें, माया तथा दातत्रे दर्दमें, भेधनेके बाधे तरफ सूर्य बेधनेकी तरफ दर्द, यत्र दर्द गर्भमें और झिलने डोलनेमें बढ़ जाती है, यत्र गर्भिका स्पन्दन तथा श्लेष्मिकी मांसिक धर्मका दर्द और पुन्योक्ति चर्म-मूलमें; गृहणी मूलमें सूर्य बेधनेकी तरफ, भुज्जनेमें दर्दका बढ़ना, मांसिक बढ़ी दर्द, ऐसा मान्य होना कि गर्भमें और बाधोंमें कार्य सूर्य बढ़ा रहा है और माय की भक्ष्यतामें कमजोर माय दर्द होना इत्यादि लक्षणोंमें ।

जनमिमिथ ७ ।—छायाधिक दुर्बलताके कारण यत्र यत्र स्पन्दनके माय खाद्यमूलमें, पीठमें, कक्षा तथा गर्भमें और जानमें दर्द ।

वक्रिया ६ ।—दाहिनी तरफ की धर्मकदात्मोंमें (जो सुवह-में चारव्य होकर दिन भर कट देता रहें) कदात्मके वगलमें कांटा बेधनेकी भांति तेज दर्द (मान्य हो कि माया कटकर गिर आदिमा) भुज्जनेमें या तेज बाधने मूलमें दर्दका बढ़ना, बाध और घेर टटा रहना तथा चमिगता गीत, मान्य होना ।

## चक्षुरोग ।

चक्षुप्रदाह ( Ophthalmia ).

आंखोंमें धूल, धूप, नदी का टट्टी हवा, धूआ, तेज रोशनी लगनेमें आंखें आती हैं। हान और प्रनेहमें चक्षुप्रदाह होता है ।

लक्षण ।—आंखोंके उज्जने स्थानका लाल हो जाना, आंखमें जल या पीप निकलना, आंखोंका लुट जाना, वेग गिरने का रुई बेधनेकी तरह दर्द, कड़काना, रोशनीका सह न होना ।

चिकित्सा ।—इंटेरोरा ३५, उबरी, लाल रंगकी आंख ; तेज दर्द, पूल जाना और ब.प्र.के पास दपदप टपकना ; दोनों पपनी नाल रंगकी, रोशनी का धुका असह्य होना ।

एकोनाइट ३५, ६ । दात प्रनेह का नदीके कारखाली नई आंखोंकी दिमारोंमें सामान्य लवर हो तो इसे देना ।

मर्कूरियसकर ३ ।—आंखमें जल गिरनेके बाद पीप लुप्त हो बीबड़ आवे, आंखें लुट जाय, रक्त और दर्द गालूम हो, देखने का मुकानेमें दर्द होता हो, बहुत कुटकुटाव और रोशनी सहन न हो सके ।

एपिस मेस ३० ।—बहुत पीप बहना, रोशनी असह्य, लाला, खुजलाना, दर्द और आंखें सूजी हुई ।

**इडजेमिया ३२ ।**—(सभी अवस्थाओं में दिया जा सकता है) चायें जाल, रोगनी चमड़ा, नाक तथा चाखों में बहुत जल मिला, दर्द, बारबार छींक, चाखों के उजले चमड़े और चमड़ा गले बगल में छोटी छोटी पुनमिया निकल आता; चाखों में पीप बहें या मृतको तरह पीप चाखों में हो जाने में देखने में बाधा हो तो, १० बूट १ चोम जल में मिलाकर चायें धो देने की चाहिये ।

**चार्मिण्टम नाइटिकम ३ या ३० ।**—अधिक पीप बहने में मायरी लड्डों के चमड़ा में, पुराने चमड़ा में जब कुछ बन्दों के रंग का पीप बहने लगे ।

**मलकर ३, ३० ।** चमड़ा का प्रदाह और उमर बगल में जाल रंग का चमड़ा की तरह छोड़ा, मृत मदाने की भाँति दर्द, पानी लगने में छिछि या गल्लमाया जलित चमड़ा में चार्मिण्ट ६, चमकीरम ६, जलमिमियम ३२ भी प्रयोग किया जाता है ।

**पय्यापय्य ।** चमड़ा और पुटिका भीजन, मकड़ी, और मिटा मिष्ट, गोमोरी माक बुद्धि बिहारनपर बुझाया चाहिये । मृत जल में या छोड़े मर्म दूध में चायें माक करने चाहिये ।

## दृष्टिशक्तिकी अल्पता (Amblyopia).

कारण ।—दृष्टिकी क्षीणता बहुतसे कारणोंसे उत्पन्न होती है । बहुत छोटा या चमकता हुआ पदार्थ देखते देखते रहनेमें, अपरिमित नींदमें या निशा खानेमें, ठण्डे प्रयोगमें, एकाएक घसीनेको रोक देना, रजोरोध इत्यादि इस रोगके कारण हैं ।

चिकित्सा ।—रक्त, रक्त आदि अधिक निकल जानेमें यदि दृष्टिक्षीण होगई हो तो साइना ६, ३० ; यदि साइनामें कोई लाभ न दिखाई दे तो फमफरोस ६, ३० । बहुत निशा खानेमें क्षीण दृष्टिशक्ति हुई हो तो नक्क-भमिजा १५ । रक्तकी अधिकतामें हो तो बेनेडोना ६, ३० । रजोरोधमें हो तो एम्मेरिटिजा ६, ३० । दृष्टिपिण्डकी पीड़ाके कारणोंमें हो तो कार्बेटस ६ । तेज दर्द शिरमें हो और माथेकी दृष्टिक्षीण हो तो मेडुल्लेरेरिया ३, सद्युनारामें दर्द हो तो मिमिमिक्विडगा ३, आद्युमण्डलमें अधिक दर्द हो तो स्फार्डजिनिजा ६, और क्लोमिन्ड ६ । माथेमें रक्त अधिक हो और माथेमें रक्त शिर हो फमफरोस ६ । हाथके कारणोंमें हो तो क्लोमिन्ड ६, रक्त अल्पताके कारण हो तो फेरस ६, एमिड फस ६, एम्मेरिटिज ३०, साइना ६, या इड्रैरेरिया १३ ।

परिचाय दृष्टिकी क्षीणताके कारण हो तो नक्कभमिजा ६, एम्मेरिटिजा ६, स्फार्डजिनिजा ६, साइना ६, और बेनेडोना ६ ।

**साधारण नियम ।**—रक्तकी कमीके कारण दृष्टि चीज होनेसे पुष्टिकर और बल बढ़ानेवाली चीजें खिलाना चाहिये । अश्वगाधनमें खान, विगुड वागु भेवन इत्यादि हितकर है ।

रानौधी—बेलेडोना ६, सारकोपोडियम १०, और दिनौधीमें—मार्शल्लोमिया १०, फमफोरस ६, सम्पूरक एनिड ६ या बेलेडोना १० ।

## तारकामण्डल प्रदाह (Iritis).

चक्षुतागर्भ धारो तरफवाने मण्डलकी तारकामण्डल कहने हैं । यही तारकामण्डलमें जलन होनेपर ठीक समय पर दवा न दी जाय तो, आँखा पड़कर देखनेकी शक्ति जातो रहती है ।

प्रदाह ( जलन ), चोट लगने या किसी प्रकारके आघातके कारण या प्रमेहजनित आदि कई प्रकारमें होता है ।

**साधारण लक्षण ।**—दृष्टि शक्तिकी कमी और दूरकी चीजें न दिखाने देनी, दिखेकी रीशनी या धूपमें कष्ट मानूस होना, आँखें मूंदनेमें दर्द, दोनो कनपटोमें मूढ़ बंधनेकी तरह दर्द, इत्यादि ।

**चिकित्सा ।**—चोट लगनेके कारण तारकामण्डलमें

जलन हो तो आर्निका ६, ( आर्निकाका मूल चरिट १० बूंद, आध पाव जलमें मिलाकर रोज ३-४ बार आंखें धोनी चाहिये ) दाहके साथ ज्वर रहे तो ऐकीनाइट ३X और आर्निका ६, पर्यायक्रमसे देना चाहिये । यदि मस्तिष्कमें भी कोई गड़बड़ दिखाई दे तो आर्निका और बेल्लडोना पर्यायक्रमसे देना चाहिये । वातके कारणवाले दाहमें—ब्रायोनिया, स्टाइजिलिया, यूफ्रेशिया । यन्त्रिवात जनित प्रदाहमें—आर्मेनिक, क्लोमिथ, काकिउलस और सलफर । उपदंश ( गरमी ) जनित प्रदाहमें—कैलिब्राइकम, मार्कसल, एसिड फस् । प्रमेह जनित प्रदाहमें—एसिडफस, मार्कसल, अर्जेन्टम-नाइट्रिकम । यही सब दवायें प्रयोगकी जाती हैं ।

## जालदृष्टि (Muscae volitantes).

इस रोगमें आंखके सामने छोटे छोटे कीड़े, धूल या छोटे सूतकी तरहके पदार्थ उड़ते हुए दिखाई देते हैं । पुराना ज्वर, अपरिमित श्रुति निकलना, रक्तर्क्त कर्मा इत्यादि नाना कारणोंमें यह रोग उत्पन्न होता है । कारणका पता लगाकर दवा देनेमें तुरन्त ही यह रोग छूट जाता है, कहीं कहीं कम-जोरके कारणोंमें भी यह रोग उत्पन्न होता दिखाई देता है ।

पतण्डव बाइला ६, या एमिड कम १०, प्रायः सभी मसलोंमें फायदा करता है ।

## धूमदृष्टि ( Glaucoma ).

कभी कभी आन्त्रासि चमकाव या जुड़समा दिखाने देता है । आन्त्रासि जानिसि हो प्रायः यह रोग हो जाता है । रोगके आरम्भका कभी तक पता नहीं लगा है । किमी किमी रोगके साथही यह रोग भी देखा जाता है । एकीमापट ६, हेमिडोना ६, आर्बिगटम मार्बिटिक ६, कमकोरम ६, समय समय पर लाभ दिखाने है ।

## चक्षुनो ( Hordeolum ).

आर्बिगटम एमकावे कुरा या नीचे अमनके साथ एक प्रकारकी छुमी निकलती है उम्र चक्षुनो कहने है । एम्प्टिमा ६, उम रोगकी चक्षुनो दवा है । अरुणाव छुमी रोगके साथ छुमी मसलोंके बाद यह लाभ कहा हो जाये तो मसल ३० हा मसल दवा ६ ।

## ६ । कर्णरोग ।

### कर्णप्रदाह ( Otitis ).

कर्ण प्रदाह अधिक करके मदीं नगनेमें ही होता है, और कानके भीतरकी जगहमें दर्द, सूजन तथा उमका रंग लाल हो जाता है साथही ज्वर भी रहता है । रोग होते ही दवा न करनेमें कानके भीतरके कर्ण पड़ेतक इसका चमर हो जाता है और धीरे धीरे दुर्गन्ध बाने लगती है तथा पीप बहने लगता है ।

चिकित्सा ।—पहिनी अवस्थामें विशेष करके शिरमें दर्द तथा गलेमें दर्द हो तो बेलीडोना ३५ और गर्म जलका सेक देना चाहिये । परन्तु यदि कर्ण गर्म तक दर्द हो और साथ ही ज्वर भी रहे तो एकीनाइट ३५ । दर्द पुराना हो तो नाइट्रिक एमिड ६, सल्फर ६० देना चाहिये । सूई गड़ानेके तरह दर्द और कर्णमूलमें बड़ा दर्द हो तो कसोमिला ६ ।

### कर्णशूल ( Otagia ).

कर्ण प्रदाहमें ज्वर और दप दप करके दर्द होती है । कर्णशूलमें कानमें सूई वेधनेकी भांति दर्द होती है । यह दर्द कभी कभी बढ़कर दांतके ममूडेतक आजाती है । मदीं



दा भोट लगनेमें, जाम या शीतधातु बाद कर्णगुल हो जाता है ।

**चिकित्सा ।**—ग्रमेक या मर्दोकि कारणों या काममें ठंडा थल प्रयोग कर आनेमें दर्द हो तो एकीमाइट ३२ । भोटके कारणमें दर्द हो तो चार्निशा ६, किमी चीकके बेसनकी भाति दर्द हो तो एलमटिला ३२ । मर्दोकि कारण में भी हो तो एलमटिला लाभदायक है । दन्तगुलके साथही यदि कर्णगुल हो तो क्रमोमिया १२, मार्चमन ६ ।

## अंत्रग Abscess of the Meatus).

अंत्रगमें कर्णगुल होते होते दाने चीकर दर्द, सूजन तथा जलक इत हो जाता है । इसमें गुननेकी शक्तिमें भी मदद हो जाता है ।

**चिकित्सा ।** कर्णमें टपक इत जल चीर छुन हो तो बेनेडीना ३२ दोना घन घोलना का बायो प्रोत चीका धारित । यदि बेनेडीनामें कोई कष्ट न हो तो मर्दोमिया ३२ । चीर चीका चपक हो तो ( कल्द दधानेके जले ) केरु छन्द ६, उदुप अम चीमेदर मधु ३० ।

## कर्णनाद (Tinnitus Aurium)।

इस रोगसे कानमें, गुन् गुन्, फन्फन् शब्दों से इत्यादि शब्द होते सुनाई देते हैं। दूसरी दूसरी बीमारीके कारण या स्त्रायविक दुर्बलताके कारणसे यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोगमें मनुष्य बहिरा भी हो सकता है।

**चिकित्सा।**—कानोंमें घंटिका शब्द, गर्जन शब्द या गुन् गुन् शब्द हो तो एन्टिड फस्फोरिक ३०, सुबहकी कानमें गरजनेकी भांति शब्द और बारबार कानके भीतर खटुलाहट हो तो नक्सभमिका ६, ३०। कानमें जनके प्रवाहकी तरह या गुन् गुन् शब्द सुनाई दे तो कमोमिला ६। कर्णनादनके अपभ्यवहारके कारण नाना प्रकारके कर्णनादमें एन्टिड नाइट्रिक ६ और साइना २००। मस्तकमें रक्त संचय होनेसे उत्पन्न हुए कर्णनादमें बेनेडोना ६, और वमन भी कर्णनादके साथ हो तो भिराइन एल्बम ३। कलकी गाड़ीके शब्दकी भांति या हिन् हिन् शब्दवाले कर्णनादमें डिजिटैलिन ६।

## कानमें पीप (Otorrhœa)।

हाम, ज्वर इत्यादि रोगके बाद और गण्डमालाग्रस्त सड़कोंके कानमें पीप (रस) हो जाता है। यदि युवा पुरुषोंके कानमें पीप हो तो यह बधिरताका लक्षण है।

**चिकित्सा ।**—दुर्गन्धित पीप अधिक निकले तो परम-मिट ६ । कानके पीछे या नीचे दर्द, मूत्रमके माथही दुर्गन्ध पीप निकले विमेष करके पारा खानेके दोपके कारणसे नाइट्रिक एसिड ६ । कानको बहते बहुत दिन होगये हो और पाराम न होता हो तो कैल्केरिया-कार्ब ६, १० । कानमें मान पानीकी तरह पनमा तथा चटचटा दुर्गन्धित पीप निकले तो थाफार्डिटिस ६ । गन्धगन्ध कफ या पीप निकले तो पलमटिना ६, कानमें तेज दर्दके साथ पीप या रक्त मिमा हुआ पीप निकलता यदि तो मार्शमल । कानके बाहर मूत्रन हो और भीतरसे पनमा याव हो तो मार्लिमिया १० । पीप मूत्रकर बहिरावन खाता जाता हो तो थोड़े दिन मलकर १० और कमकोरम ६ पर्यायक्रमसे प्रयोग करना चाहिये ।

## बधिरता : Deafness.

बधिरता (बहिरावन) तीन प्रकारका है, (१) स्थायिक क्रियाओं विषमतासे कारण (२) दूधरी दूधरी विमारियाके कारण (३) मूत्र बधिरता अर्थात् मध्यबधिरा । पहिली दो बधिरता दवाई पाराम होनी है ।

**चिकित्सा ।**—मत्र थोड़ा दूधला और लकड़माया जलित बधिरतासे बातेजे खनि और दूधरी दूधरी प्रकारसे मल मूत्र

पड़े पर मनुष्यकी बातें न समझमें आवें तथा कानमें सदा एक प्रकारका शब्द मालूम हो इत्यादि लक्षणोंमें फलफोरस ३० । रक्त संचय हो जानेके कारण शिरका दर्द कानमें एक प्रकारका शब्द मालूम होनेके साथ बधिरतामें चिनिनाम-सलफ ३० क्रमका विद्युर्घ । अपरिमित शुकचयके कारण सुननेकी शक्तिकी कमी हो तो एमिड-फन ६ । सर्दिमें उत्पन्न हुइ नयी बधिरतामें एकोनाइट ६, बेलेडोना ३ या पलसटिला ६ और पुरानी अवस्थामें मर्कूरियस ६ । ज्वर या दूसरी बीमारीके बाद बधिरता हो तो बेलेडोना ६, पलसटिला ६ । माइलीनिया ३०, चाइना ३, सलफर ३० और एमिड फन ६ । कर्णगह्वरमें फोड़ा होकर वह स्थान बन्द होनेके कारण मनुष्य बहिरा हो जाता है ऐसी अवस्थामें सलफर ३०, हेपर-सलफर ६, चरम-मैट ६, कटिक्स ६, और एप्पिम-क्रूड ६ ।

—०—

## ७ नाककी रोग ।

नाकमें फोड़ा (Ozæna) .

नाककी शैफिक भित्रीमें फोड़ा होकर दुर्गन्धित पीप या स्नेह बहने लगता है । इस रोगमें धीरे धीरे नाककी शक्ति या उपास्ति ध्वंस प्राप्त होकर घ्राणशक्तिका लोप हो सकता है । पाराके अयस्कबहारने, उपदंशके कारणसे,

पुरानी सर्दी, छोट, घलर नाकमें प्रथम कर जानेमें घोर पिता या माताके द्वारा दीर्घमें यह रोग उत्पन्न होता है ।

**विकित्मा ।**— नाक नास, सूजी हुई तथा उसमें दर्द हो, नाकके रंध्रमें गरमी घोर दर्द साम्प्रत हो, पीला साभावृक्त या पीला साव, कभी कभी उन्मिश्रित या कुछ सूखा हुआ या पच बचे मो चरम भेट ६ । गर्मी सर्दीमें नाकमें रक्त बहना बहनेके कारण नाकका कपरी भाग नास का तथा उसमें दर्द होय, फिर नाकका विपला भाग बड़ जानेके कारण मृन्दनेकी शक्ति उनी रहे, उसमें पीय तथा रक्त मिनी हुआ या मर्मिक पीचन के भाति दुर्गन्धमय साव हो इत्यादि लक्षणोंमें केषि वार्धक्य ६ । दागके पयस्वकारके कारणमें या उपदग रोगके बाद या पिता माताके दाग होयमें पीनस रोग होने पर घोर उसमें साव जनन घोर सूजनके लक्षणों दुर्गन्धित पीय या येलामिनी हुआ पीन बचे मो रण्डि नासिक ६ । रनिगय दाह घोर जननके साव नाकमें दागोंको तरह बचे दा उमोके साव होय पर रगधन इत्यादि लक्षणोंमें, नाकके पुराने बीरुम चार्मिज ६, ७० देना राबिध ।

### नाकमें रक्त बहना ( Epistaxis ).

दर रोग दर्द नासाम्प्रत दिगर्द दे मो दसा देनेको घोर जनन नहीं है किन्तु दर्द बगवार दर रोग उमड़ रनि मो

वा टेनी जरूरी है। एक चोरके नाकके छिद्रमें मग्न रहता है। कभी कभी यही रक्त नाककी राहमें निकलकर स्वरनाली, गलकोष या आमाशयमें आजाता है। भागेमें रक्त अधिक होनेके कारण चोर कड़ी चोट लगनेके कारण तथा बहुत परिश्रम या खांसीमें इस रोगकी उत्पत्ति होती है। ऋतु बन्द होकर या अर्गोवलिमें रक्त बहना बन्द हो जाने पर नाकमें रक्त निकलने लगता है।

**चिकित्सा ।**—फेरम आयड = चूर्ण, इसकी उत्तम दवा है। बारबार जमा हुआ रक्त बहे तो हैमार्मेलिस ३१ भीतर प्रयोग चोर दो तीन बूंद हैमार्मेलिस १० नाकके भीतर छोड़ देनेमें रक्तसाव बन्द होजाता है। रक्त सावके बदले या अर्गोवलिका रक्तसाव बन्द होनेके कारण नाकमें रक्त गिरने पर पलमेटिला ६, हैमार्मेलिस ३१, पडोफाइलम ६, वो मलफर ३०। मस्तकमें या नाकमें चोट लगनेमें नाकमें रक्त गिरता हो तो आर्निंका ३१। रह रह कर रक्त बहनेमें चाइना ६, चोर कार्बोभिड ३०।

## नासा Polypus .

ग्रैफिक भिर्नाके उपादानमें नासिका गहराई बाँधमें लहसुन या पिटाइक के तरह मृज्ज हो जाती है यह एक या दोनों नाकमें होता है नासा होनेके पहिले प्रायः

मर्दा हो जाती है। पश्चिमे सरदनमें थोड़ी थोड़ी ददं होती है, फिर मध् चंगमं बड़ी ददं होती है, पणि चौर चेरग मान हो जाता है, दवा धनेडोमा ६, मैगुनेरिया १५, पर्यायक्रममें देना चाहिये ।

## ८ रक्तमंचालन यन्त्रकी पीड़ा ।

हृत्पिण्ड ( Hypertrophy of the Heart ).

हृत्पिण्डका आकार शरीरका कसमें कुछ मिलता है । यह बढ़कर गोल चौर भारी हो जाता है चौर मध् धेरी मोटी हो जाती है । कामगत बहुत करनेके कारण रक्तकी मंचालन क्रिया बन्द होनेमें यह रोग उत्पन्न होता है । इसमें लक्षण— हृत्पिण्डकी क्रियाका लेख होना चौर शरीरके मांस उमका बचना, हातों थड थड करना तथा एक प्रकार ददं मांसम होना, तथा लय लय हाकर लोभी होतो है । परिश्रम करनेमें सांसमें लया होइनेमें बहुत चौर नाड़ीका लुट चौर दृढ़ हो जाता कभी कभी वनस्पतिक रोगकी जगह मृत्र भी होतो है ।

चिकित्सा :- हृत्पिण्डके क्रियाका बहि चौर इसमें लेखी, शरीर लय ददं, नाडी लय चौर दृढ़ मांस में दा होइनेमें बहुत दवादि मचनेमें एकनाइट ३ देना चाहिये । हृत्पिण्डके रोगकी दुरचना माया भुजना मृदाभाय परिश्रम





**चिकित्सा।**—धीन और विषम गति नाड़ी दुर्बलताके साथ ही मांसमें कष्ट और मृत्युभय, चेहरा मलिन आंग्रे धमौ हुई इत्यादि लक्षणोंमें धार्मिक ६, १०। जिन मनुष्योंको शरीरमें रक्त विशेष हो उनके हृत्पिण्डमें मांस एक जगहपर एकीभाइट १५, १०। बारबार हृदस्पन्दन, सूखा, व्याकुलता और नाड़ी धीन हो तो एमिड हाइड्रो १। हृत्पिण्डका आलेप, ऐसा मान्य होना मानो मोहके हाथमें हृत्पिण्डको किसीने पकड़ लिया हो तो कैकट १५, पाक-म्यसोकी क्रिया बिगड़कर हृत्पिण्ड उत्पन्न हो तो नक्त-भूमिका ६, १०।

### हृदस्पन्दन ।

(Palpitation of the Heart).

अथ शरीरके हृत्पिण्डकी क्रिया समभाव ही रहती है। असमभाव होनेपर कोई रोग हुआ है, अनुमान करना चाहिये। अत्यधिक दुर्बलता, रक्त प्रधान धातु अतिशय मानसिक चिन्ता, अपरिमित शारीरिक परिश्रम या व्यायाम, गुल्मवायु, रजसावर्क की विनियोगता, अतिमैयुन, अपरिमित मादकद्रव्य सेवन, अथवा रोगकी कठिन पीड़ा इत्यादि कारणोंसे हृदस्पन्दन रोगकी उत्पत्ति होती है।

**चिकित्सा।**—मुखमण्डन उत्तम और नान, हाथ पैरकी अवयवता, मांस तेज, मामान्य उत्तेजनामें हृत्कम्प,

हृत्पिण्डकी क्रियाका लोप मालूम होना इत्यादि लक्षणोंमें एकोनाइट ६, हृत्पिण्डमें दर्दके कारण वक्षस्थलमें भी दर्द, चेहरा लाल, शिरमें दर्द, इत्यादि लक्षणोंमें वेलेडोना ३ । हृत्पिण्डकी क्रिया कभी तेज कभी बन्द, हिलने या मोनेसे मालूम हो कि हृत्पिण्डकी क्रिया लोप होगई है; अत्यन्त अस्थिरता बहुत परिश्रम और अतिशय मानसिक उत्तेजनाके कारण हृदयस्फन्दनमें डिजिटेलिस ३० । मनमें ऐसा होना कि हृत्पिण्डकी क्रियाको कोई हिला देता है या दबा देता है या बड़े तेजसे उछालता है । सर्वदा हृत्पिण्ड धक् धक् करे, बाई करवट सोने या घूमनेमें हृदि हो तो कैकम ३१, कभी कभी सांस बन्द होकर मूर्च्छा, चीण और दुर्बल नाड़ी, बाई और दर्द बारबार ठंढी मांस लेना, हृत्पिण्डकी क्रिया कभी तेज कभी धीरे इत्यादि लक्षणोंमें लैकसिस ६ । सायविक दुर्बलताके कारण हृत्पिण्डकी पीड़ा और उसके साथ ही बारबार मूत्र होना इत्यादि लक्षणोंमें लैकेमिस ६ वा ३० ।

### मूर्च्छा (Syncope).

सायविक दुर्बलताके कारण कोई कोई मनुष्य सम्पूर्ण रूपमें या थोड़ा बहुत अज्ञान हो जाते हैं, इसको मूर्च्छा कहते हैं । अतिशय दुर्बलता, रक्त इत्यादि धातुके क्षयके कारण भय, मानसिक विकार हटात् हय या शोक्के कारण भी मूर्च्छा हो सकती है

**चिकित्सा ।**—रोगीको मूर्च्छित होते ही कपूर या मृगनाभि (कस्तूरी) रोगीको नाकके पास रखना चाहिये । ५।६ मिनिटके बीचमें बारबार नाकके पास रखते ही बीबीभी जाती रहती है । रोगीको निगमनेकी सामर्थ्य रहने पर लक्षण विमेष देखकर निम्नलिखित औषध प्रयोग करनेसे रोगके फिर आक्रमण करनेका डर नहीं रहता और बीबीभी आरोग्य होजाता है ।

हटातु मानसिक विकार या भयजनित मूर्च्छा होने पर एकीनारट ३५ और ओपियम ३० । रोगी निश्चेष्ट भावसे पड़ा रहे तो नक्सभमिका ३० और चामन-कार्ब ६, रस इत्यादि धातुचयसे उत्पन्न भई हुई पीडामें चायना ६, गारो रिक दुर्बलता और अस्थिरतामें चामेनिक ३०, मय शरीर ठंडा, हाथ पैरमें पसीनाके साथ दुर्बलता और मूर्च्छा हो तो भिराडम-भिर ३५ । वायु प्रधान दुर्बल मनुष्योंको नक्स मस्कोटा ३०, और द्रुतपिण्डकी क्रियाके विकार जनित मूर्च्छा रोगमें डिजिटैलिस ६ ।

### गलगण्ड (Goitre).

गलेके गांठकी हदिको गलगण्ड कहते हैं । इसमें ऊपर या प्रदाह कोई उपसर्ग नहीं दिखाए देता पर गांठ अधिक बढ़ जानेके कारण टोंक गिलने या मांस लेने छोड़नेमें कष्ट हो सकता है ।

चिकित्सा । तदुक्तं चौर वीमल मलमण्डलं चारयो  
दियम ० वाहरी प्रयोग करनमें लाभ होता है । अत्रिया ॥  
चौर चारयोदियम ६५ पर्यायक्रमम् । मलमण्डली सामान्य  
गुजनमें वैलत्रिया ६ ।

## प्रवामयन्तकी पीड़ा ।

मती ( Catarrh ).

प्रवामयन्तकी पीड़ा एक प्रदाहयुक्त होनेसे मती हो जाती  
है । वैमल नामिकाकी प्रतिक्रिया भिन्नी प्रदाहयुक्त होकर भी  
मती होती है तथा नाक चौर मन्त्रिकी प्रतिक्रिया भिन्नी मल प्रदाह-  
युक्त होकर मतीमें लागू हो कर उत्पन्न होता है । रोगकी,  
परिणीत चरमामे रोगी मलिन, दहनमें दर्द, उभार आता दिग्गमे  
दर्द, मादा धूमना, आंखे लागू, मांस गर्म, बारबार छीक चौर  
मादरी आंखों चौर नाकमें दाना दिग्गमा इत्यादि लक्षण प्रकट  
होते हैं । फिर पीड़ा पीड़ा जाड़ा मन्त्र चौर चंदन जाती, मूर्च्छा  
आती, शरीरभङ्ग, दुःखान्तर, मल चरमोंमें दर्द इत्यादि लक्षण  
प्रकट होते हैं । कारण— अतिक्रिये देहमन्त्र कीला कष्टा  
परिणत, चरमोंमें भीजने चौर या मती लगने चौर दवावक  
चरमोंमा इन्त करनमें दह रोग उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा ।—अत्रिक्त वैमल रोगी परिक्रिये  
चरमामे उद पीड़ा पीड़ा उद मन्त्रिकी रोगी दर्दमें दर्द हो  
चौर नाकमें चरम हो ।

पकोनाइट ३ । रोगकी पहिली अवस्थामें थोड़ा थोड़ा आड़ा ज्वर, जंभाई, बदनमें दर्द, पांखोंमें जलन, पांखोंमें पानी भर पाना मांस गर्म बारबार छींक पाना माया भारी होना पतला, ऐसे बहना और चतुर्न्त मनिनता ।

ट्रायोनिया ३५, ६, ३० । खासगालीकी शैथिक भित्तीमें जलन, कटकर खांसी खासते खासते थोड़ा कफ निकलना, कफमें नाकका छिंद बन्द हो जाना, खासनेके समय बसस्थानमें दर्द, पांखोंमें जल गिरना, पाकस्थलीकी क्रियाका बिगड़ना, बसके बगलमें सुई बेधनेकी तरह दर्द ।

जलमिमियम ३५ । बीठमें आड़ा मानूस होकर ज्वर, ज्वर बारबारके पहिले माया गर्म, धाम, मायाभारी, बेहरा लाल, मज्जल चक्षु, नाडी पूर्ण और द्रुत, गलेमें दर्द, खांसी और खरभाह ।

थार्मेजिक एलबम ६, ३० । अधिक पतला उत्तम और जलनकी साथ छेआसाव, बार बार छींक पाना पांखोंमें जल गिरना, चतुर्न्त ग्लानि और तन्हा, नाक, घाघ्र, स्वरगाली और काठमालीकी चसम्बता ।

एलमेटिन्मा ३, ६, ३० । नाकमें गाढ़ा दुर्गन्धयुक्त छेआसाव, कान और माथेके बगलमें तेज दर्द, माया भारी मानूस होना, किर्मी दृश्यका स्वाद या सुगंध न पाना, गर्म घरमें और मस्युकी रोगकी तृति



तुल्यता ।—पहिले माथा धरना, फिर बालस्थ, ज्वर, वक्षमें गर्मी, स्वरमद्ध, खासकष्ट, मूखी खांसी, फिर फेनकी तरह गाढ़ा हरिद्रा वर्णका ग्रन्था बहना जीभ मयसी घोर पेशाब कम पाना । दूसरी चक्खामें—अतिशय खासकष्ट, गला छडछड करना, ज्वर, बदनमें गर्मीका बढ़ना,—१०४ तक ग्रीत, पसीमा, चटचटा पसीमा, दोनो गाल पीले या नीले, मूखी घोर रुखड़ी जीभ, पेशाब कम घोर हाथ पैर ठण्डे । ४।५ दिनमें रोगका चक्का हो जाना ठीक है नहीं तो धीरे धीरे रोग कठिन हो जाता है। बूढ़े मनुष्योंको यह रोग प्रायः पुराने आकारमें प्रगट होता है :—

**चिकित्सा ।** ऐकोनाइट १५ । छाती घोर गर्मेके बीचमें कुटकुट करके कष्टकर खांसी घोर उमौ कारचमें कपालमें घोर जनपटीमें दर्द ।

**ऐण्टिमोट ६-१० ।**—खामती खामती खासरोध होनेका उपक्रम, घोडा घोडा कफ निजलना, मांस मांस शब्द, कमर पीठ घोर शिरमें दर्द, तथा हृदयन्दन ( हृद घोर लडको के वायुपदाहमें ) ।

**बेनेडोला ६ ।**—( ऐकोनाइटमें कोई लाभ न दिखार दे तो ) मूखी, घोर मूखी खांसी, ज्वर, शिरमें दर्द, पाखें तथा चेहरा नाल ।

**त्रायोनिया ६-१० ।**—गलेकी नाली घोर बड़ी बड़ी मांस-

नार्ना चाक्रान्त होकर बड़ी बटकर खांसी होती है । पीला घोर रहमिना हुआ घरेला बहना, खांसते खांसते दृढ़क कारण बचस्यनकी एकड़ लेना ।

फैलिनाइकम ६-१२ ।—स्वरनार्नी घोर बचस्यन प्रदाह । हॉटी हॉटी स्वरनानियां चाक्रान्त होकर बटकर खांसी, बहुत देर तक खांसते खांसते गाठकी तरह सादा या मैना कफ निकलना, पीली घोर मैनी जीभ, भूखका न लगना ।

चार्मेनिक ऐल्वम ६-१२-३० ।—बचस्यन जकड़ा मानूम होना, मोनमे फफुर्नीकी तरह होना सांस लेने तथा छोड़नेमें कष्ट, खांसते खांसते पतला कफ निकलना (बूढ़े घोर दुबने मनुष्योंके पुराने वायुनार्नी प्रदाहमें) ।

कार्बोमिड ६-१२-३० ।—रोगकी पुरानी या चरमावस्थामें रोगीके हाथ घोर पैरोंका तलवा ठण्डा होता हो घोर सायही बड़ी दुर्बलता हो, हाथ पैरके नख नासं हों, स्वरभङ्ग हो तथा तेज कफ हो ।

एकीनाइट ३१ घोर फमफोरम ६ । (पर्यायक्रममें) ।—नड़कीके बड़ो-न्दूमोनिया रोगमें ।

चाइना ६-१२-३० ।—बहुत घरेला साव होकर रोगी कमजोर हो जाने पर देना ।

साधारण नियम ।—नीनेके समय सायने नीचे मोटा इखना देना चाहिये । समय समय बचस्यन पर तीसीकी



पुलटिस देनेमें लाभ होता है । रोगी यदि बहुत कमजोर हो जाय तो मांसका काय दिया जा सकता है । थोम या मर्दी न लगनी चाहिये ।

## हफनी (दमा) (Asthma).

ब्रश्मस्यस्यकी विमारोके कारण जो सांसका कष्ट होता है, उसीको दमा नहीं कहते । फुफ्फुसके वायुपाने मल छोटी छोटी रंगोंमें (पिम्पी) में ढके हुए है । इन्हीं पेमियोंके आसोपके कारण आमकष्ट उत्पन्न होता है और गन्ना सांय सांय करता है, तथा हमको हफनी (दमा) कहते हैं । हफनी प्रायः मीने-वाला रोग नहीं है परन्तु बड़ाही दुःखदायी है ।

इस रोगमें सांसका बड़ा कष्ट होता है, गन्ना सांय सांय करता है ब्रश्मस्यपर दाब मालूम होता है, शय्यापर सीने या बैठनेमें कष्ट होता है । वायु पानेकी आत्मासे रोगी दोनों कंधे ऊंचे किये रहता है । अधिक करके पिछली रातकी यह रोग अधिक मताता है, खामत खामत बड़े कष्टमें छोड़ामा कफ निकलनेपर हफनी कुछ कम होती है, हफनीमें सांसके खींचनेके समय किसी किसीका पेट फूलता है, माथा भारी मालूम होता है तथा वमनको दृष्टा आदि उपमर्ग दिग्दर्श देते हैं, पिता माताको यह रोग रहना, रात्रिमें अधिक खाना, रक्त दूषित, वायुके साथ धूनके कणोंका या तेज

गन्धका मांसके साथ शरीरमें प्रवेश करना इत्यादि कारणोंमें यह रोग उत्पन्न होता है । हंफनीका रोगी प्रायः टीर्थजायी होता है ।

**चिकित्सा ।**—**हार्मोनिक** ६, १२, ६० पुनःपुनः यह जमा हो जानेके कारण उत्पन्न भये हुए श्वासकष्टमें गला मांस मांस करे, भुजनेमें रुद्धि, वल्लभ्यनेमें गर्मीका मान्न होना और पनीना ठंडा ।

**हृषिका ६ ।**—वल्लभ्यनेमें रुद्धि मान्न होना, घन घन मांस, धड़फड़ रुद्धि, मूत्र रंग ठंडे, मूत्र शरीर विक्षेप करके रंजित होना, हृषिकी, वल्लभ्य करनेकी इच्छा, श्वासकष्ट रंजित होना ।

**एकीनाइट ६, ६० ।**—हृषिकी श्वासकष्ट होनेपर श्वासकष्ट, मांस रंजितमें रुद्धि, हृषिकी की रंजित होना ।

**हृषिका-मिट ६ ।**—हृषिकी श्वासकष्ट होनेपर श्वासकष्ट, मांस रंजितमें रुद्धि, हृषिकी की रंजित होना ।

**हृषिका-मिट ६ ।**—हृषिकी श्वासकष्ट होनेपर श्वासकष्ट, मांस रंजितमें रुद्धि, हृषिकी की रंजित होना ।

**हृषिका-मिट ६ ।**—हृषिकी श्वासकष्ट होनेपर श्वासकष्ट, मांस रंजितमें रुद्धि, हृषिकी की रंजित होना ।

है। खांसी दो प्रकारकी होती है :—सरन और कठिन ( सर और सूखी ) यक्ष्मारोगमें, ज्वर और वक्षस्त्रयमें दर्दके साथ शरीर चय करनेवाली खांसी रहती है। हफनी रोगके माघ जो खांसी रहती है, वह रातको बढ़ जाती है और उसीके माघ ग्रामका भी कष्ट वर्तमान रहता है। ग्यूमोनिया रोगमें इंटके चूर्णकी भांति वर्णविशिष्ट चक्षु मिठीवन-युक्त खांसी रहती है। खूनकी खांसीमें रक्तके माघ खांसी और मूखी खांसीमें घन घन शब्द करके खांसी होती है। हामस्वरके माघ भी एक प्रकारकी सूखी खांसी देखी जाती है ।

**चिकित्सा ।**—एकोनारट ३१।—उत्कण्ठा, मार्घमे पीडा, कजियत, चित् भीममें खांसीका शान्त रहना, करवट सोनेमें खांसीकी हृदि खांसनेके समय वक्षस्त्रयमें खोंचा-भारनेकी तरह दर्द, सूखी खांसी ।

**इपिकाक ३५ ।**—बारबार हाँक, कष्टकर सांस प्रत्यास, चासेपिक और सांस शब्द करनेवाली खांसी, स्वरनानीमें सुरसुरी या घावके साथ साँय साँय शब्द या बहुत दोषा जम कर घड़ घड़ शब्द, खांसनेके समय शार्भीमें दर्द, वमनकी इच्छा ( मिचली ) या वमन ।

**असिमिमियम ३ ।** स्वरभंग या स्वरवदके साथ तेज खांसी और उसीके साथ कण्ठमें और वक्षमें दर्द, ( प्रदाहकी पहिली अवस्थामें ) ।

वेनेडोना ३ ।—स्तरनाली और कण्ठनालीमें जलन ; पूर्ण और कठिन नाड़ी, उजली आंखें, चेहरा लाल, मायाभारी, मस्तिष्कमें रक्त अधिक, कभी स्वस्थ, कभी ठमके की खांसी, रातको हृदि, ठंडी हवामें पाराम मान्नुम होना, वक्षस्थलमें दर्द, खास प्रसास सुदु ।

एसिड-नाइट्रिक ६, ३० । दुर्बलता, मानसिक अवसाद, मायाभारी, भूखकी कमी, पाकस्थलीमें दर्द, भोजनके बाद पेट भारी मालूम होना, रात्रिमें शरीरके गर्मीकी हृदि, प्यास, पसीना, नींद न आना, वक्षकी हड्डीके नीचे दर्द (पुरानी खांसी) ।

एण्टिमार्ट ६, ३० । स्तरभंगयुक्त सूखी खांसी, गला घड़ घड़ करके पतला कफ कटसे निकलना, भोजन करनेके समय खांसते खांसते खाया हुआ पदार्थ वमन, खांसनेके समय जंभाई आना ।

ब्रायोनिया ६, १२, ३० ।—खांसनेके समय मस्तक, वक्षस्थल और वगलमें खींचनेकी भांति या सूई बेधनेकी तरह दर्द ; वक्षस्थलमें दर्द, खांसनेके समय सब अंगोंका कांपना, सुबहकी, सन्ध्याके समय और ठंडी हवामें खांसीकी हृदि, सूखी खांसी ।

डुसैरा ३ ।—रातके समय खांसीकी हृदि और साहस वमन और टकार, कभी कभी रक्तमिश्रित स्नेह निकलना, रह रह कर खांसीका वेग, सोनेसे खांसी बढ़ती है इससे रोगीको उठकर बैठना पड़ता है ।

**घार्निंका ६ ।** घणस्यायी ठसके की खांसी, खांसते खांसते सब शरीरका कांप उठना, कफके साथ रक्त निकलना, वसके वगलमें सूई वेधनेकी भांति दर्द ।

**घार्सेनिक ऐस्सम ६, १२, २० ।**—खास खांसीकी भांति मान बन्द करनेवाली खांसी, वसखलका चाकुचन, बेधैनी, प्यास ।

**कटिकम ६, २० ।**—सूखी खांसी, खांसते खांसते 'चापची चाप पियाच निकल जाना, खरभंग, रातके समय शय्याकी गर्मीमें खांसीकी हडि, शीतल जल पीनेसे खांसीका बन्द होना, खांसते खांसते गले तक श्वाका आजाना पर रोगीकी घूकनेकी शक्तिका न रहना ।

**केमोयाम ६-२० ।**—गला खुस खुस करने सूखी खांसी, सोने, बैठने या हँसनेसे खांसीकी हडि तथा रातकी खांसीका बढ़ना, दिनको कम होना ।

**हिपर-सलफर ६ ।**—पुराने पन्निमाम्यके साथ खांसी, गलेमें जलन और खरभङ्गके साथ कड़ा गठोला श्वा निकलना । सर्दी लगनेमें खांसीकी हडि, गलेमें कीर्द चीज पटकनेकी तरह मालूम होना और उसी कारखसी घूज मिलनेमें कष्ट ।

**हायोमायेमस ६ ।**—आयविक आघेपजनित सूखी खांसी, रात्रि और सोनेमें खांसीकी हडि तथा उठ बैठनेसे खांसीका कम हो जाना ।

इग्नेमिया ६।—हिडिरिया से गुल्मवायुघ्नता गेगीर्वा  
खांसीके कारण नींदमें ब्याधात, कण्ठनालीका बड़कड़ाना,  
छांमनेमें गलेकी खुमखुमीका बढ़ जाना ।

सेलि.दाइवम ६।—छांमते छांमते रक्त, मित्रा घुंका  
निवन्धना, छांसीके दाद माटा घुमना, सुदृश्यी नींदमें उठने  
पर और भोजनके दाद छांसीका बढ़ना ।

मर्क्यूरियस-सल ६।—पीप मित्रा घुंका घुंका (पुरानी  
छांसीमें), रातमें हडि, हाथोंमें गले तक ऊपरके साद दई  
और सखभड़, उदरामय, ज्वरगत घुंका घुमना ।

मकमलिका ६-१०।—छांमनेके समय दादछांसीमें दई,  
शिरमें दई, गलेकी छालीमें ज्वर, दृष्टदृष्टा घुंकाका निव-  
न्धना, दृष्ट कंधे के दा भोजनके दाद छांसीकी हडि,  
भुजने दा औरमें काम होइने पर छांसीकी हडि, छांसीके  
काण्ठमें नींद न छांसी, हिन्दू घरके हिन्दू काममें छांसीका  
दाद बढ़ना ।

परायोरम ६।—यका सुखसुख कावे कूली छांसी, का  
भा, हाथोंमें दई, घेन मित्रा घुंका और दृष्टदृष्टा पीप  
मित्रा घुंका कंधेकी घुंका निवन्धना, कंधे, हडिने दा दोषमें  
छांसीकी हडि ।

एम्प्रेसिका ६, १०।—दृष्ट काम से कावेने काण्ठ  
काण्ठका दा, कंधेकी दृष्ट दृष्ट दृष्ट, हिन्दू पीप दृष्टा नींद

झींझा निकलना, रातको घोर मोनेसे सूखी खांसी । बाहरकी वायुसे खांसीकी सृष्टि ।

## १० । परिपाकयन्त्रकी क्रिया ।

मुखगहरका प्रदाह (Stomatitis).

इस रोगमें मुखपरक भित्री मांस रंगकी हो जाती है, घृजन और वेदनायुक्त या घत होकर कभी कभी पीप निकलने लगता है । मांस लेने तथा खीड़नेमें दुर्गन्ध आती है, जीभ लाल और छत्री हुई, मसूड़ा, और तानू भी सूज जाता है ।

पाकाशयकी क्रियाकी विषयवृत्ताके कारण, डाम या स्फोटक ज्वरके बाद अथवा मुंहमें गर्म चीज प्रवेश करनेसे यह रोग उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा ।—पारा खानेके कारण यह रोग होनेसे मारुटिक-एम्बिड ६, तथा दूसरे कारणसे होने पर मार्कमन ६ ।

## दन्तशूल (Tooth-ache).

एकाएक अतु परिप्लव्न, अजीर्ण, गर्भावस्थाकी अग्रयवीय पीड़ाकी उत्तेजना और वायुकी पीड़ा इत्यादि कारणोंसे दन्त-शूल ( दांतोंमें दर्द ) उत्पन्न होता है ।

**चिकित्सा ।**—बहुत करके सब प्रकारके दन्तग्रन्थमें पहिले प्राग्नेगो १ मज्जन और प्राग्नेगो २ दांतीमें मसूड़ेमें घमने-मर्ही साम होता है। ठण्ठी हवामें दांतीमें दर्द, ठंठा धानी देनेमें दर्दका दन्त होना; एक औरकी दर्दमें एथोनाइट ११ । साम लेने तथा होडनेमें दुर्गन्ध, कीहबह, और दन्तघटनित दन्तग्रन्थमें क्रियोजोट १२ । मसूड़ेमें मूँदें बंधने की तरह या दप् दप् दर्दके साथ कई दांत आक्राम्य होनेमें और यह दर्द विषराम्योल (घुमनेजाली या कभी इधर या उधर) होने पर सेमेडीना १ । मर्हीके कारण उत्पन्न हुई दांतके दर्दमें (यदि दन्तग्रन्थ न मूँजे) मुँहमें कीई चीज प्रवेश करनेकी साधक रहानेकी भांति दर्द हो और साथ ही पहिले दर्द जारी रहे तथा दिहावमयी मर्ही और तीनरे पहर रोमरी हडि की लो एथेनेटिमा ३ । ठीक मर्यादे मसूठ दांतका दर्द और जीभमें गाढा गाढा मीठ दिखार्ह दे लो सेल्लाम ४५ । दांत बड़ा आक्राम्य हो, दांतीकी दांतीमें रहाने तथा दहा जस मर्ही होकेसे दन्तघटनित होकर दर्द हो, दांतमें उदात्तमें दन्त तब दर्द दहा जाये, मर्ही मर्हीमें मर्ही लो एथेनेटिमा ४ । दांतकी दन्तग्रन्थमें—दर्द रहाने दर्दका दन्त, दांत दहा या दन्तघटनित होना आक्राम्य हो, दन्तग्रन्थ और दांत मूँदें जाये, दन्त रोम रोम दांतीमें मर्ही 'दन्तग्रन्थ' दन्तघटनित मर्ही दन्तग्रन्थ सेमेडीना १ ।



सामदायक होता है । दन्तशूलमें दर्द, तथा रक्तस्राव, मुँह सूखा रहे पर प्यास मानसूय न हो, चबानेके समय दर्द इत्यादि लक्षणोंमें कार्ष्णीभेज १२ । छमिजनित दांतकी दर्द, गर्भावस्थाकी दांतकी दर्दमें और दूसरी दूसरी तरहकी दर्दमें मर्कुरियम ६ । चेहरेके चारो तरफ मोचने या खोचा घेघने की भांति दर्द कानतक दर्द बढ़ी हुई, बहुत सार बहना रातमें दर्दका बढ़ना इत्यादि लक्षणोंमें मर्कुरियम ३५, कमका विष्पूर्ण सेवन कराना चाहिये । बढ़ती हुई हवा दांतमें लगते ही दर्दका बढ़ना, दांतका बड़ा मानसूय होना, धारें और अधिक दर्द, पाहारेके समय दांत ठँडे मानसूय पड़ने इत्यादि लक्षणोंमें मसफर ६ । पारा सेवनमें उत्पन्न भये हुए दन्तशूलमें—बहुत सार गिरि साथही मसूडेमें रक्त बहे तो नाइट्रिक एसिड ६, चयप्राप्त दांतोंमें तेज दर्द उनके साथही दूसरे दूसरे दांतोंमें भी दर्द, ठंडा पानी लगनेमें दर्दका बढ़ना इत्यादि लक्षणोंमें स्फाटजिनिया ३ । बरफ या ठंडा पानी लगनेमें दर्दकी भांति हो तो कफिया ३५ । दांत काले या उन पर काली रेखा दिखाई दे और विकृत हो, दन्तशूलमें नासूर या मोघ हो, चतुस्कानीन दन्तशूल, पाक्रान्त दांतोंमें चिबाने या चनन करनेकी भांति दर्द हो, विह करणा यत् वेदना कानतक मानसूय हो । शंखदेगमें दप् दप् करके

दर्द हो, दाँतोंकी जड़ सूजी या सफेद रंगकी हो, ठंडा द्रव्य पीने या खानेसे हृदि हो तो ट्रैफिस्थापिया ३० ।

**साधारण नियम।**—दांत सदैव निरापद रहे इस लिये भांति भांतिके दाँतोंके मज्जन तमाकु या चुरुट बहुतेरे लोग व्यवहार करते हैं, परन्तु उनसे लाभ तो कम होता है पर हानिही अधिक दिखाई देती है। सफेद मिट्टी तम्बूलके माघ मिलाकर दांत धोनेसे लाभ होता है, दांत हिलनेमें उखाड़ गलनाही अच्छा है ।

## जीभका घाव (Ulcer on the tongue).

कभी कभी जीभपर छोटे छोटे दाँने दिखाई देने हैं जिमसे भोजन करनेमें कष्ट होता है। मर्क्यूरियम-विन-आयडेटस विचूरु ३ इस रोगकी दवा है। परन्तु यदि रोगीको पारिका दीप हो तो एमिड नाईट्रिक ६, देना चाहिये ।

## गलज्वर (Sore-throat).

मर्देके कारण गलेमें दर्द होना, जीरसे बातें करनी, गाना, बहूता देना, स्वरभंग अवस्थामें चित्ताना, उपदंशका फोड़ा इत्यादि कई कारणोंसे यह रोग उत्पन्न होता है पहिले मुखगद्गरमें प्रदाह, घटीका इदना और तालनूल मृज जाता

है । फिर गलेकी चैयिक भित्रीमें फोडा होकर रोगीको गलेमें सुरसुरी भानूम होती है बारबार कफ निकालनेकी चेष्टा करता है, कोई चीज निगल नहीं सकता और मांस भिने तथा छोड़नेमें कष्ट होता है ।

**चिकित्सा ।**—गलेकी नर दर्दमें अतिथय उष्ण, निगलनेमें दर्द, गला लाल, पांखें उजली चेहरा लाल गिरमें दर्द इत्यादि लक्षण दिखाई दें तो वेलेडोना १५, और एकी-नाइट १५ (पर्यायक्रमसे) । गलेमें सामान्य दर्द और सूजन कुछ मोला रंग निघे हुए लाल फोडा, घास-घासमें दुर्गन्ध इत्यादि लक्षणोंमें मार्कमन ६ । नींदमें जागनेके समय गला सूख जाये, घूक निगलनेके समय गलेमें कोई गील चीज पटकती भानूम हो, गलेके भीतर देखनेमें लाल या बैंगनी रंग दिखाई दें, गलेके बाहर छोड़ी सूजन हो तो लेकेमिस ६ । घूक निगलनेमें गलेमें दर्द, तानुपदाह, फोड़ेमें पीप निकले तो (पुरानी पचसामें) बैराट्टा-कार्ब ६ । कभी कभी चार्मे-निक ६, फाइटोनेका ३, डानकेमाग ६, प्रयोग करना चाहिये ।

## पाकाशय प्रदाह (Gastritis).

नये पाकस्थाना प्रदाहमें—चापनेमें ज्वनके साथ बदनेवाले पेटकी दर्द, ठंडा पानी पीनेकी इच्छा (पर पेटमें न रहै) भभी

समय पाकस्थली पूर्ण मालूम हो ; मुह बेस्वाद हो, सांस लेने तथा छोड़नेमें कष्ट, जीभ सादी या पीले रंगकी, श्वसन्नता इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं । पुराने पाकस्थली प्रदाहमें—पाकाशयमें जलन, अस्त्र या श्लेष्मा वमन, जीभका मध्यभाग लेपयुक्त परन्तु अगला भाग लाल, वक्षस्थलमें प्रदाह, पेट फूलना, प्यास, हाथ पैरमें जलन, कोष्ठबद्ध, पेशाब लाल और घोड़ा इत्यादि लक्षण वर्तमान रहते हैं । ग्रीहा यकृत या मूत्र-यन्त्रकी पीड़ाके कारण भी पाकाशयमें प्रदाह हो सकता है । बहुत पीना या खाना, अग्निमान्दा, या विषैले पदार्थ पेटमें जानेसे यह रोग होता है ।

**चिकित्सा ।**—नये और पुराने पाकस्थली प्रदाहमें अत्यन्त ज्वाला, पिपासा और नाड़ी द्रुत रहनेसे आर्सेनिक ६ । जिह्वा क्लेदयुक्त ; वमन और भोजन किये हुए पदार्थका टेकार निकले तो एण्टिम-क्रूड ६ । पाकाशयके फुलनेके कारण हरयक्त बेचैनीमें मार्क-कर ६ । पानीको छोड़कर और सभी चीजे तीती मालूम हो ; प्यास, पाकाशयमें दर्द, शीत रहे तो एकोनाइट ३ । पाकाशयमें दवानेसे तेज दर्द, मुंहका स्वाद तीता, वमनेच्छा या वमन इत्यादि लक्षणोंमें पलसेटिला ६ । मार्क्यूरियस मल ३०, बायोनिया ३०, हाइड्रेटिस ६, नक्क-भमिका ३०, मलफर ३० पुराने रोगमें लक्षणके अनुसार आवश्यक होते हैं । पाकस्थलीमें घाव होने पर आर्सेनिक ३०, कालिवाइकम ६, क्रियोजीट १२, हाइड्रेटिस ६ ।

## रक्तवमन या रक्तपित्त (Hæmate mesis).

धूम्रमे घूमना, अधिक व्यायाम, पतिग्रय गोक, पति मैयुन, चार, सवण, पन्च और कटु द्रव्य तथा मरिचादि तेजं बीज भोजन इत्यादि कारणोंसे पित्त विगड़कर रक्त दूषित हो जाता है। यही पित्तसे विगड़ा हुआ रक्त, घोंघ, कान, नाक तथा मुखगङ्गारूप कईमार्गसे या निद्रा, योनि, और गुच्छदार अधोमार्गसे पथवा दोनों मार्गोंसे निकलता है। साधारणतः वमनके साथ सुंहमेही रक्त गिरता है, रक्तवमनके पहिले पाकस्थलीमें दर्द और भार मालूम होना, पजीर्ण, वमनेच्छा, सुंहका नमकीन स्वाद, नाडी दुर्बल, दीर्घ निद्राम; पथस्रवता, माया भिम् भिम् करना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। वमन द्वारा पाकस्थलीमें जो रक्तस्राव होता है उसका परिमाण या वर्ण भय समय पर भिन्न नहीं रहता है।

**चिकित्सा ।**—एकोनाइट ३x। रक्त प्रधान मनु-

ष्योका सुंह लाभ, पूर्ण नाड़ी, कलेजा धड़ धड करना, व्याकुलता, ज्वर, एकाएक पाकस्थलीमें दर्द होकर रक्तवमन ।

\* कुसकुमसे रक्तकार और पाकस्थलीय रक्तस्रावका प्रसिद्ध—वमनका रक्त बीजा बाबा, कैमपुत्र, मुकुन्दय या वनके साथ निश्चयता है और वमनके पहिले पाकस्थलीमें दर्द और वमनके पहिले वमनेच्छा रहती है। कुसकुमसे रक्त निश्चयने पर रक्त जागरण, कैमपुत्र, त्रेधा मिश्रित मन्त्रके भाव रक्त नहीं रहता है और रक्त निश्चयनेके पहिले दासकट और कातीमें दर्द होती है।

मिलिसोलियम १५।—दिना कटके लासवर्षका रक्त वनन ।

इपिकाक ६।—वननेच्छा या वननके साथ लाल रंगका रक्त निकलना, थोड़ी देर ठहरनेवाली बार बार खांसी, मुँहका लवणस्वाद, जीम सजल ।

हैमामेलिस १।—द्रुत, कम्यमान और भीतल नाड़ी, कासे रंगका रक्तस्राव, पेटमें गड़ गड़ कल कल शब्द, बिना कटके रक्तस्राव दुर्बलता ।

एनिकाभरडेना ३।—घट्टा घट्टा रक्त वनन, भोजन और पानसे रुझि और बहुत परियम या आघातजनित रक्तस्रावमें ।

एसेनिक ६, ३०।—सांभ लेने तथा छोड़नेमें कट, चेहरा नलिन, हृदयन्दन, बदनमें दाह; न हटनेवाली ध्यान, नाड़ी शुद्र और संवत् ।

सायना ६, ३०।—अधिक रक्त वनन होकर रोगी दुर्बल हो जाने तथा हाथ पैर ठण्डे और नाड़ी सीध हो जाने पर ।

नियम ।—रक्त वनन बन्द न होने तक मादू, वाली चारारोट, थोड़ा दूध ठण्डा करके पिलाना चाहिये और पाकसुलीके ठपर ठण्डे जलकी घर्षा देनी चाहिये ।

## पचोर्ण या पचिमान्द्य (Dyspepsia).

परिपाक क्रियाको निमग्नताको पचोर्ण या पचिमान्द्य कहते हैं, भूख कम, पेटका फूलना, कसियत या उदरामय, टैक्का चाना, चमनोदन (मिचमो) कभिजेमें जलन, पेट भारी मान्नुस होना, मुखमें जल भर चाना, भोजनके बाद पेटमें दद, नाभमें दुर्गन्ध, कभिजा थड थड करना, माया दूखना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं ।

कारण ।—अधिक तेल या चोर्णी वगैरे चीजोंका भोजन, भोजनके पदार्थ सभी प्रकारके न विचारकर सोर्णी पेटमें जाल देना बहुत दिभोजन भाति भातिकी दवा चाना मद्यपानादि बख्खावार, चर्निलिग मारीलिक चीर मानमिज पस्थिम या पस्थिमका एकदम लान ।

चिकित्सा ।—नचममिजा ६, १० । भोजनके बाद पचकनेमें भार चोर्ण ददे मान्नुस पदना, कभिजेमें जलन, पेट फूलना, लुदि टैक्का, बखवार भोजन दिशा बुधा दद दा दिम चमन, मुखका जदुवा चोर्ण चन जाद, भोजनके बाद नल्लुदिग चोर्ण बख्ख, मुखको दिम चूमना, बखवार बुधा मय प्रदर्न, पेटका कूट दोका दिमिग कभिजे मद्यपानादि जमिन चर्नोके होलमे

दमनेट्टका १ कभिजेमें जलन चमनचदा, जम मने





**साधारण नियम ।**—किमी विषैले पदार्थके पेटमें जानेके कारण वमन होनेसे जिस तरह वह विष जलदी निकल जाय, वही उपाय करना चाहिये। पाकस्थली या किमी दूसरे यन्त्रकी उत्तेजनाके कारण वमन होनेसे गर्म पानी पिस्तानेसे ही अच्छा फल होता है। छोटे छोटे बरफके टुकड़े चूसनेकी देनेसे भी फायदा होता है। कभी कभी पाकस्थलीको चाराम देने या सामान्य चाहार करनेसे वमन रुक जाता है। अग्निमान्द्यके वमनमें कच्चे नारियलका पानी उपकारी है।

### पाकाशयमें दर्द ।

#### (Pains in the Stomach).

भोजनके बाद, पाकस्थलीमें गड़से नोचनेकी भांति दर्द, भोजनका पदार्थ पेटमें पड़ते ही दर्दका बढ़ना, चक्कर या तौता स्वाद जिये टेकार, कै होकर भोजन किया हुआ पदार्थ निकल जानेसे दर्दकी कमी इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं।

**चिकित्सा ।**—नक्षत्रभूमिका ६, ३० । भोजनके बाद पाकस्थलीमें दर्द और उसके साथही थकसकता; थोड़ा भोजन करने पर भी दर्द मानूस होना, पेटके ऊपर और कोंछिमें दर्द, चाँचपके साथ वमन या वमन करनेकी इच्छा, माथा भारी, कोष्ठबद्ध, पेटका फूलना।



**चिकित्सा ।**—ज्वर और प्रदाह कम करनेके लिये एकोनाइट ४x । ज्वर, प्रदाह, गीत, चेहरा लाल, गिरमें दर्द तथा पतला दस्त इत्यादि लक्षणोंमें वेनाडोना ६ । नाभिके चारों तरफ जलनके लिये तीव्र वेदना, बड़ी दुर्बलता और सुस्ती । तेज प्यास, परन्तु थोड़ा ही पानी पीने पर कुछ देरके लिये रुकति इत्यादि लक्षणोंमें चार्मेनिक ६ । बहुत कृपण पर रक्त मिना हुआ चेष्ठा दस्त होने पर मार्ककर ६ । मरसात्ममें दर्दके साथ बारबार दस्त, पेट फूलकर डोलने तरह गन्ध, नाभिके चारों तरफ खोंचमकी तरह दर्द, मग पेटमें दर्द और मिचली इत्यादि लक्षणोंमें कम्पोसिट ६ । छोटी-२ चंत्तड़ियोंमें प्रदाहके साथ बहुत तरहका मल कर प्रकारका उदरामय, सुश्ककी दर्दका बटना, मग शरीर पीला और पेट फूलना इत्यादि लक्षणोंमें पडोफाइनम ६ ।

**साधारण नियम ।**—गर्म जमका रेश । तेज दर्दकी हानतमें मासू, चारों, चारारीट इत्यादि बहुत पथ ।

## गुल की दर्द (Colic).

गुल कदं प्रकारका है, उभमें बड़े अन्तकी या अन्तकी पगियोंके आन्तेपके कारणसे उत्पन्न हुई दर्दको पम्-गुल कहते हैं । गुल घटना बड़ी-ही कष्टदायक है । इस रोगमें ज्वर नहीं रहता । दर्द और कै ( मिचली ) रहे तो

उमकी पित्तशूल और पेट फूले, तथा दर्द हो तो उनको  
पाथानागूल कहते हैं। पेटमें विशेष करके नाभिके चारों  
तरफ मोचने या एठनेकी भांति दर्द, दवानेमें दर्दका कम  
होना, कौहबह, बारबार मलत्यागकी इच्छा, पानु दस्त  
माफ न होना, वायु निश्चलना, भिदनी या ऊँ, पेट भारी  
लान्गुल होना और देकार चाना इत्यादि लक्षण दिखाई देते  
हैं। भारी या उत्तेजक पदार्थ भोजन, रोम या मर्ही लगना,  
ठण्डा प्रयोग, पसीना रोकना, कृमि, कौहबह इत्यादि कार-  
णोंमें यह रोग उत्पन्न होता है।

चिकित्सा ।- उन्मोहित ६, १० मानिके चारी  
 ताप समर्पणाय शीतनेकी भाति दह रोगी ताप विदनाके  
 कारण हेतुन होकर दहपहाने भरी और मानिकेकी तरफ  
 'हमा'करन दह। का काट काट काटमें नाभिकी साथ ही  
 दाहकर दहानम दह कुछ दहक 'मद हमा की काट फिर  
 ह'दम'ह' द'हम'ह' म'म' दह काट करन कमा कमा दह  
 म'म' काट म'म'म'म'म' म'म'म' म'म' म'म' म'म' म'म'  
 म' काट 'म'म'म' म'म' म'म'म'म' म'म' म'म' म'म' म'म'  
 म'म'म'म' म'म'म'म' म'म'म'म' म'म'म'म' म'म'म'म'

[illegible]

कैमोमिना १२।—नाभिके चारों ओर मोच फेकनेकी भाँति दर्द, उदरामय, पेट फूलना, रातको चौर मर्मेमें हडि ।

पाइरिस् भार्म १।—पेट बहुत फूलना, पेटके ऊपरी भागमें व्याना, पित्तप्रसव, पेटनेके तरह दर्द ।

डायप्कोरिया १५।—पहिने नाभिके मध्यस्थानमें दर्द चारो ओर धीरे धीरे समूचे पेटमें फैल जाय, इस दर्दके साथ पेट फूलना, बेपाहत जीभ, सीने पर दर्दका बढ़ना, सीने खड़े होने पर चौर पीछे झुकने पर दर्द कम होना, भोजन किया हुआ पदार्थ वमनके साथ निकलने साथ एकाएक गुल वेदना चौर गभ्रावस्थाके पित्त जनित गुलमें ।

मेराटम एन्वम् ६।—रातको चौर भोजनके बाद पेट फूल कर दर्द । पेटमें गड़गड़ कलकल गल, समूचे पेटमें दर्द । मँहमें जल गिरना, मूत्र चौर जाय पेश ठण्डे ।

स्त्रियेकी गभ्रावस्थामें पेट फूलनेके साथ गुल वेदनार्थ ककूराम ६, भारी पदार्थ खानेके बादकी गुल वेदनार्थ एनमटिना ६ चौर कथोमिज ६ ( पयोयक्रममें ) । इसमें साथ कोष्ठद्वि चौर पेटका फूलना रहने पर एनमटिना ६ चौर पाइरिस्पाइडम १० ।

पथ्यापथ्या ।—नयु पण, चयान् मायु, चार्भि चौर तम दूध । दर्द पागम होने पर दूराने चारुचक्रा भाज, छोटी मइनोंका मोरवा, एनरल, घोल, जमेका फूल चौर मानकन ।

## कोष्ठवद (Constipation).

कई कारणोंसे कोष्ठवद (कठिणत्व) हो जाता है और यह अनेक रोगोंका लक्षण भी माना जाता है। किसी तरहका शारीरिक परिश्रम न करके घरमें बैठे रहना, रातको जागरण, तेज काफी, चा और मादकद्रव्य निवन करनेमें, शोक दुःख या भय पानेमें, गिर पड़नेमें, यक्षत रोगमें, अहितकर द्रव्य भोजन इत्यादि कई कारणोंसे कोष्ठवद हो सकता है। कोष्ठवद होनेमें प्रायः शिरमें दर्द, स्वरभाव, (हरारत) अरुचि अस्वच्छन्दता इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। कोष्ठवद अधिक दिनों तक रहनेके कारण अर्ध और गृध्रसी वात हो जाता है।

**चिकित्सा ।**—बारबार मलत्यागकी इच्छा पर पेट साफ न होना, बड़ा लेंड़ बड़े कष्टमें निकलना, सामान्य पतला मल, माघा भारी, पेटमें चाप मालूम होना और अरुचि लक्षणमें नक्षभमिका ३०। धौड़ार जाड़ा मालूम होना, शिरमें दर्द, यक्षत्में दर्द, मुखा, बड़ा तथा कड़ा लेंड़, वायुके कारण कोष्ठवद, गर्भावस्था और गर्भोंके समयका कोष्ठवद और लड़क्याँके कोष्ठवदमें त्रायोनिया ६. ३०। (नक्षभमिका और त्रायोनिया अलग इम लिये है कि बारबार मल प्रवृत्तिके साथ कोष्ठवदमें नक्षभमिका और मल प्रवृत्ति विहीन कोष्ठवदमें त्रायोनिया लाभदायक होता है साद्याभारें साद्या धूमना कठिन न डयक्त मल निकलना, मटा तन्दाविश, चेहरा लाल, मल परि

जाने (विशेष करके माता छापनेके बाद या स्त्रियोंके एपेण्डि-  
कम प्रदाहमें) मैकेमिमकी अपेक्षा एपिम ३० लाभदायक  
है। पर यदि मैकेमिम या एपिम प्रयोगमें लाभ न हो  
तो पार्विम ३० देना चाहिये। मृत्युभय, उत्काण्डा, जीभ  
जाल, तेज प्यास पर थोड़ा पानी पीनेहीमें प्यासका बन्द होना,  
बिह्वान पर छटपटाना, बड़ी सुर्ती इत्यादि लक्षणोंमें पार्वि-  
मिक ३०। शय्यापर हिमने डोलनेमें दर्दका बढ़ना, लक्षण  
में प्रायोनिया ३०। पर हिमने डोलनेमें दर्द बन्द होनेपर  
डामटक ३० देना चाहिये।

**पानुगद्विक चिकित्सा ।**—यूव तमंत्रज बीतनेमें  
भयकर उमका मेक, रोगकी तत्काल चपस्यामें बालोंका पानी  
देना चाहिये, फिर यूव पतला गोरवा और चन्मम दूधज माघ  
जल मिलाकर पीनेकी देना चाहिये। एम्पेपेविक डाक्टर  
हम रोगकी प्रितना भयकर समझते हैं बीमियोंपेविकजाल  
उतना नहीं मानते।

## उदरगमय Diarrhoea

बिना कुछ यदि बार बार पतला दल हो तो उमका  
उदरगमय कहते हैं। बाधकाल उदरगमय बार प्रकाशका  
होता है। । भाग उदरगमय, चर्दरगमय जल पान  
उमंत्रज रोग इत्यादि केवमक कारण उदरगमय प्रित उदरग

मय । (२) परिपाक कार्यके व्याघातके कारण अजीर्ण द्रव्य निकलनेवाला उदरामय । (३) गर्म शरीरमें ठण्डा जल या बरफ इत्यादि पीना या ठण्डा हवा लगकर एकाएक पसीना बन्द होनेके कारण प्रदाहजनित उदरामय । (४) गर्मोंके दिनोंका उदरामय । उदरामय और सामान्य हैजेका प्रसिद्ध "हैजा"के प्रबन्धमें लिखा हुआ है, उदरामयमें पेट ऐठना और कूँघना नहीं रहता, परन्तु सामान्यमें ये दोनों लक्षण दिखाई देते हैं ।

**चिकित्सा ।**—कैन्सर।—शीत, कंपकंपी, पाकस्थलीमें दर्द, हाथ, पैर और मुँह ठण्डे, गर्मोंके दिनोंके उदरामयमें और मर्दोंके कारण उत्पन्न भये हुए उदरामयमें ।

**पल्मेटिला ६, १० ।**—परिवर्तनशील मल, मुँहका स्वाद तीता, मिचली या दमन, टेकार आना, गुरदाकजनित उदरामयमें ।

**एण्टिमोड १ ।**—मार्दी हँदयुक्त जीन, टेकार, दमनेछा, चरचि, पानीकी तरह पतला दस्त, पित्त भिना हुआ दस्त ।

**इपिकाक ६ ।**—दमन या दमनेछा, दुर्गन्धित मल, रक्त भिना हुआ दस्त, पेटमें दर्दके साथ गर्मोंके समयका उदरामय, नङ्गोंका पीले रंगका या पीला भिना हुआ मल रंगका दस्त ।

**नक्समसिका ६, ३० ।**—जनि भोजन, रातमें जागरण और शराब पीना इत्यादि अत्याचारके कारणसे उत्पन्न भये हुए उदरामयमें



दरुंको गालि, फिर पहिलेकी तरह दरुं, पहिले पानीकी तरह फिर पित्त मिखा चुचा और कभी कभी रक्तमिश्रित दस्त ।

फिरमसट ३० ।—बहुत दिनोंतक उदरामय भोगकर रोगी दिनभूल कमजोर हो जाय और बहुत क्षयन पर चमोले मल निकले ।

मजहर १३ या ३० ।—पीला या सटमैले रंगका चामोय, बदना रहित मलछाव, चमोले मल, मुखको रोगका बदना, पुराने अतिमारमें (पुराने उदरामयमें) गुदा-हारमें छाव होनेपर ।

भारी भोज भोजनके कारण उत्पन्न भये हुए उदरामयमें पलमटिया ६, लक्ष्मभूमिका ३०, एन्टिम-ब्रूड ६, इपिकाच ६, दूधित जल पान और चर्पागुरु वायु भेदनके कारणसे उदरामयमें कैप्टेमिया ३२ और चामेनिक ६ । घोल, ठण्डा या गर्दा मजहर उदरामय होनेपर कैम्बर, एन्कीनाइट ३५, क्रायोनिगा ६ और इन्कामिगा ६ । अनिद्रि चय और घल भेदन जनित्र उदरामयमें कभोमिन ६ और चामेनिक ६, लसके दिनेके उदरामयमें वायना ६, भेराडम ६, पाईमि ६, और चामेनिक ६ । मानसिक कारणसे उत्पन्न हुए उदरामयमें कैप्टेमिया ६ कैयोमिना ६ भेराडम ६ ।

नियम ।—यस हा दस्त न होत तब तबसे रोगीको दस्तका चर्चा । तब तबसे दस्त प्रसारे और चमोले मल निकलनेका रोगका बदना दाह दना चर्चा ।



बहुत कुंघनेके साथ बारबार ममत्यागके इच्छा, ममत्यागके पहिले और पीछे पेटमें तेज दर्द, भ्रूवाग्रयमें जलनके साथ बड़ा कट और पेगाव छोड़ा ( कभी पेगाव बिल्कुल ही नहीं होता ) रंगी मिश्रित । रक्त जितना अधिक होगा इसमें उतनाही लाभ होगा, रक्तका भाग कम होकर शेषका भाग अधिक होनेमें मार्जमल ६ । ममत्यागके बाद फिर भी बैठे रहनेकी इच्छा बनी ही रहे और साथही बहुत कुंघनेके लक्षणमें मार्जकर ।

नक्षत्रभूमिका १० ।—ममत्यागके पहिले और समयपर चलाया कुंघना पड़े पर ममत्यागके बाद भी इच्छा रहे तथा कुंघना और दर्द बन्द ही ।

बैलेडोना ६ ।—पेट फूलना, बहुत कुंघने पर छोड़ा मल, मरुभान्धमें प्रदाह, ऐसा मान्म हो कि भ्रूवाग्रय और मरुभान्ध दोनोंकी भुका चला है, ज्वर, पाण्ड उज्जमी, बिहरा भाल और प्रलाप ममत्यागके बाद अधिक कुंघनेकी इच्छा ।

कर्मोमिल १ या ६ ।—पेट फूलना पेट कमकर एकड़ना या मोड़ना, चापकर धरने या भुक्नेमें दर्दका कम होना, मादी झेदाण्डादित त्रिहा, रक्तमय पिच्छिल पात्र और निष्फल वमनेच्छा ।

एमी ६ ।—मज्जित उभय रक्तमात्र, पतिसय कुंघना, कसमय दर्द, उरु भागी, नाभोके चारी तरफ कतरनेकी भांति

दर्द, मुँह सूखना, प्यास, पेड़ फूला, कभी कभी मलत्यागके समय सूँचा ।

कैलैरिया ६, ३० ।—मल मज, या मादा पीला, माघिपर घसीना, पैरका तलवा बरफके तरह ठंडा तथा पिंडलियोंने खँचन मलहारने दर्द ।

इपिकाक ३, ६ ।—घामकी तरह हरा अथवा चोटा गुड़की तरह काला फेनयुक्त मल, पेटमें दर्द तथा कुंघने पर पहिले फेन मिला हुआ दुर्गन्धित रक्तमल, फिर रक्तमय श्लेष्मासाव, अविरत धमन या धमनेच्छा अतिशय ग्लानि ।

कटिकम ६ । बहुत कुंघने पर खंड खंड रक्त मिला श्लेष्मासाव, गुद्घद्वार तुड़ तुड़ कर हिले और बहुत दर्द हो, पेट फूले ।

रसटक्क ६ । रातको आपही मल निकल जाये, पेटमें कतरनेकी तरह दर्द, अविरत मल प्रवृत्ति । पुराने रक्ता-माशयमें ( विगेष करके विकार लक्षण रहनेपर ) रसटक्क ३० एक महीनाध है ।

सलफर ६, ३० ।—मलत्यागके बाद कुंघनेसे रक्त लाना, तथा रक्तमय आंव न निकलकर आंवके ऊपर सूतकी भांति रक्त दिखाई दे, रोग दुःसाध्य होने तथा दूसरी कोई दवासे फायदा न होने पर सलफर ३० देना चाहिये ।

पट्ट्य ।—इस रोगमें रोगी बहुत कमजोर हो जाता है इस लिये हल्का और बलकारक द्रव्य खिलाना चाहिये ।

पारागोट, मोमो या मागूर मङ्गलीका गोरवा, चालि, पैदामाका खोड़ा रम या दूध पौर खर न रहे तो मातका माड़ दिया जा सकता है ।

## पग ( Piles ).

इस रोगमें मलद्वारकी गिराये फूल पौर बढ़ जाती है । यही बढ़ी हुई गिरायेकी "वलि या मसा" कहते हैं, यह देखनेमें मटरकी भांति होता है । मसा कभी एक ही देखा जाता है । मसा यदि मलद्वारके बाहर हो तो उसे वहिर्यलि पौर भीतर रहनेमें अन्तर्यलि कहते हैं । यही मसा कटकर रक्त निकलता है । एक प्रकारका मसा पौर होता है, उसमें रक्त नहीं बढ़ता, उसे अन्तर्यलि कहते हैं । मलद्वारके पास खगुहट, जलन, खाँटा बंधनेकी भांति दर्द, कलियत, बार बार मलत्यागकी इच्छा इत्यादि इस रोगके लक्षण हैं । बार बार जुलाब भिना ; उत्तेजक पदार्थ भोजन पदार्थ पान, मद्यपान, रात्रिमें जागरण, छुन पौर मसाला इत्यादि द्रव्योंसे बना हुआ भोजन याद्विना पण्डितमर्च बैठे बैठे दिन काटना, ठण्डा पदार्थ, भोजन पान, या खुब नमो वस्तुपर बैठनेके कारणसे यह रोग उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा ।—नन्दभूमिका ६, ३० ।—कभी कभी उदरमय, मलत्यागके समय मसाला बाहर निकल पाना,

कमरमें दर्द, पेशाब करनेके समय पीड़ा, अधिक देर तक  
दिना करने और भोजनके बादमें दर्दका बटना । शी मीन  
कुछ भी परियम नहीं करते या छी और मसाला मिना कुछ  
पटाई अधिक खाते हैं। तथा अधिक मद्यपान करें।  
मृदांश अर्थात् मस्याके समय नवमभसिका १० और कुछकरी  
मलफर १० प्रयोग करनेमें कई प्रकारका दवाभीर या चर्म रोग  
प्राप्त होता है ।

मलफर १० ।—पुराने चर्म रोगमें जह कि कीह अत्यन्त  
कठिन हो, दोरी दोरी गांठमय वह मिश्रित मल, मलद्वारमें  
जलन, और खुजलट हार हार हुआ मलत्यागकी इच्छा ।

ऐसाभेजिस २ ।—जह मरीमें वह अधिक निश्चलता हो ।  
यदि मला हाजिर हो भी बाधपाव जलमें १० इह ऐसाभेजिस  
मूल अरिष्ट मिनाकर जलमें एक साथ कपड़ा भिंतीकर  
माथे ऊपर धाई रखनेमें बहुतसे फल होता है ।

रमी ६ । अत्यन्त स्वाभाविक और कसरनेकी भाँति दर्द  
तथा बहुत कुछमेव बहुतसा मजिज दर्दवा मर्म वह निश्चल  
हो। दस्त लगता हो।

ऐसाभेजिस अथवा ऐसाभेजिस मलमें दर्द होने भी एसेलाह ६  
जलमें वह अधिक और अर्धमद्य मल दिखाने के भी एसे  
एसेलाह ६ तथा मलफर १०, मलफरमें जोरदार मलफर  
मल मर्म वह दर्द और दर्द हो भी ऐसाभेजिस ६,  
एसेलाह ६ अथवा ऐसाभेजिस ६ । रिम। वहकाहने दवाभीर

ट्रिप्लिकस १५ ।—गुच्छदारमें प्रतिग्रथ प्रदाह, छायावीथ उन्नेजनके कारण माया घूमना और नोंदका न पाना (सूतकी भांति क्रिमिमें ट्रिप्लिकस उपकारी है ।)

एण्टोनाइन १८ विधूर्ण ।—सब प्रकारकी क्रिमिमें यह उपकारी है । पेटमें दर्दके सूचनमें ।

सलफर २० ।—क्रिमिजनित शूल वेदनामें या अन्य औषध प्रयोग करने पर जब रोग कुछ कमता चले ।

फीताकी भांति क्रिमिमें—फिलिस्मास ०, मार्क-कर २५, टैनास १ क्रमका विधूर्ण, फीताकी भांति नखी क्रिमि और केंचुएकी भांति क्रिमि नष्ट करता है । डाक्टर हिडज और टेस कहते हैं कि लाइकोपोडियम २० दो दिन, मिराइम १२, चार दिन और इपिकाक ६, सात दिन प्रयोग करनेमें क्रिमि नष्ट होजाती है, क्रिमि धातु विविष्ट मिश्रके लिये कैल्शेरिया २० ।

नियम ।—एक खोलत जलमें थोड़ा नमक मिलाकर मित्य २४ बार सरनाश्रम पिचकारी देनेसे लाभ होता है । बालकीकी लघुपथ्य देना चाहिये । मीठा पदार्थ कच्चा फल मूल, चपरिष्कार जल, सडी मकली, और मांस निषिद्ध है ।

## यकृत प्रदाह (Hepatitis).

पुराना मलेरिया ज्वर, पारा या कुइनाइनका अपव्यवहार, बहुत मद्यपान, गर्भस्थानमें घाम इत्यादि कारणोंसे यकृतमें रक्त संचार होकर जलन हो जाती है, यह प्रदाह पुराना होने पर यकृत बढ़ जाता है और कठिन होजाता है तथा धीरे धीरे घेठकी दाहिनी ओर फैल जाता है। रोगकी तरुणावस्थामें पहिले जाड़ा और कंपकंपी देकर ज्वर आता है। पीछे यकृतमें दह आरम्भ होता है, मांसमें दर्द, मुँह बम्याद, स्नेहच्छादित जिह्वा, भूखना न रहना, कर्दमवत् मलिन या माटा मल, दाहिने कांधपर घोडो दर्द, कीखक दाहिनी ओर भारी मानूस होना, इत्यादि लक्षण दिखाई देता है। पहिली अवस्थामें रक्तसंचय बन्द होनेपर अन्यान्य लक्षण भी कम हो जाते हैं। यदि रक्तसंचय दूर न हो तो उत्तरोत्तर लक्षण भी तेजीसे प्रगट होने लगते हैं। जैसे दाहिनी कांधमें तेज दर्द, दाहिरी पीसी यकृतके ऊपर ऐसी दर्द कि हात तक न रखा जा सके। जोरमें सांस होइने पर या साँह खींचे मोनेपर या खांसनेमें, इस दर्दका बढ़ जाना। समन या समनेच्छा, पीसे रंगका पेशाब, कीटवह (कमिदत) या उदरामय (पतन्य दम्य होना) इत्यादि लक्षण दिखाई देने लगते हैं और यकृत भी बढ़ जाता है। रोगके आगे बढ़ होनेकी अवस्थामें दह बढ़ लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं नहीं तो धीरे धीरे रक्तके



समय आड़ा और कंपकंपी देकर जोरमें ज्वर चाने लगता है और यज्ञतमें एक प्रकारका घाव पककर प्रायः रोगीकी मृत्यु हो जाती है; और भी अनेक समय पर यज्ञतकी पाकृति छोटी होनेमें सब अंग फूल जाकर रोगी मृत्युको प्राप्त करता है ।

**चिकित्सा ।**—एकोनाष्ट १५, ६ । (यज्ञतके नये प्रदाहमें) आड़ा और कंपकंपीके साथ ज्वर, यज्ञतके दर्दमें ।

नक्षत्रभूमिका ६, १० ।—शराब पीनेसे उत्पन्न भये हुए पुराने यज्ञत प्रदाहमें कजियत और भोजनके बाद दर्दका बढ़ना ।

चादना ६, १० ।—ज्वर बहुत पुराना हो जाने पर शरीर रक्त होनेमा हो आये, झींझकी हडि, यज्ञत बड़ा कठिन, और दुर्बलता ।

मार्क-मल ६, १० ।—यज्ञतके तरुण प्रदाहमें और पुराने प्रदाहजनित यज्ञतकी हडि होने पर सूजन और कड़ाई, यज्ञतके स्थानकी दवाकर धरनेकी भांति दर्द, (इसी कारणसे रोगी दाहिनी कर्वट नहीं सी सकता है ।) पीले रंगकी आँखें, भूख अल्प, सफेद कड़ा मलिन या पित्तमिला हुआ पतला मल, सुह बेलाद सामने कष्ट ।

सेलिडोनियम १० ।—यज्ञतमें तेज दर्द, दाहिने कन्धे या दाहिने कन्धेकी हड्डिके भीतर दर्द, पीले रंगका पतला मल

या उजले रंगका काड़ा मल. सब गरीर पीले रंगका. पीले रंगका गाढ़ा पेशाब ।

न्याइम मिथूर ३० ।—यकृतमें सुई भोंकने या चिकोटी काटने अथवा दवाकर धकड़नेकी भांति दर्द, पेट बहुत फूला, कभी कभी पेटका बोलना और माघही ल्वर ।

न्याइम मल्फ ३० ।—छूने, हिलने, जोरसे मांस खींचनेसे यकृतमें दर्द, पेट खाली रहनेपर नाभिके चारो और दर्द, भोजन करनेपर इस दर्दका कम होना ।

पडोफाइलम ।—यकृतके नये प्रदाहमें कलियत रहने पर ३ क्रम । पुराने प्रदाहमें ३० क्रम—यकृत बड़ा और माघही पित्त वमन, पित्त मिला हुआ पतला मल, मलत्यागके समय कांचका बाहर निकल जाना, मुहका स्वाद तिक्त, नूव मैला, चेहरा भल्लिन, गिरने दर्द, विगेष करके शिरके अग्रभाग पर्यात् कपालमें तिक्त दर्द ।

फमफोरम ६, ३० ।—यकृत बड़ा और कठिन होकर धीरे धीरे छोटा होना और अन्तमें उदरी होनेपर ।

वार्मेरिम १५ वा १ ।—यकृतमें रक्त मंदय होकर सूत्र-नालामें, डरने, कमरमें और पेटमें दर्द हो ।

ब्रायोनिआ ३५. ६. ३० । यकृत बड़ा और कठिन. सुई वेधनेकी भांति ल्वालाकर दर्द. (दांपकर धरनेसे इस दर्दका बटना) कलियत या पायखानेकी इच्छाका बिजकुलही अभाव शिर प्रमत्ता. दाहिन कांधमें दर्द. दांखें और बटनका उमड़

कुछ पीना, यज्ञतके तरुण प्रदाहमें मार्क्शूरियमके साथ यह पथ्यायक्रमसे प्रयोग करने पर, आगतीत फललाभ होता है ।

नाइकोपोडियम १२ या ३० ।—पेट वायुसे फूना हो और कक्षियत हो, सदा दवानेकी भांति दर्द, चापकर धरने और जोरसे सांस खींचने पर दर्दका बढ़ना, दाहिनी तरफ और पेटमें दर्द ।

नेष्टाण्ड्रा ३५, ६ ।—जीभ पीले रंगकी, पित्तवमन, चमकतरकी भांति काला मल, यज्ञतके चारो ओर चमक घटना कईमवर्णवत् मल, आमामय, खर, उदरी या शीथ ।

थार्मेनिक ३० ।—यज्ञत बड़ा, सूजन, पेगाव घोड़ा, जीवनी शक्तिका काम होना, और घ्याम ।

निधिया ३० ।—जरायू और मूत्राशयकी क्रियाके विकारके साथ यज्ञतका पुराना प्रदाह, दुर्बलता, चन्निमान्द्य और गठियां, सूजन ।

डिपर सलफर ३५ विचूर्ण ।—सांस सेनेसे, खांसने और झिलनेसे दर्दका बढ़ना (यह दर्द पड़े तक बढ़ जाती है, चर्म पीड़ाके साथ यज्ञतमें रक्तसंचयजनित पुराना प्रदाहमें) ।

नियम ।—यज्ञतके ऊपर छोटे बकड़ेका मूत्र गर्म करके सेंक दे । खर रहने पर माषु, वाली चारारोट इत्यादि लघुपथ्य । मकली भांस, घृत या घीमें पका हुआ द्रव्य भोजन करना नहीं चाहिये ।

## बढ़ी हुई ग्रीहा Enlarged Spleen).

मलेरियाका विष शरीरमें छुमनेमें ग्रीहा ( पिल्ली ) बढ़ जाती है। ज्वरके समय ग्रीहावस्थामें पिल्लीमें रक्त जमा होकर यह बढ़ जाती है। इसे छोड़, हृद्रोग, रजो सोप, और वक्षसीर रोगमें रक्त निकलना बन्द होकर पिल्ली बढ़ती है। पिल्ली बढ़नेमें सब जरीर रक्तशून्य और पीलेरंगका तथा अग्निमान्द्य, क्लियत या दस्तका अधिक होना, कमजोरी इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। पिल्ली धीरे धीरे बढ़कर पेटकी बाईं तरफ फैल जाती है और इतनी कड़ी हो जाती है कि मानलूम होता है कि पयरका एक टुकड़ा रखा हुआ है। रोग बढ़ जानेपर उदरामय ( अर्थात् दस्त अधिक आना ) या रक्त आमाशय ( खून मिलि हुई आंव गिरना ) हो जाता है, भूख बिलकुल नहीं रहती, दांतका चहुंथा फूलकर रक्त गिरने लगता है अन्तमें उदर और शोथ ( सूजन ) होकर रोगीकी मृत्यु होती है। पिल्ली फट करभी कोई कोई मरता है।

**चिकित्सा ।**—मलेरिया ज्वरके साथ ग्रीहाके नये प्रदाहमें पहिले ज्वरकी दवाही करना आवश्यक है। नये ग्रीहा दाहमें एकोनाइट ३५, ग्रीहाके ऊपर सुई घेधनेकी भांति दट हो चापनेमें दट बढ़े, कभी कभी ऐठन और रक्त घमनका लक्षण दिखाई देता आनिंका ६। पेटके बाईं तरफ दबाये रहना या मृदु गडानेके तरह दट, ग्रीहा

“नामूर या सर्दन” होजाता है। यन्त्रा रोगके अन्तिम अवस्था में प्रायः भगन्दर होते देखा गया है।

**चिकित्सा ।**—पीडका (फुसरी) उत्पन्न होनेके बाद टपकसी दर्द, गुच्छदार सान रंगका, शिरमें दर्द इत्यादि लक्षणोंमें विलेडोना १५ या मार्क सल ६, पीडका मूत्रकर उसमें रीम उत्पन्न होने पर डिपर सलफर १ विदूर्ण। फोड़ेमें अधिक परिमाण रीम निकलता हो या सर्दन होनेपर साईलिमिया १०, लक्षण विशेषमें कटिकम ६, चाइना १०, कैल्कैरिया कार्ब १०, कैल्कैरिया फ्लोर १२, सलफर १० इत्यादि प्रयोग करना चाहिये।

## ११ । मूत्रयन्त्रके रोग ।

### मूत्र-पन्थि प्रदाह (Nephritis).

मूत्रकोषमें दाह होनेमें ज्वर, वमनोद्देग, पेशाब थोड़ी, कभी सान, कभी धोचनकी भांति, कभी रक्त या रीम मिश्रित, पेशाब करनेके समय तीव्र जलन, मिरदण्ड और कमरमें दर्द, पण्डकोष सान और समय समय पर पेशाब एकवारगौ बन्द होकर प्रलाप या मूर्च्छावस्था अथवा मृत्यु होजाती है। सहसा चोम या सर्दी लगना बहुत मध्यपान, रात्रिमें जागरण। सुखकारक पोषधियोंका अपव्यवहार, थोटा लगना इत्यादि कारणांमें यह रोग उत्पन्न होता है।

**चिकित्सा ।—**ज्वर, चार प्रदाह लक्षणों के साथ रोगकी पहिली अवस्थामें एकीनाइट ३x । बूंद बूंद पेशाब ( कभी कभी रक्त मिला हुआ ) पण्डकोष लाल रंगका, पेडूमें खान्नाकर वेदना, पेशाब करनेके समय जलन या पेशाब न होना इत्यादि लक्षणोंमें कैन्थारिस ६ । मलिन या रक्त मिला हुआ मूत्र, पण्डकोष लालवर्ण, शरीरके नाना स्थानोंमें शोथ इत्यादि लक्षणोंमें टेरेबिन्थिना ६ । बारबार मूत्रत्यागकी इच्छा मूत्रकोषमें कुछ वेधनेकी भांति दृढ़, पांख चार चेहरा लाल, कभी कभी प्रलाप हो तो बेलीडोना ६ । चामैनिज ३०, केनाविज स्याट ६, नक्तभमिका ३०, पलसेटिला ६, हिपर सलफर ६, मर्कूरियस सल ६, लाइकोपोडियम ३०, सोपिया ६, सलफर ३० इत्यादि औषधोंकी भी समय समयपर आवश्यकता पड़ती है ।

## मूत्रस्तम्भ और मूत्रनाश ।

(Retention and suppression of Urine).

मूत्राशयमें मूत्र संचित होकर किसी सबबसे मूत्र न निकल सके तो उसे मूत्रस्तम्भ और मूत्राशयमें मूत्रकी उत्पत्ति न होनेसे मूत्रनाश कहते हैं । मूत्रस्तम्भमें पेडू फुल जाता है, मूत्रनाशमें यह नहीं रहता । मूत्रका विषाक्त उपादान रहने मिलकर मूत्रनाश रोग उत्पन्न होता है । इन

रोगमें श्वसमयता, तन्हा, मोह, चैतन्यशून्य इत्यादि कई लक्षण प्रगट होते हैं, ज्वर विकार, हैजा इत्यादि कई सांघातिक रोगोंके साथ साथ मूत्रनाश रोग भी हो जाता है । प्रमेह रोगमें महमा रोग निकलना बन्द, मूत्रपत्रिका बढ़ना, या मूत्रस्थलीका पक्षाघात या किसी प्रकारकी चीटके कारण मूत्र रोग उत्पन्न होता है ।

**चिकित्सा ।**—मूत्रनाश रोगमें मूत्राशय प्रदाह वर्तमान रहनेपर रोगकी पहिली अवस्थामें एकोनाइट ३ और टेरिबिन्थिना ६ पर्यायक्रमसे हैजाकी बीमारीमें यदि पेशाब रुक जाये तो टेरिबिन्थिना ६, कैथारिस ६ या कैलि-  
वाइकस ६ ।

**मूत्रस्तम्भ रोगमें ।**—त्वाना और यन्त्रणाके साथ एकाएक मूत्रस्तम्भ होने पर स्विट कैम्फर । तुरतके अगमें बच्चीको मूत्रस्तम्भ होनेमें १०।१५ मिनिटका अन्तर देकर कैम्फरकी शीशी उनके नाकके पाम रखनी चाहिये । मूत्र-  
स्थलीके पक्षाघातके कारण बृद्ध बृद्ध पेशाब होने पर नक्स-  
भमिका ६ या कटिकस ६ । गुल्मवायुयुक्त रोगियोंको मूत्रस्तम्भ होने पर नक्समस्कंटा २, इग्नेशिया ६ या जैलर्मीमियम ६ । मूत्राशयकी मुखमायीपत्रिका तृषिके कारण उत्पन्न भये हुए मूत्रस्तम्भमें पलमेटिना ६ और ब्याराइटा कार्ब ६ । रोगकी पहिली अवस्थामें ३ पर्यायक्रमसे ॥ एकोनाइट ३ और जैलर्मीमियम ३ या एकोनाइट ३ और कैथारिस ६





## घापही पेशाब निकलना (Enuresis).

मूत्रमथलीमें पक्षाघात होनेसे मूत्र धारण धर्यात् पेशाब रोक रखनेकी शक्ति एकदम या अधिकांश चली जाती है । मूत्र त्यागकी चेष्टा होने पर फिर उसका रोकना कठिन हो जाता है और तुरत बूंद बूंद पेशाब होना आरम्भ होजाता है । मूत्राशयमें मूत्र भचित रहने पर भी बूंद बूंद मूत्र होता है । आघात, प्रभव कष्ट, पथरी, प्रमेह, क्रिमि रोगके कारण यह रोग उत्पन्न होता है । बड़ेके लव उन्हें नींद लगी रहनी है उस अवस्थामें घापही पेशाब कर देते हैं ।

**चिकित्सा ।**—बालक और वृद्ध मनुष्योंको कैथ्यारिस ६, मूत्राशयकी शक्ति बढ़ जाये या मूत्राशयमें पथरी होनेके कारण बालक और वृद्धको घापही पेशाब हो तो जल-मिमियम ६५ । गुल्मवायुप्रस्ता स्त्रियोंकी मूर्च्छावेपके समय घापही पेशाब हो जाये तो इग्नेमिया ६ । क्रिमिके कारण हो तो मिना ३५ और स्पार्जेलिया ६ । शक्क चरण पीडाके कारण हो तो फमिड-कम ६, ३० । हेरिजिरन ६, बनेडोना ६, कैथ्यारिस ६, नक्कभमिका ६, इत्यादि भी समय समय लाभदायक होते हैं । इस रोगमें चित्त कदापि न सोना चाहिये । सदा और नमकीन पदार्थ न खाना चाहिये ।

**शुक्राचरण (Spermatorrhœa).**

इसकी चार भावनाओं में प्राकृतिक नियमों को उल्लंघन कर अनैसर्गिक उपयोगों से बचने निकल जाने के कारण नहीं यह रोग उत्पन्न होता है। इसमें कारण सरमात्मिका उप-दाह, मूत्रनाली और मूत्राशयिका उपदाह, मस्तिष्क, पीठ और मज्जा की पीड़ा, चर्म पीड़ा और मदा छोड़े पर मवार होकर घूमने में भी इस रोग की उत्पत्ति हो सकती है। पर अधिक करके हस्तमैदुनमें ही यह रोग उत्पन्न होता है। मृक प्रवेश रोगों में धारणाशक्ति एकद्वारगी नहीं रहती। शिथिल होने या होने नहीं, मस्तिष्क के ममय और देने और छोड़े पर मवार होने पर छोड़े ही उत्तेजनाने रेतसाध हो जाता है। बहुत मृक निकल जाने से नीचे लिखे लक्षण दिखाई देने लगते हैं :—विमर्श विलोप और मलज्ज भाव, स्मृतिशक्ति का कमना, मग्न जानने में निरुत्साह, शारीरिक दुर्बलता, चर्म-मांस्य, कोठबह, पेट फूलना, कब्ज में धड़कन, निरर्ग्य दर्द, एकात्मक रहने में बांझों में अन्तरा का जाना, चेहरा रह-होने बांझों में रहने एह जाना और बांझों में होने में मलज्ज मलज्ज यह रोगों में होने होने अन्तरा एह जाना और

100

सद्यता, मदा अन्य मनस्क, दुर्बलता, जननेन्द्रियकी शक्ति कम पर काम प्रवृत्ति अधिक हो ।

एमिड फसफोरिक ६, १० । बहुत स्त्री महवाप्त या हस्त-मैद्युनके कारण जननेन्द्रियकी दुर्बलता, स्वप्नदोष, मज्जमके समय जल्दी जल्दी शक्त धरण, विसर्गकी विपणता, स्मृति-शक्ति ( याददाश ) की कमी ।

वारना ६, १० ।—प्रायः जननेन्द्रियकी अस्वाभाविक उत्तेजना, स्वप्नदोष, घेठमें दर्द, काममें भी भी शब्द, चेहरा लाल और माया घूमना, बारबार जमाई पाना और प्रतिशय दुर्बलता ।

फसफोरस ६, १० ।—मज्जमके समय बड़ो तेजीमें रक्त-स्राव और कमजोरी, रतिशक्तिकी कमी, मानसिक चिन्ताकी अधिकता, कलेजमें धड़कन, बहुत शक्तधरण और हस्तमैद्युनके कारण लिङ्गका एकदम न उठना ।

ग्राटिना ६ ।—यौवनावस्थाके आरम्भमें अपरिमित शक्तधरण और हस्तमैद्युनके कारण कामेच्छा व्यतीत लिङ्गोच्छान और शीघ्र शीघ्र शक्तधरण ।

नक्सममिका ६, १० ।—सामान्य कारणसे कामभाव, सुबहके समय निद्राभङ्गके बाद अस्वाभाविक लिङ्गोद्भेद, उत्तेजक द्रव्य खाने या पीनेसे स्वप्नदोष, अण्डकोषमें दर्द, कोष्ठवद, अरुचि ।

प्रतिशय मैद्युनेच्छा पर लिङ्ग उठतेही शीघ्र शीघ्र शक्त

खजलन, मधु ग्रन्थीमें दर्द, कमजोरी इत्यादि लक्षणोंमें कैल्के-  
रिया कार्ब ६। ट्राफि साफिया ६, जेलसिमियम ३०, सल्फर  
३०, वैराइटा कार्ब ६, कैन्थरिस ३५, इग्नेसिया ६, पार्जैन्टाम  
६, कोनायम ६, फेराम ६, कैलेडियम ३०, सेलेनियम ३०,  
इत्यादि समय पड़ने पर काममें लाने चाहिये ।

**नियम ।**—केवल औषध सेवनसे यह रोग नहीं  
छूटता बल्कि औषधके साथ ही साथ रोगीकी नीचे लिखे  
नियमानुसार अवश्य चलना चाहिये :—सत्संसर्ग, साफ हवा  
सेवन, सुबह और शामको घूमना, अनुत्तेजक पदार्थको खाना  
या पीना, अच्छी अच्छी बातें करना तथा धार्मिक ग्रन्थोंका  
पढ़ना और नित्य अवगाहनमें स्नान करना उचित है । उत्ते-  
जक द्रव्य पान या भोजन, कुसंसर्ग, घियेटरमें जाना, नाटक  
या नावेल ( उपन्यास ) पढ़ना, हस्तमैथुन इत्यादि सदा और  
अवश्य त्याग देने चाहिये ।

## प्रमेह (Gonorrhœa).

पेशाबकी राहकी सैम्पिक भिक्षी प्रदाहयुक्त होनेसे  
उमरमें लो साव होता है उसे प्रमेह कहते हैं । प्रमेह बड़ी  
दुखदायी व्याधि है अपवित्र स्त्री या पुरुषके सहवास  
दोषसे यह रोग उत्पन्न होता है स्त्रियोंके मूत्रमाग

पुरुषोंके मूत्रमार्गकी अपेक्षा सुदृ होनेके कारण उतना यत्नसा-  
दायक नहीं होता । प्रमेह विष शरीरमें प्रवेश करते ही  
पहिन्ने २।५ दिन मूत्रनालीका मुँह सुड़सुड़ाता तथा खजु  
घाता है, गर्म या साम रंगका हो जाता है । जलन होने  
लगती है और थोड़ा थोड़ा सुफेद साव होने लगता है ।  
फिर बहुत बहुत दूधकी तरह या पीले रंगका या हरे रंगका  
तथा रक्तमय साव भी निकलने लगता है । पेशाव करनेके  
समय बड़ी दर्द होना ही हम रोगका एक प्रधान लक्षण है ।  
रात्रिमें बारबार भ्रूणाभाविक लिङ्गोद्देक (और हमी कारणसे  
बारबार नींद खुल जानेसे रोगी दर्दसे बेचैन हो जाता है )  
लिङ्गसुण्ड अर्थात् सुपारी मुँजी हुई, चण्डकीपमें जलन और  
मूत्राशयकी मुखमायी ग्रन्थिमें जलन होती है । ये उपरोक्त  
कही हुई अवस्था सातसे चौदह दिनतक दिखार्द देकर  
धीरे धीरे सब उपसर्ग कम होने लगते हैं । केवल पेशाव  
करनेके समय थोड़ी थोड़ी जलन और पीले रंगका रीम  
निकलने लगता है इसे पुराना प्रमेह कहते हैं । प्रमेह रोगमें  
नीचे लिखे उपसर्ग दिखार्द दे सकते हैं.—चण्डकीपमें  
जलन, मूत्रनालीका फोड़ा मुख जानेके कारण एकाणक  
पेशावका बन्द हो जाना, घात, भाखामें जलन, निगका मुँह  
( सुपारी ) मुँजा हुई और घाघा इत्यादि ।

**चिकित्सा ।**—एकोनाइट ३५। रोगकी पहिन्नी अव-  
स्थामें, पेशाव करनेके समय किचवत् या कटनेकी भाति दर्द

हो, मूत्रनालीकी पीशमें जलन और प्रदाहके साथ ल्वर भी वर्तमान रहे तो ।

कैन्थरिस ६ । बारबार पेशाबकी तेजी, दो धारमें पेशाब, पेशाबके बाद और पहिले जलन, खुन या रीस निकलना, बार बार लिट्रोड्रेक और अतिशय कामप्रवृत्ति, रात्रिमें बारबार लिट्रोड्रेक होनेके कारण, नींदका खुलजाना, बूंद बूंद पेशाब होना और तेज जलन ।

कैलाविम इण्डिका १५, ६ ।—मूत्रनालीके छारपर दर्द और रंग लाल, रीस अधिक परिमाणमें आना, लिट्रमुण्डमें खून, बारबार लिट्रोड्रेक हो तो ।

मर्क्युरियस मम ६ ।—मूत्रनालीके मुंहमें जलन और छड़ छड़ या कुट कुट करना, पीप ( रीस ) में मूत्रनालीके मुंहका छुट जानेके कारण एतर्मीधारमें पेशाब निकलना । पहिले उज्जने रंगका एतला साथ फिर मादा पीने रंगका ।

एन्सेटिना ६ ।—मूत्रनालीके मजोएनके कारण एतर्मी धारमें पेशाब निकलना और माद हो रह साथ भी होना तथा शिथीके समान होना ।

सेन्सिबिलिस ६ ।—लिट्रोड्रेकके बाद मूत्रनालीकी जलन और साथ साथ ( रीसकी तरहआवृत्तिमें ) मूत्रनालीके आधेएके बाद उज्जने रंगका साथ निकलने पर ( रीसकी पुनर्नि-  
वृत्तिमें ) ।

डायडर डायडर मम ६ ।—उज्जने रंगका साथ निकलनेके

बाद ( जलन होनेके पहिले ) मिथिया ३० नित्य सबेरे एक बार और रात्रिको एक बार प्रयोग करनेमे रोग शीघ्र चाराम होता है । पेशाब करनेके समय बहुत जलन रहनेमे हार्-ड्राष्टसि १ ड्राम ६ आउन्स पानीमे मिलाकर पिचकारी देनेमे जलन कम हो जाती है ।

**संक्षिप्त चिकित्सा ।**—रोगकी पहिली अवस्थामें ऐकोनाइट, जेल्मिमियम, कैन्थरिस, यूज्रा, बेलेडोना, और मक्खभमिका । पुराने अवस्थामें—केनाडिम इण्डिका, यूज्रा, फेरस, पल्मेटिसा, मक्खभमिका, पेड्रोसियम, चारना और मसफर । बारबार निडोच्छ्वास होनेसे—ऐकोनाइट, कैन्थरिस और जेल्मिमियम तथा थोडा गर्म जल या ठण्डे जलकी धार देनेकी चाहिये । प्रमेह रोगके साथ यदि चण्डकीप मदाह-युक्त हो तो ऐकोनाइट, जेल्मिमियम, पल्मेटिसा, मर्क्यूरियम, हैमामेलिस और फाइटोलका । प्रमेहरोगके बाद गठिया हो तो मर्क्यूरियम विन-फाइटोडेटाम, कलचिकम, कल्लो-मिण्ड, मार्कमज, मेजेरियम, पल्मेटिसा, ब्रायोनिया, रडो-इण्ड्रून और रमटफ़ । प्रमेहरोगके बाद बाधो हो तो मर्क्यूरियम आयोड नाइट्रिक एमिड और लैकेमिस । ६ से ३० शक्ति पर्यन्त यह सब औषध व्यवहृत होते हैं ।

**पद्या ।**—श्वरकी अवस्थामें लघु पथ्य, ठण्डा पानी या मोद भिजा हुआ जल उपकारी है । उष्ण शय्यापर भयन, बहुत देर तक घमना, मिर्चा या मीठा पदार्थ अनिष्टकारक है ।





रहता, कदाचित् पेटमें दर्द मान्द्रुम पड़ने साथहीमें ज्वर तक पड़ने पित्तकोषमें पित्तवाही नालीमें आन गिरती है, तब अकस्मात् धीरे धीरे पेटमें एक तरङ्गका अमल्ला दर्द होकर रोगीको अत्यन्त अधीरकर डालता है, इस कठिन दर्दका नाम पित्तगूल (Biliary Colic) है, यही गूल दाहिनी ओरमें आरम्भ होकर बायीं तरफ प्रायः दक्षिण कंधा और मध्य पेटमें फैल जाती है, और चौड़ाके साथ वमन, ठंडा, पसीना, दुर्बल नाड़ी, आँझ (Collapse) पाल, आस आने आनेमें कष्ट, मुँहमें रखादि लक्षण दीप्त पड़ते हैं। चौड़ा कई घण्टामें कई सप्ताह तक रहकर अकस्मात् मिट जाती है। अर्थात् पड़ने पल्ल (Intermittent) में आकर पड़नेमें मस्तुर्ण अथवा मिट जाती है। इसी तरह मल भीत आनेमें पड़ने पानिमें समावना आदि है कि पड़ने निश्चय मरी है।

**चिकित्सा ।** - (१) त्रिपय गूल चौड़ा गीम निश्चय हो और २ सप्ताह मात्र पड़ने गीममें निश्चय आनेमें त्रिपय आदिवा और पित्तकोषमें पड़ने ज्वरक न हो, वही दो वही पर आन देकर चौड़ा चौड़ा अन्तर्गत आनना आनना आदि है।

(२) गूल-रुद्ध मल्ल का अन्तर्गत आन ३० दिन पड़ने विद्वयमें मल्ल १८० अन्तर्गत आन हो।

इंग्लैण्डके जगत प्रसिद्ध डाक्टर हिउजी पित्तपथरीका कष्ट प्रथमनार्थ यथास्केरिया कार्य,—व्यवस्था करनेमें कभी भी व्यर्थ मनोरथ नहीं हुवे । ) पित्तमें उत्पन्न गूल पीड़ा निवारणार्थ यह परम औषधि है पन्द्रह मिनिट अन्तर पर दो तीन घण्टा भोजनके पश्चात् हममें पीड़ा शमन न होनेमें हार्डेरिस प्रति दोस मिनिटके पश्चात् देना चाहिये ।

कोलेस्टेरिनम : आमेरिकाके डाक्टर स्योयान हमी औषधिका ३m शक्ति प्रयोग कर पित्तपथरीमें उत्पन्न वेदनामें आश्चर्यजनक लाभ पाकर मोहित हुए हैं । ( Vide Allens (Nosodes edition, 1910 ), ३m क्रमका सुविता न होने पर भिन्न द्रविका व्यवहार किया जा सकता है, इंग्लैण्डके डाक्टर वार्नेट १५—२ दूर्ल मेवन करानेमें पित्तपथरी रोगकी विविध अवस्थामें अनेक उपकार पाये हैं । विषोन्नाग्दस और हार्डहादिस प्रत्येक मातामें एक दूटमें १० दूट पर्यन्त । हाइपोम्योसिया और डेनिडोनियम २ X कार्दियम मरिटिमम २ X डेनिडोनियम १ X डेलेडोना १ X और आर्मेनिक १ इन्टर्मिट औषध पीड़ा निवारणार्थ व्यवहृत होता है ।

आनुपट्टिक चिकित्सा ।—पीडाने योगी निदान दुर्लभ ही पड़नेमें उसकी कुछ गरम पानी दिनाला और कुछ गरम शक्का मेव देना या मरुताम्रकी उबलुत पन्दाटि

द्वारा बूंद २ करके गरम जलकी धार देकर बराबर भिजाना (Rectal irrigation) और दाहिने तरफके कोखमें गरम पुष्टिम लगाना इत्यादि उपायोंमें पीड़ाकी बहुत शान्ति हो सकती है। इसी प्रकार शोथधादि प्रयोग करनेमें पीड़ा निर्दोषभावमें उपशम होनेमें और पथरी निकल जाने पर जिसमें फिर पित्तकोषमें पथरी उत्पन्न न हो उसका उपाय करना चाहिये। नीचे लिखी हुई व्यवस्थानुसार चलने पर, फिरमें नहीं होने पाती।

(२) पुनराक्रमण निवारणके लिये चायना चर्ति उत्तम औषधि है। पित्त पथरीकी चिकित्साके बारेमें निम्नलिखित डाक्टर पेयार ने नीचे लिखी व्यवस्था द्वारा बीस वर्षमें अधिक समय जितने रोगीको चिकित्सा किया सभी चाराम हुए। चायना ६५ प्रतिमात्रा छ गोली प्रत्यह दो बार करके देना होगा जितने दिन तक दम मात्रा औषधि सेवन न हो, पश्चात् एक दिन चत्तर एक मात्रा ( छ गोली ) करके देना होगा जिस दिन दम मात्रा पूरा होजाय उसके पश्चात् दो दिन चत्तर एक मात्रा छ गोली करके देना होगा। अथवाक दम मात्रा पूर्ण न हो जाये इसी तरहमें ४ दिनोंके चत्तर ४ दिनोंके चत्तर पांच दिनोंके चत्तर इत्यादि करके देना होगा, फिर मज्जेनिमें औषधिका ( चर्यान् छ गोली ) एक मात्रा सेवन कराना चाहिये। चलेक प्रसिद्ध चिकित्सकोंने देखा है कि उपरोक्त रोगि अनुसार चलनेमें प्रथमतः

रोगीकी पदरी शीघ्र निःशेष निकल जाती है और पदान् पित्तकोषमें पदरी उत्पन्न नहीं होने पाती क्योंकि रोग पूरी मात्रमें आगम होजाता है। हाज़र ऐंग्मार्ग सेलिडोनियस और हाज़र बोनीफिक चार्ड्यास मेरिया नाम प्रयोगमें करनेके रोगीकी पुनराक्रमणके कार्यमें सुहाय है।

**पद्याष्टि ।**—यद्यप्यस्यमें मममूत्र त्याग और आना-हार परिमित आहार यदीपयुक्त शारीरिक परिश्रम और वायु सदन, एवं प्यारा जल (Alkaline Waters) बहुत पीने इत्यादि व्याख्यादि और यद्यपिदि होमियोपैथिक औषधादि सदन करनेमें रोगी दायर्जीवन पूरी तरहमें रोगीं हट जाते हैं। और यह तरहके रोगीं जितना (रोगी Syphilis रोगीं) त्याग कर सके उम्माकी मज्जुल और आस, मूत्र, मद्यर्जी और (Lime) दूध, चर्बी रोगींके मिट्टि चर्चितकर है, यद्यपिंके औषधादमें इतिपेक्ष्य चिकित्सा देली। अधिक् बल बने ही रोगी बहुत दिनों तक मज्जुल होजाया वह जर्मन चर्चका पिण्डोपार्थिकमें होत

होत १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

वस्त्राभे इस बीमारीके शरीर पोषणके अनुपयोगी पदार्थ समूह पेशाबके माध्य निकलता है किन्तु परिपाक वा परिपोषणके कामके ब्याघात होनेसे इसका चन्दा होता है । तब भाप ग्रीमीमें पेशाब थोड़ी देर रखनेसे यदि डेटका घूर्ण वा रेतकी तरह तलेमें जमे तो मूत्र पथरी हुई है समझना चाहिये । तब बहुत बारीक रेतिके ( Sand ) समान वा छोटे २ कंकर ( Gravel ) अथवा समके बीजके समान कंकरके टुकड़ेके ( Stone ) समान छोटे बड़े सभारो माना तरहके पथरी मूत्रपित्त ( Kidneys ) वा मूत्राशय ( Bladder ) में देख पड़ते हैं । स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंमें और बूढ़ेगमि उत्तर पश्चिमकी तरफके बीमारीमें यह रोग अधिकतर देख पड़ता है ।

(१) मूत्रपित्तमें पथरी ( Stone in Kidney or renal Calculus ) और मूत्रगुल और ( Lower of the Kidneys ) मूत्र पित्तकोषमें पथरी उत्पन्न होकर अधिक दिन तक चटकी रहती है । इस तरहकी अवस्थामें प्रायः ही किसी तरहकी पीड़ा नहीं होती, तात्कालिकता (dull pain) वा मूत्रके माध्य थोड़ा बहुत पीव रक्त देख पड़नेसे मूत्र पित्तमें मूत्रनली ( ureter ) के बीचमें पथरी चान पड़नेसे कमरमें अण्डकोष तक एक तरहकी दुःसह पीड़ा होकर रोगी के चलन अधीर कर देता है इसी पीड़ाको मूत्रगुल (renal



रखनेमें पयरीका घबना, चनुमय होता है और उसके मांस पेशाब होना, इत्यादि यही रोगके लक्षण हैं ।

(क) मूत्रगूल पीड़ा वा पयरी निकलनेका समय ।

**चिकित्सा ।**—कमर बन्ती स्थानपर गर्म जनका मैत्र ( hot fomentation ) और गरम जल में धोना, और कार्बोनिम हर एक सातामें पाँच बूँद १५ मिनिट चलानेवर्गमें पीड़ा कम होती है ; यदि पाठ दस साता औषधि सेवनमें कुछ उपकार न जान पड़े—तो उक्त औषधिकी घटगति काममें आना चाहिये क्याकरिया कार्बोनिमा ३० प्रति पर्युट मिनिट चलाने सेवन करनेमें पादर्थ कम मिलता है ।

( Vide Dr. Smith Mills essay in the Paris Congress Transaction, 1900 )

अतएव उक्त क्रमके क्याकरिया कार्य दिनगूल और मूत्रगूल उभयविधि गूल पीडाको परम औषधि है ।

दूसरे पीडामें रोगी मरुके तरह पसता है और दोनी पाद इच्छा करने दवाने और जलार मरने चित्कार और गी गी करनेमें, अथवा पेशाब मान रंग और छोटी देर धर रखनेपर इटके चुनवत् तनेमें जमनेमें ओषिमान्केनाम ३० प्रति १५ मिनिट चलाने पर देवे । पेशाबके पयात् ही पीडाकी हृदि होनेमें, साप्ता ३० बूँद हर १५ मिनिटके चलाने,

घरवाणी भी कुमनकी पीड़ासे मगीर पंठते रहनेपर और रोगी  
 पीड़ासे अणमात्र भी स्थिर न रहकर बराबर छटपट करनेके  
 लक्षण दीक्षा पड़े, तो हाइपोथैर्मिया हर १५ मिनिटके  
 अन्तर पर, यदि यह सब औषधियों कोहें उपकार न हो  
 तो हर सातामें १० बूंद प्यारिसा देना, दो घण्टा  
 उक्त जलमें हर आधे घण्टेके अन्तरमें देना चाहिये  
 इसमें भी पीडा कम न हो तो सुपिक्नुइकके अभावमें  
 रोगीकी अवस्था ब्रम्हा भयावह होती है। ऐसा होनेमें  
 मोरोषामें सुझाकर दो सर्जिया (हर घण्टेमें चौदाहें  
 दोन देवे) सेवनकी शक्ति, है (२३) मूतपिण्डकी पदवी  
 विविक्तता। मूतके पिण्डमें पदवी दुहें हैं मन्देह होनेमें वा  
 मूतपीड़ासे उदरमें होनेमें पदवाही की शक्ति निर्या दुहें दवापे  
 मन्देहतामें उक्त द पल मिलता है।

भाईको । १४-२००० यदि विवाहमें आज्ञा नहीं की जाये  
 कभी, एक और किसीके चारित्रिक इतिहास का मातापिता १ सुंद  
 वा कथन का मातापिता का मातापिता १ सुंद देना चारित्रिक चरित्र  
 यम १० यदि विवाहमें कोई आज्ञा का चरित्रका १०  
 दास दास १० दास दास १० दास दास १० दास दास १०  
 दास दास १० दास दास १० दास दास १० दास दास १०

'ה'תשנ"ב י"ג כסלו

המנהל הכללי של משרד החינוך והנוער  
המחוזי של משרד החינוך והנוער



नाभीमें पीड़ा और पेशाबके नीचे पड़ने सेकेट और पथान मान मोडके मध्य होजावे। निपिया (१-१०) पेशाबके नीचे मोदके समान विपधिया जेतवर्न वा ईपन मान। यार्माप्यारला (१-१०) पेशाब करनेपर वह मोदके पानीके समान मिला हो जावे।

मारट्रोमिडर एमिड २५ वा यमजनिजएमिड (१-१२) पेशाबके नीचे क्यामनियम यकजालेट लमनेसे (Oxalate of lime deposit).

उपरीक्त औषधियां मानी रोज चस्ततः चार बार करने सेवन कराना चाहिये। वेनेडोना (१५-१०) यफीम (१-१०) मकल (१५-१०) मिमिका (१-१०) कभी २ उपकार करता है।

(ग) मूत्राशयकी पथरी चिकित्सा। लिथियाम कार्ब-निकाम (१५ पूर्ण १०) रोज चारवार सेवनसे छोटी पथरी गल जाती है। क और छ के बीचकी औषधिया मसलानुसार व्यवहार करनेसे बहुत समय उपकार मिलता है, किन्तु मेथो राइट (Lithonite) इत्यादि यन्त्रकी सहायतासे आश्चर्ययुक्त यक्षचिकित्सा द्वारा बड़ी पथरी शरीरमें निकालाही परम चतुरता है। X-Rayके सहायतासे शरीरकी पथरी देखपडती है।

(घ) प्रतिपेधक (रोकनेकी) चिकित्सा जिससे मूत्र-

पिण्डों पदों का उत्पत्ति ही का उत्पत्ति दुर्ग पदों का उत्पत्ति  
मोक्ष लिये उपायों वह मार्गों का उत्पत्ति है :-

पेमाहरे माघ पठारवा वन (१५०००) निवलने पर  
 जोर दीहमें जोर कममें दीह। जोर पर दाहरेमा सारदार  
 मेदलवा रेलि है। विन्नु जिसकी गहिदा दाल है (१५०००)  
 हा जिसे अधिदलामे इलरिग एमिह दिनाया गला है उसके  
 लिह दारिंका इलरिग गाला ५ इंद हार पाट धरनेके समर  
 पर ऐना जोर माघ है पानी दीना दलि किलकर है।

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥  
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥  
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
 ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

## १४ । चर्मरोग ।

धामवाल ( *Urticaria* ).

धामवाल रोग एकाएक दिखाई देनेमें कई घण्टे या कई दिन रहनेपर फिर चापही चाप मिट जाता है । रोग पुनरा होनेसे, फिर रोगी कष्ट पाता है । शरीरके नाग्न स्थान फूल उठते हैं खुसुहट होती है और धामवाल स्थान गर्म हो जाता है । विंडिमल्लो, केकड़ा या भारी दूध भोजन, मर्दी लगने के बाद यह रोग उत्पन्न होता है ।

चिकित्सा )—हाइ, ज्वर, धाम और लाल रंगके दानोमें खुजली हो तो एकोनाइट १५ । पीड़का प्राक्त भाग लाल रंगका और पीछका भाग सफेद, जलन या सूई गड़ानेकी भांति दर्द या बहुत ही कुट् कुट् अथवा सुड़ सुड़ करना चार्टिका इयूरिन १५ या एपिस १५ । चार्टिका इयूरिन और एपिस प्रभेद—दाने एकाएक बैठ जायें तथा वमन, अतिसार और बकमा आदि लक्षणोंमें चार्टिका । दाने बहुत फूल उठे और सूई गड़ानेके तरह तेज दर्द हो तो एपिस मेल । बदरामय हो तो, एण्टिमक्रूड, नक्सभमिका, पलमेटिका । मर्दी लगकर होतो डालकेमारा । रोगकी पुरानी अवस्थामें एपिस, आर्सेनिक, सल्फर, कुर्दनि-आर्स यही मध दवाये देनेसे काम चलेगा । पेटमें गड़बड़ हो ऐसा पदार्थ न खाना चाहिये ।

## पांचड़ा (Scabies.)

घोर

खुजली (Itching of the Skin).

जीवानुमे एक प्रकारका फोड़ा होता है। मस्तिष्क  
घोर उंगली इत्यादि स्थानोंमें, मूत्रम घोर कौमल चमड़ेके  
नीचे ये सब काँड़े घाम करते हैं, इन्हीं कारणसे उंगलीमें  
यह रोग होता है।

चिकित्सा ।—नित्य दो बार कार्बोनिक् या नीमके  
पत्ते पानीमें घोंटाकर चर्खा तरह धो कर, गन्धकका  
मलहम लगा देनेमें जलटर्ही मूख जाते हैं, कैलकेरिका,  
कार्बनिका, चार्मेनिका, हेपर सलफर, नक्सभमिका या  
मर्क्यूरियम कर, मोरिल्लाम, नाइकोपोडियम, क्रोटन  
टिग्लियम, कठियम, टैफिमिया इत्यादि औषध (३० ग्राहि)  
खुजलीमें लाभदायक होते हैं।

## घत (घाव) (Ulcer).

घाट मरनेमें, दिन जलने, गिरनेमें इत्यादि कई कार-  
णोंमें फोड़ा हो जाता है।

चिकित्सा ।—घावमें रह रहना, घावमें जननेकी  
भांति जनन, घावके चारों ओरका स्थान कड़ा घोर उत्तम

तथा थोड़ा थोड़ा रक्त मिला हुआ पीप या कुछ काले रंगका पीप निकलना इत्यादि लक्षणोंमें चार्मेनिक ६, २० । गण्ड-मालाके कारण उत्पन्न भये हुए घावमें मलफर ३० और कैल्के-रिया ३० । जखनवाला घाव, लाल रंगका हो तो बेलेडोना ३० । सामान्य घावमें धीरे धीरे पीप उत्पन्न हो तो भाइलि सिया ३० । पीप निकासकर घाव बंटा देना हो तो डिपर सलफर ३० । और पीप बढ़ाना चर्चात् घावको पकाना हो तो डिपर मलफर विचूर्ण ३ । पारद दीप रहनेसे यह और भी उपयोगी होता है । उपर्युक्तके कारण उत्पन्न भये हुए फोड़ेमें सर्फ्युरियस ६ । पुराने घावमें किसी दूसरी दवासे फल न दिखाई देने पर मलफर ३० । घाव सड़ना शरभ हो गया हो तो कैलेण्डुला १ चाउस, चाधा सिर कथमें मिलाकर उसी जलमें एक साफ कपड़ा भिजाकर घावके ऊपर पट्टी देनेसे सड़ना बन्द हो जाता है ।

### पुराना घाव (शोथ)

चिकित्सा ।—घावसे महजजोमें चापहीमें चाप रक्त निकले, चागमें जखनेकी भांति जलन, तेज दर्द और घावके चारो ओरका मांस कड़ा हो तो चार्मेनिक ३० । दुर्गन्ध, गाढ़ा पीप, घावमें खुजली या मूँद गड़ानेकी भांति दर्द, मांस हडि होनेवाले घावमें थाफाइटिस ६ । शरीरके नाना स्थानोंमें

महा बुद्धा धाव श्रीर उमर्क दगलमे लोरी लोरी बुद्धिदा  
 श्रीर धावमे दुर्गमिन् पीप निबलना इत्यादि मन्त्रमे भिन्न  
 भिन्न ६ । बुद्धिमे, अथेनदम् वर श्रीर धावमेवा भक्ति  
 दर्प, धावमे वर धाव वरमेवा भक्तिमे वरमेवा श्रीर वर  
 वरमे दुर्गमे अन्तमे मन्त्रमे एभिन् मन्त्रमेव ६ । एवमे  
 श्रीर धाव भिन्न धाव श्रीर मन्त्रमे बुद्धा वरमेव वरमे  
 मे श्रीर वर वरमे ६ । एवमे अथेनदम् वरमे वरमे  
 वरमे धावमे मन्त्रमेव ६, एभिन् मन्त्रमे ६ ।  
 एव वरमे वरमे वरमे भक्ति वरमे वरमे भक्ति, वर  
 मन्त्रमे वरमे वरमे वरमे श्रीर धाव धावमे वर निबलना  
 इत्यादि मन्त्रमे मन्त्रमे ६ । १० बुद्धिमे ६  
 १ धावमे वरमे भक्तिमे वरमे वरमे वरमे भक्तिमे  
 वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे ६ ।

## श्रीर Boils.

१० बुद्धिमे १० वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे  
 वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे  
 वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे  
 वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे

१० बुद्धिमे १० वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे  
 वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे वरमे

फोड़ा में पीप उत्पन्न होनेके समय मर्क्यूरियम मल ६। फोड़ा सड़नेका उपक्रम हो आक्रान्त स्थानमें जनन हो और माथ ही कमजोरी मानूम हो तो चार्मेनिक ६, ३०. फोड़ा बैठानेकी इच्छा हो तो डिपर मन्कर ३० पर यदि पकाना हो तो उमीका विधूर्ण ३। पारद दीप हो तो यह बहुतही लाभदायक है। पीप बहुत परिमाणमें निकले या फोड़ा पुराना हो तो साइलिसिया ३०। छोटा छोटा फोड़ा हो तो चार्मिका ६। बारबार फोड़ा हो तो सल्फर ३०। फोड़ा गलकर उसमेंसे दुर्गन्धित स्राव निकले तो एक सौ भाग गर्म जलके साथ एक भाग कैलेस्ट्रुसा ० मिलाकर फोड़ेकी जगह धो देनी चाहिये।

### चङ्गुलीका घाव (Whitlow).

गख सूख छोटा करको कटवाने, चोट लगने या जल जाने पथका कोई विषाक्त पदार्थ रक्तस्य होनेसे चङ्गुलीका अग्रभाग प्रदाहयुक्त होकर उसमें रीम उत्पन्न हो जाता है। रोग कठिन हो जाने पर शस्त्रुतक हो सकती है।

चिकित्सा ।—रोगकी पहिली अवस्थामें या जब दर्द इच्छीतक फैल जाय, उस अवस्थामें साइलिसिया ३०। त्वर रहनेपर साइलिसियाके साथ सेलेडोना ६ (द्वार्यक्रमसे) चङ्गुलीका अग्रभाग बहुत मूजकर कुछ काले रुक्का होजाय

घोर जलन तथा दर्द हो तो आर्मेनिक ६ ( रोगकी तेजीवानी अवस्थामें ) अमरु दर्द पैदा होनेपर मार्कमल ६, हिपर सल्फर ६, ट्रैमोनिम ६, एमन कार्ब ५०० नाइट्रिक एसिड ० या डायोस्करिया ० या फेमफोरम ० आक्रान्त स्थान पर लगा देनेसे दर्द कम हो आता है ।

### पृष्ठव्रण (Carbuncle).

यह एक प्रकारका बड़ा चिप्टा तथा गोलाकृति दूषित फोड़ा होता है । बहुशून्यके रोगीको पृष्ठव्रण होनेसे, जीनेकी आशा बहुत कम रहती है । गरदनमें या गरदनके नीचे अथवा कमरमें यह फोड़ा होता है । इसका आकार हमके घण्टेकी भांति होता है । कभी कभी एक बड़े कमला नीबूकी तरह हो जाता है । सामान्य मूजन या फोड़ेकी भांति ठीक मध्यस्थानमें एक मुह न होकर कई छोटे छोटे मुह होजाते हैं, और इन सब मुहोंमें पतले पिनकी तरह स्टेड निकलता है । पहिले घाड़ी जगह पर अधिकार जमाकर फिर धीरे धीरे घट जाता है । यह मूजन पहिले लाल, फिर कुछ काले रंगपर हो जाता है । मध्यस्थान : : मध्यस्थान बाद आक्रान्त स्थान पर उसके नीचेक महत्तम अंगुलक मड़ जाता है । फिर, 'एरम टट कमल, एरम टट कमल' नाटक न होना इत्यादि मरणा 'दृश्यादृश' है । हाँ इसमें उदरव्रण कमसे कम मरणा 'दृश्यादृश' यह रोगी को मर देता है ।



**चिकित्सा ।**—आक्रान्त स्थान स्फोट, मानरंगका घोर जलनके साथ मूँद बंधनेकी तरह दर्दके लक्षणमें एपिमैनेज ३। घन सड़ना चारम्भ हो तो चार्मेनिक ६, १०। आक्रान्त स्थान लाल रंगका घोर चमकीला खोवा बंधनेकी तरह दर्द, ऐठने तथा चिड़िक मारनेकी भाँति दर्द, निद्राविम होना पर नौदका पच्छी तरह न चाना, इत्यादि लक्षणोंमें धेलेडोना १८, (पीप उत्पन्न होनेके पहिले प्रदाहित अवस्थामें बार बार धेलेडोनाका प्रयोग उत्तम होता है)। ज्वालाकर बेदनाके साथ रक्तस्राव ग्रीष्म ( दुर्गन्धित पीप मित्रा कुपा ), बल घटानेवाले त्रणमें चार्मेनिक ६, १०। तीव्र दर्द घोर जलनके साथ दुर्गन्धित पीप मित्रनना घोर निम्नस्थ विधानतन्तु गमना चारम्भ होनपर साइलिमिया २०, लैकैमिम ६। टैरेण्टुला कुमेन्सिम यन्त्रका निवारणके लिये एक बहुत ही उत्तम औषधि है।

गर्म जलमें फनालेन भिजाकर सेंक देनेमें भी लाभ होता है। मैदा या तीसीकी पुन्टिम देनेमें छटेमी जर जाती है।

**कई दूसरी दूसरी चर्मरोगकी दवायें ।**

**घमौरिकी दवा ।**—एकोनाइट और रमटक्म घोडे गर्म जलमें घोड़ा घोलकर बदनपर मननेमें लाभ होता है।

**बदनका फटना ।**—सर्दी या जाड़ेके दिनोमें फटनेमें चार्मेनिक ।

**मोक्षमें दाद ।**—लाइको पोडियम, मार्क-आयड  
ग्रेफाइटिस, ऐण्टिम क्रूड, सलफर ।

**सेंहुआकी दवा ।**—कैलिकार्ब एसिड नाइट्रिक,  
नैट्रम म्यूर, कैन्यारिस, ग्रेफाइटिस, सलफर ।

**मुखव्रण ।**—ऐण्टिमक्रूड, एण्टिमटार्ट, कार्बो ऐनि-  
मेलिस, आर्सेनिक, पल्स, कैलि-वाइक्रम, पेड्रोला, एसिड  
फस, सलफर ।

**दट्ट वा दाद ।**—हिपर सलफर, फसफोरस । एसिड  
नाइट्रिक, रमटक्स, सीपिया, ग्रेफाइटिस, सलफर । उपरोक्त  
दवायें ६ से ३० कम तक दी जा सकती हैं ।

## १३ स्त्रीरोग ।

स्त्रीरोग चिकित्सामें प्रवृत्त होनेके पहिले पाठकगणोंके  
स्त्रियोंके जननेन्द्रिय सम्बन्धमें निम्न लिखित उपयोगी बातें  
स्मरण रखनी चाहिये ।

१ । स्त्रियोंके पेटमें भूताधार और मलभाण्डके बीचकी  
जगहमें जरायू ( Uterus ) है । यहाँ एक खाली थैली है  
जिसका आकार अमरुत या नागपाति फलकी भांति है । इस  
जरायूके गड़हके बीचमें वध्वा नौ मासतक रहता है । य

यह पर्दा उठानेकी अपेक्षा रहता है । दूसरीही उस अचिन्त्य गूढ़ महाशक्तिकी कोटि कोटि प्रणाम करके हम लोग इस समय प्रकृत विषयका अनुसरण करते हैं अर्थात् स्त्रियोंके रोग और उनके निवारणकी आलोचना करनेमें प्रवृत्त होते हैं ।

स्त्रियोका सब रोग निम्न लिखित नौ भागोंमें बांटकर प्रत्येककी चिकित्सा यथा क्रमसे लिखी जाती है ।

- ( १ ) आर्तव व्याधि ।
- ( २ ) जरायुकी व्याधि ।
- ( ३ ) डिम्बकोषका रोग ।
- ( ४ ) योनिका रोग ।
- ( ५ ) कामोन्माद ।
- ( ६ ) बन्ध्यात्व ।
- ( ७ ) भ्रूदण्डकी पीड़ा ।
- ( ८ ) पित्त चक्षु अस्ति वेदना ।

## (१) आर्तव व्याधि ।

(Disorders of Menstruation.)

चतु सम्बन्धीय रोगोंमें नीचे लिखे प्रधान रोगाका विवरण वर्णन किया जायेगा ।

(क) पश्चिमे राज्यायमें विसृम्भ (ख) रजोरोध (ग) अनियमित चतु (घ) अनुकल्प रजः । ( ङ ) सप्त रजः ( च ) अति

रजः ( ह ) बाधक वेदना ( ज ) श्वेत प्रदर ( झ ) रजो निवृत्ति ( ञ ) हरित् रोग ।

( क ) पहिले रजःस्रावमें विलम्ब ।

( Delayed Menstruation ).

हम लोगोंने देखीं गियोंको माधायन्तः १८१३ वर्षकी पचस्यस्यमें पहिले रजःस्राव आरम्भ होकर ४०.५० वर्षकी पचस्यस्यतक प्रति माहिनेमें नियमितरूपमें रजःस्राव हुआ करता है । किन्ती किन्ती बालिकाकी यौवनावस्था हो जाने पर भी रजःस्रावमें देर होनी है ; या पहिले एकवार रजःस्राव होकर फिर बन्द होजाना है । साधारणिक दुर्बलता या बहुत दिनोंतक कोई रोग भोगनेमें, शारीरिक दुर्बलता या रक्तस्राव की पर्यताके कारण और योनिमुखकी आवरक भिन्नी न फटनेके कारण पहिले रजो दरारमें देर होनी है । लक्षण :— माया भारी और दह, नाकमें रक्त गिरना, कलेजा घड़कना, श्वास प्रश्वसनमें कष्टबीध कमल और अँधेने भारीयन तथा पैदुने दह ।

चिकित्सा ।—इन्फेण्डिया ३५, ३० । पेट और पीठमें दह, गिरने दह, परादि, मूत्रा जाड़ा नागून होना, पालस, निचली, कलेजेका घड़कना, रक्तहीनता । इन लक्षणोंके साथ यदि श्वेतप्रदर हो तो मर्क्युरा ६ ।

एकोनाइट ३१ ।—एकबार रजःस्राव होकर एकाएक मर्दी लग कर या भयके कारण बन्द हो जाना ।

ब्रयोनिया ६ या १२ ।—रजःस्रावके बंदने नाक या मुँहमें रक्त निकलना, मूखी खाँसी, वक्षस्थलमें भूईं वेधनेकी भांति दर्द, जोष्ठवह ।

सिमिसिकियुगा ६१ ।—डिस्क्रोपके छायाप्रतिकी सीप-ताके कारण रजोभोष । शिरमें दर्द, नींद न आना, बायें पङ्गमें ( विशेष करके बायें स्तनमें ) दर्द । शारीरिक दुर्बलता दूर करनेके निम्न कौनसेरिया-कार्य १० घोंर मनकर १० । रक्तकी घट्यताके कारणमें ही तो फिरम ६ और चायना ६ ।

### (ख) रजोरोध (Amenorrhoea).

रजःस्राव चारम्भ होकर फिर बन्द होजाय, चालस्य परायणता, महमदीय, ऋतुके समय अधिक परिमाणमें बरफ खाना, मर्दी लगना, पानोमें भिगना, घूमना, एकाएक शोक, दुःख या भय इत्यादि कारणोंसे रजोरोध हो जाता है ।

चिकित्सा ।—मस्तकमें रक्तमशरजनित माया घूमना, पाँखोंमें चर्धरा का जाना और पाँखके गड्ढेमें दर्द, गर्भाशय और डिम्बाशयमें तेज दर्द, प्रसाप आदि लक्षणोंमें वेलेडोना ३ । नाकसे रक्त गिरि, माया घुमि, वक्षस्थल और बगलमें भूईं वेधनेकी भांति दर्द हो, मूखी खाँसी और पाक-स्थलीमें दर्द हो तो ब्रयोनिया ६ । पेडुमें तेज दर्द ( परि-

श्रममें हृदि ) विमर्ष चित्त ; निर्जन प्रियता लक्षणमें । मीपिया ६ । मर्दी लगकर रजोरोधमें ऐकोनाइट ६ । मानसिकक्षेत्र जनित पीड़ामें इग्नेमिया ६ । ठण्डा या रक्तकी अस्पताके कारण रजोरोध हो तो कैल्क-कार्ब ६ । रक्तकी अस्पता और उदरामयके साथ रजोरोध हो तो फेरस ६ । कतु बन्द होकर यदि रोगिणी पेटकी दर्दमें हटपटायें तो जेलमिमियम ६ । गर्म जलमें या गर्म गोनूत्वमें फ्रैन्क भिजाकर कमरमें सेक देनेमें लाभ दिखाई देता है ।

### ग) अनियमित कतु ।

(Irregular Menstruation).

कतुका निर्दिष्ट समय है । गिदीकी प्रति मासके २८ वें दिनमें जरायुद्वार होकर कुछ कालिमा लिये लाल रंगका पतला साव निकलना है । ३ से ५ दिनोंतक यह साव रहता है, इस सावका परिमाण एकसे डेढ़ पायतक होता है । उल्लिखित नियमोंमें अतिक्रम होनेमें दवा करना कर्त्तव्य है । अनियमित रजसावका लक्षण—२।१ मास रजःसाव होकर एका-एक बन्द हो जाना, कभी कभी १।५ मास रज बन्द रहकर अचानक अधिक साव होना । किमीकी १०।१५ दिनों तक घोड़ा घोड़ा साव हुआही करता है ।

चिकित्सा ।—एन्नेटिना और वायना ६ ।—एथीयक्रनन प्रयोग करने पर अच्छा लाभ दिखाई देता है ।

“रजोरोध” “व्यस्यरज” और “अति-रजः” चिकित्साकी औषधायनी मत्तणानुसार इस रोगमें प्रयोग कौ जातो है ।

### (घ) अनुकल्प रजः ।

(Vicarious Menstruation).

रजो मोष ( या अन्य रजःस्राव ) के कारण नाक, पुमधुम ( प्रेक्षाके सहित रक्तस्राव ) पाकम्यनी ( रक्त वमन ) और गुच्छहारमें रक्त निकलता है ।

चिकित्सा ।- नाक, गुच्छहार या गरीरके दूसरे कोहं सस्ते होकर रक्तस्राव, रक्तवमन, कभिजेमें दर्द, खाँसी ( खेत प्रदर रहे या न रहे ) आदि लक्षणोंमें हैमोमिषिम ( और हायोमिया & ( पर्यायक्रममें ) । गाढ़ा लालवर्णका रक्तस्राव होनेमें इपिकाक & । खाँसे खाँसे रक्तस्राव, दुर्बलता, रुधिरमण्डलकी रक्तहीनता आदि लक्षणोंके साथ यक्ष्मा रोगके पूर्व लक्षण दिखाई देने पर मिनिमियो ३५ । नाक और कानमें रक्त निक्कले, स्तनमें दर्द हो पदन गर्म हो ती पन-भटिमा & ।

### (ङ) व्यस्य रजः ।

(Scanty Menstruation).

नासा प्रहारके रोग भोगकर रजकी चन्दताके कारण व्यस्य रक्तस्राव होनेमें, मूलरोगकी दवा करना चाहिये ।

जरायुके दोषसे थोड़ा रजःस्राव होनेमें नीचे लिखी दवायें दी जाती हैं।

**चिकित्सा।**—कान्ति, शारीरिक और मानसिक चपलाद, पीना त्वक्, ठंडी हवा चमच्च, वमन, गिरने दर्द और रक्तकी खन्पतामें सिमिया ३० (चीगाई और वायुप्रधाना स्त्रियोंके लिये यह और भी उपयोगी होता है) सामान्य परिमाणमें जलवत् साव, सब शरीर पीना, जाड़ा लगना, रजःस्रावके पूर्व और उर्मी समय कनरके दर्दमें पनमेटिना ६, आहार और वायु सेवनके अभावके कारण अथवा किसी प्रकारके अथ करनेवाले रोगके कारण थोड़ा रजःस्राव होनेमें फेरस ६। कोष्ठबद्ध और उर्मीके साथ बदनके अन्दरमें फोड़िया रहनेमें कैफाइटिस ६। आत्यधिक दुर्बलता और उदरामय रहनेमें, फमफोरस ६, डाटिना ६, कार्बोनिज ६, और सल्फर ६। समय समय प्रयोग किया जाता है।

### (घ) अतिरजः (Menorrhagia).

इस रोगमें जरायु होकर बहुत रजःस्राव होता है। यह निरन्तर समयके पूर्व या पश्चात् भी हो सकता है और थोड़े या अधिक दिनोंतक रह सकता है। जन्म प्रकारके कारणोंसे यह अधिक जाता है, उसमें जरायुकी दान्तिज क्रियाका परिवर्तन, जरायुकी जिवा दूषित होना, जरायु या जरायु कीजमें जिवा डिल्लीयने यह संभव इत्यादि कारणोंसे यह रोग हो



मकता है । अतिरिक्त संगम, अधिक पुष्टिकर पदार्थ भोजन । उत्कट मानसिक चिन्ता, या बार बार गर्भमंचार होना ही इस रोगका कारण कहा जाता है । शालस्यभाव, बदनमें दर्द, जंभाई उठना, बदन ऐठना, गिर भारी और दर्द । पीठ और कमरमें दर्द, पश्चात्ति पौरका तलवा ठण्डा और जाड़ा मानस होना इत्यादि लक्षण इस रोगमें देखेजाते हैं । बहुत परिमाणसे रक्तस्रावके कारण, चेहरा पीला, घांखे गटे में धंसी हुई, हाथ पैर ठंडे, कान बन्द, दृष्टि और नाड़ी चीज तथा मूच्छा इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं ।

**चिकित्सा ।**—शारीरिक दुर्बलता और गर्भाशयकी क्रियाके विकारके कारण अधिक दिनोंतक रहनेवाला प्रसुर रजःस्रावमें आर्सेनिक ६ । रजोनिवृत्तिके समय, गर्भावस्थामें और प्रसवके पक्षमें—पीठमें और पैरुमें कर्द रहने पर प्ले-मिटिना ६ । मूत्रयन्त्रमें प्रदाह, अथ दृष्टि, डिम्बाग्रयमें दर्द । शाल वर्णका अधिक रक्त निकलनेसे ब्याधिना ६ (खूनानी नियोके सिधे ब्याधिना विर्यय लाभदायक है) । सदा वेदना शून्य बहुत और घनता रजःस्राव, कभी काले रंगका कभी यका यका । कभी दुर्गन्धमय रक्तस्राव, मामान्य उठने बैठनेमें सावका बढ़ना, मग बढ़न ठण्डा वा भीतर उसाव, अरायुके मुहमें पीटी चसनेकी तरह सुड़सुड़ाहट, पीठमें दर्द और योनिकी और दावके साथ साल काला चिप चिपा चनकसरकी भांति काला सावमें क्रोकम मैटाइना ३ ( चारामके समय चायना ६

घोर पीड़ित अवस्थामें क्रीकम प्रयोग करनेसे विशेष फल पाया जाता है ) । गाढ़े अलकतरकी भांति अधिक साव । पट्टा और योनिमें दर्द मालूम होना मानो पेटकी नाड़ी इत्यादि खींचकर योनिद्वारमें निकल पड़ेगी, मंगम प्रवृत्तिका आधिक्य, जरायुमें प्रदाह और सर्वदा तन्द्राविश लक्षणमें पैटिना ६ (इमके साथ क्रीकम पर्यायक्रममें प्रयोग करनेसे लाभ दिखाई देता है, विशेष करके पुरानी दयामें यह औषध उपयोगी है ) ऋतुके पहिले प्रसव वेदनाकी तरह तेज दर्दके साथ कड़े दाने मिले साव, रह रहकर दर्द आदि लक्षणमें कैमोमिला १२ । वेदना-शून्य बहुत अधिक परिमाणमें पतला, कभी गाढ़ा काले रंगका रक्त साव, रजःसावके कारण कमजोरी, कानमें भों भों शब्द, जरायु मुखमें जलन, प्रति तृतीय दिनको दर्दकी हृदि लक्षणोंमें चायना ६ । नाभि प्रदेशमें दर्द और वह दर्द जरायुतक फैली हुई, अविरत बमनेच्छा, भाषा घूमना, साथमें दर्द, चेहरा सूखा और ठंडा, गाढ़ा लालवर्णका रक्तसाव होनेमें इपिकाक ६ । ( उल्लिखित लक्षणमें प्रसवान्तिक आकस्मिक रजःसावमें भी यह उपकारी होता है ) भूखनाली और गुद्दद्वारमें प्रदाह रह रहकर बहुतमा घोर लाल वर्णका रजःसाव ( विशेष करके गर्भम्भावके बाद ) हो तो इरिजिरन ३५ । चोट लगनेके कारण जरायुमें अधिक रजसाव होनेमें आर्निका ६ और हेमामेलिस ३ उपकारी है । नियमित समयके बहुत पहिले योनिद्वारमें खजली और ज्वालाके साथ ज्वर प्रदरपक्ता

रोगिणी मियोके प्रचुर रक्तधारायमें और यक्ष्माममें दर्द रक्तनपर कैलकेरिया कार्व ६ (विशेष करके मृदाही नियोके मिये) ।

द्वितीय ६ । विष विषा और आम रक्त धमनीमें निरुद्धे, कामंदगमें दर्द हो (विशेष करके रक्तधाराप्रचुर रोगिणीके मिये) ।

विषाम चयस्याकी चिकित्सा ।—वायल रक्त-धाराके कारण रोगिणी बहुतही दुर्बल हो जाय तो यक्ष्मेटिका, फेरस, वायला और आर्मेनिक । रक्तमवाकनकी विनयनना और ऊपर रक्तनपर एक्कोनाइट, वात हो तो मिमिमिकिडना; इदगामय, क्वरमड और आर्मी या यक्ष्माके लक्षण प्रकाय पानेपर कैलकेरिया कार्व, माननिक उपेजना, मैपुम प्रयुक्तिका अधिक्ता हो तो कामकोरस, मीन बीचमें बहुत परिमाणमें रक्त निरुद्धे और दुर्बलताके चतिगिह रोगिणीकी दुर्बल किमी प्रकायके मोगकी विनयनना चममर न करमें पर द्वितीय ६ । ये नमस्त पंचव कटो मजिके प्रयोग किथे करि पाईये ।

साधारण नियम ।—चतिगिह घारिषारिफ और कैलमिक परिचय विशेष । यदि कोई दुर्बल करमनाला रोग हो उदुमल होई होत्र मर्ही हो और रोगिणी मजल रहे तो ममें प्रमर्ह टयमें रोगिणीकी कामर तक इडाकर १०।१३ मिमिट रक्तन मियेक केरि और ममें अदुर्बल कटम होईमंदर काम





इत्यादि रुचिरयुक्त वायु और पित्त प्रधाना उभ प्रकृतिकी  
नियोजि निवे बाधक वेदनानि ।

क्यूलन ६।—पेट एठनेकी भांति पेटमें दर्द नालूम  
होना, वक्षस्थलमें भार और सांस लेनेमें कष्ट बहुत थोड़ी  
सावधानी काला रह निकलना या श्वेतप्रहर । गिरने बहुत  
दर्द और शिर घुमना, पेट जूलना, कर्मी कर्मी मूर्च्छा और  
बननेच्छा ।

हेलोमियम ३४।—जरायुमें प्रतिशय दर्द, काले सूतकी  
तरह साव ।

नकुममिका ६. ३३।—बिना समयकेही थोड़ा रक्तसाव,  
जाड़ा नालूम होना, चर्ममाला, रुबहकी निचली या कै ।

मिजेर्ली-जर ६।—नियमित समयके बहुत पहिले दाना  
दाना, मैला और दुर्गन्धकाव, पेटमें तेज दर्द नाली पेटके सब  
पटाये योनिद्वार होकर बाहर निकल पड़ने, सब चङ्गिनि  
(विशेष करके हाथ पैरमें) ठंडा पनीना पीने लाई, मूत्राशयमें  
और मलाशयमें कतरनेकी तरह दर्द, कर्मी कर्मी रक्तसावके  
अभावके कारण तेज दर्द और दुर्गन्धानि

मैर्मेरिड ३३६ । रक्त कर्मी साव रुबहकी  
और कतरने कातेजनक वेदन

एलिन ६ ।—द्विजर्जयने रुब रुबनेकी भांति दर्दने  
संश्लेषे कष्टकष्टय समक वेदनकी भांति दर्द

भाइवगान एथ्यनन ३ रुबकावने दर्द उदारक

पारश्च चोक्तर ८।१० घण्टे तक रहे, जरायुमें तेज दर्द, पीछे समस्त पेटमें दर्दका फैल जाना । आचेपयुक्त बाधक ।

निम्नलिखित औषध ( छोटी मात्रामें ) समय समय पर पावश्यक होने हैं :—कोकम, मष्काम, कालिंगोनिया, मिनिमियो, लिनियम, मिपिया, प्याविना, जैत्यमत्रिनाम, कनो-काइलम, ड्रेटिना, बोराक्य, मयोनिया, और क्युप्रम ।

नियम ।—अल्प रक्त सावर्क कारण उदरमें तेज दर्द रहनेमें मर्म प्रत्यक्षा या मर्म गोमूत्रका भेज देनेमें लाभ हो सकता है । विजनों (Electrics) प्रयोगमें भी दर्द निवारण हो सकती है ।

यदि होमियोपैथिक औषधका सुविधा न हो और गैरिनी दर्दमें चर्भारा हो रही है तो उनटे कस्बनको जड़ वजनमें लार पाले, जो दाना गोलमिर्च और पालक इटिंगे साध पौंस का ( जलुकाभर्क तीन दिन ) पाल कालके समय निग्रम कराना, इसी तरहमें दो दिन जलुमें पालेमें बाधक निरीप हो जा सकता है ।

### (३) लेुकोर्रहा (Leucorrhoea).

अण्डुर्हो बाधक निरोगी, अण्डुर्हो भीतरी और अण्डुर्हो मुखमें धर्नि धर्निसे रक्तता ( कृमि, नीला, पोया, दुधकी तरह, मजबूती हुए जल या पाले चक्कनगर्ही





गर्मी रोगके बाद श्वेतप्रदर होनेसे यह औषध उपकारी है )  
पहिले धुएँना और गाढ़ा मास्य होकर ५।६ दिनके बाद  
उसमें घतमा पानीके भाँति या मांसके घावनके पानीके  
तरह दुर्गन्ध निकलने पर ।

क्रियोजोट ६ ।—चतुर्के ४।५ दिन बाद पीमे रंगके कर्ष  
धानकी गन्धके भाँति मास्य, जरायुके बाहर सृजन, सूर मझानेकी  
भाँति जलन और खुजली, जहामें मास्य लगकर फोड़ा और  
पीठमें दर्द ।

बीभिटा १२ ।—सफेद चण्डेकी तरहके रंगका पुराना  
श्वेतप्रदर और उसके मास्यकी मिर बड़ा मामूम होना ।

मिपिया ।—प्रमथ वेदनाकी तरह दर्द, कोष्ठवद् कुष्ठ मज्ज  
रंगका दुर्गन्धित मास्य या दुर्गन्धमय पानीकी तरह साव  
निकलनेसे ( चीनाहूँ और वायु प्रधाना मिषीके लिये यह  
विशेष उपकारी है । )

ममफर १० ।—पुराने श्वेतप्रदरसे बहुत दिन भोगने पर  
ही एक मात्रा ममफर भी उपकारा होता है ।

उज्जना या हल्दीके रंगका साव होनेसे मार्क-मज्ज,  
मिपिया, कौमकुरिया कार्य, धायना और ग्याइम्-मिउर ।  
पानीकी तरह घतने मास्यमें प्यात्रिना, फेरस और एलम् तीव्र  
ज्वामाकर मास्यमें—एमिड नाइट्रिक, एनमेटिमा, क्रियोजोट,  
चार्मेनिक, दुग्धजल मास्यमें मार्चनिमिया, कथामकुरिया कार्य



कलेजेमें धड़कन, दिष्टीरिया) वमनेच्छा, कोष्ठबध, पेटमें वायु जमा होना, बहुत पसीना और पेशाब इत्यादि लक्षण दिखाई दे तो चौपध अवश्य करना चाहिये । रजोनिवृत्तिमें कुछ पड़ले किमी किमी स्त्रीका शरीर अच्छा और मजबूत मान्य होने लगता है ।

**चिकित्सा ।—**मेकेमिस ६—( इस रोगकी प्रधान चौपध है ) रूढ़ रूढ़ कर गर्मी मान्य होना, गिरमें जलन मोदके बाद रोगका घटना ।

मेडुनेरिया १५ या ऐमिन नाइट्रिट ३ ।—( सायनिक लक्षणमें ) यदि मेकेमिसमें कोई लाभ न हो ।

बहुत पसीना या मात्र निजलनेमें ल्याबोरेण्टी २५, गिरकी दर्दकी प्रवणतामें खनोइन १, गिरमें, चादीमें बीसी जलन मान्य हो तो चाइना ६ या फेरस ६ पाकम्यमी खानी मान्य होनेमें हाइड्रोमियानिक पमिड ६ ।—रोगिणी बूट घुट होनेमें तो डाक्टर नेडान, एक्कोनाइट १ देनेको कहते हैं ।

**नियम ।—**कुछ गर्म जलमें स्नान, और जल्द पचने वाली वस्तु भोजन, समय पर नीना, शारीरिक परियम पोड़ा करना ।

## (अ) हरित् पोड़ा (Chlorosis).

इस रोगमें रक्तमें मान्य दानीका भाग कम हो जाता है.

इसी निम्न चमड़ा संपेद मिर्चों। तरफ कुछ उजला धोला। या  
हमके धोले रंगवा होजाता है। निम्नमिल कमठमें पाए जा  
मही होता, महीरकी मही कम होजाती है, कटा जाता मासूम  
होता है मिरमें दते, बाकीकी पलकमें गुजल, बाकीकी बाकी  
धोले रंगवाके भाति दाग, कमठमें धलवल, माही धोले  
धोले रंगवा। लिफ्तक मही रहता, अर्धे, बाकीकी बिह  
बिहा बरभाव, अर्धे इत्यादि मल्ल दिवारें दते है। रंग  
भाव, रंगमादुल, कमठा महीर, निम्नमिल बाकीकी रंग  
रंगवा म करला, ददिमा इत्यादि बाकीकी रंग रंग उल्ल  
होता है।

[illegible][illegible]

1. 1990年12月，中共中央、国务院作出《关于实行“以公有制为主体、多种所有制经济共同发展”的方针》，明确非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分。

नेडम मिउर १० ।—अंधाके जोड़में मर्दा मानूम होना, पेडुमें भार मानूम होना, सूजन, कोष्ठबद्ध, कृतुचन्द या वीर्य वीर्यमें कपड़ेमें दाग लगना, उल्लगछा इत्यादि लक्षणोंमें ।

कैलसेरिया ३०, मिपिया १२, ड्रैटिना ६, फल्फरिक एमिडे ६, मजफर ३०, आम्ब्राम ६, समय समय पर चावश्यक होमेमें भवन करना चाहिये ।

नियम ।—मर्दे जन्ममें (विशेष करके समुद्रकी जन्ममें) खान । साफ दूध भवन, दूध पीना, पालटकौ ( Bran ) पीटी खाना, धूपमें इधर उधर घूमना । रोगिनीकी पालनमें समय न काटना चाहिये ।

## १० जरायुके रोग समूह ।

### Diseases of the Uterus.

जरायुके रोगमें नीचे लिखे प्रधान रोगोंके विषयमें क्रमसे लिखे गये हैं । (१) जरायुकी उधना, (२) जरायुकी मूर्च्छा (३) जरायु मदाह (४) जरायुके बीचमें वायु या जल जमा होना (५) जरायुमें पथर (६) जरायुकी स्थानान्तरित या गलत उधना ।

## (क) जरायुकी उग्रता (Hysteralgia).

जरायुमें दर्द मालूम होना, ममस्त वस्त्रिमें कन्कन् दर्द, यह दर्द स्थायिक। ऋतुके समयमें और अधिक चलनेमें बढ़ि पाता है। भूख न लगना, अस्थिरता (वेचैनी) वमनेच्छा, अनिद्रा पाकाशयमें गड़बड़ इत्यादि इस रोगके प्रधान लक्षण हैं।

चिकित्सा ।—मिमिमिफियुगा ३X, ३० ।—इस रोगका प्रधान औषध है।

आर्निका ६ ।—ऋतुकी अवस्थामें बहुत परियम या प्रसवके बाद संचालनमें यह रोग होने पर।

इस रोगमें आमाशयके गड़बड़ या पाकस्थलीमें दर्द रहने पर कैमोमिला ६, नक्सभमिका ३० या पलुमेटिला ६ इत्यादि देना चाहिये।

।ख जरायुज मृच्छा या हिष्टरिया ।

## (Hysteria).

यह मनुष्य के अंगों पर जरायुज का प्रभाव डालने का रोग है।

चिकित्सा ।—यह रोग हिष्टरिया रोग का लक्षण है।

मूच्छाश्व्यामं रोगिणीके सुह या नासारन्यु बहुत घोड़ी देरतक खूब दवा रखनेमें, घोड़ा जब परमे भारीमें उमके चिह्न पर इस तरह जब डालना चाहिये, तबमें उमके मांस लेने और छोड़नेमें बहुत घोड़ी देरतक व्याधात पड़े। इसके बाद रोगिणीको जोरमें मांस लेना ही पड़ेगा और यह हीतही तुरन्त उमको मूच्छा भंग होगी ।

### (ग) जरायु प्रदाह (Metritis).

यह दो प्रकारका है—(तत्काल) नया और (पुरातन) पुराना ।

तत्काल जरायु प्रदाह ।—प्रसव या गर्भस्रावका एक दूषित होनेमें मधुराचर तत्काल जरायु प्रदाह हो जाता है, बहुत आँखा माधुर्य होना, प्रसव और घेड़में दर्द होना इसमें प्रधान लक्षण है । ॥ लक्षण दिखाने देने की "मिगाइस मिनिड ३५" देना चाहिये किन्तु "नखभसिका ३०" भी आशय्यक हो सकती है । रेमेडीना ६, कथोमिन् ६, राम-टम ६ या मेकर्मिस ६ भी मध्यम समय पर उपयुक्त होकर लाभ दिखाने सकती है यह रोग प्रदाह या कालजक है यही लक्षण उपयुक्त विशिष्टता पर निर्भर रहना चाहिये । यदि यह दूषित न हो तो भयका कोई कारण नहीं है । ॥ मात्रा एन्थोनाइट ३ । दर्दका से रोग चट जावेगा ।

पुरातन जरायु प्रदाह ।—प्रसवके बाद जरायु संकुचित

न होनेपर अथवा कृत्रिम उपायसे गर्भमंदार न होनेपर या बहुत दिनोंतक हरित पीड़ा भोगनेपर, जरायु क्रमशः वेदनायुक्त, कड़ा और बड़ा हो जाता है। इसीको पुराना जरायु प्रदाह कहते हैं। पेटमें भार मानून होना, बाधक वेदना स्तन या कमरमें दर्द पहिले रजःस्राव पीछे रोध खान्ती संमर्गने दर्द, नूवस्पन्ती और मलद्वारमें वेग, छिटिरिया इत्यादि इन रोगके प्रधान लक्षण हैं।

**चिकित्सा ।**—मैवाइना ३x ।—बेसी मावाने रक्त-स्राव होनेसे, रक्तस्राव परिष्कार, लाल, चटचटा या जलीय होने पर ।

**बेलेडोना ३x ।**—प्रकृत जरायु प्रदाहमें, डाक्टर मैदिमन एकमात्र बेलेडोनाके उपरही निर्भर रहनेके लिये कहते हैं। विशेषतः "जरायु प्रदेशमें जनन या दाव मानून होना, मानो पेटके भीतरी यन्त्र बाहर निकल पड़ेगे" इन लक्षणोंमें बेलेडोना उपयोगी है।

**लिपिया १२ ।**—प्रसवकी दर्दकी भांति दर्द, पीड़ा रजःस्राव, प्रसवद्वारमें खुजली ।

**हाइड्राटिन ३ ।**—जरायु पीडा, जरायु मुख और अन्तःपटिका घाव, गाढ़े पीले रंगका प्रदर साव ।

**एरम्-मेटालिकन ३०, एल्लेटिना ६, नियोक्क ६, मैकेनिन**



६. निमिषमिक्रियता ६, सम्पत्ति १०, लक्षण ३ अनुसार समय समय पर धारण्य हो सकती है।

नियम ।—भोजनमन्त्रिण गमं जनमि गोज दी तौन  
 वार पच्छी तन्त्र धो देना पाहिण्य। जरायु सुखमे धाय रश्मि  
 पर बौम भाग जन्मि माय १ भाग जर्हर्हटिम ० मिनाजर  
 धो हावना पच्छा है। जयलज रोग न जटे, तयलज ह्यामी  
 न मन करन। या कमरमे कमजर कपड़। पहिरना उचित नहीं  
 है। रोज समय पर खान, पटिकर पदार्थ भोजन चौर निय  
 मित पन्थिम आदि करना उचित है।

(ख) अग्यर्थे बोधने वायु, जल या राक्षसं च ।

[illegible]

प्रत्यक्ष ही जल धारिता मुख्यतः विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जलधारा  
 मुख्य जल को जल की विभिन्नता जलधारा मुख्य जलधारा को जल धारिता  
 है। जलधारा मुख्य जल को जलधारा जलधारा जलधारा  
 जलधारा है जलधारा जलधारा जलधारा जलधारा जलधारा  
 जलधारा जलधारा ( 111111111111 ) है जलधारा

( Menometra ) होता है । पैन्थेरिया चार्ब ( चीर चापों-भिज टेविनिम १० इस रोगकी उत्पत्ति दवाये है ।

## ( ड ) जरायु अर्बुद ।

( Uterine Tumours and Cancer ).

कभी कभी जरायु मातमें या जरायु गृहमें माना प्रजायका मग्न होता है जिसका आकार मटरमें भेंबर आधमन तक चीर मग्नमें एकी पछाम तक हो सकता है । किसी किसी मग्नमें रक्त या पीप निजलता है और किसी किसी मग्नमें रक्तमात्र नहीं होता । कभी प्रेतमटर भी दर्जमान रहता है । इस रोगके कारण रक्तकी कभी कभी दम्यात इत्यादि रोग हो सकते हैं ।

चिकित्सा ।- पैन्थेरिया चार्ब १५ ग्रं ।- एक सेन मग्न दिनों बादबार भेंदम बरग्न चर्चिते मर प्रचारके अर्बुदकी दवा प्रथम दवा है ।

## दुग्धित अर्बुद या कर्बट ।

एनेथिज चार्ब ५ :- जरायुं दुग्धित अर्बुद ५ रोगीः  
( ५००० ) चर्चिते चरमाते ।

\* एनेथिज चार्ब ५ दुग्धित अर्बुद ५ रोगीः

यूजा ६ ।—यदि दूषित पर्वुदकी चंकुरावस्था बीत आय  
पार्श्वनिक पायोडमें लाभ न दिखार्दे दे तो, उपदंशजनित  
पर्वुदमें भी यूजा लाभदायक है ।

(घ) जरायुकी स्थानोच्चुति या नासा उखड़ना ।

(Displacement of the Uterus)

कमकर कपड़ा पहरना, उखसना, कूदना, चोट इत्यादि  
कारणोंमें जरायु कभी कभी अपने स्थानमें हट जाता है।  
इसीका नाम नाभी टलना अथवा नसा हटना या जरायुकी  
स्थानोच्चुति है। नाभी टलना साधारणतः दो प्रकारका है—  
(१) स्थानमें हटकर वास्तु कोटरमें ठहरना (२) योनिमें वहि  
र्भागमें निकलना। इन दोनों नाभी टलनेके रोगमें जरायु या  
सन्तानुभागमें हट जाता या भुजक जाता है, नहीं तो पोंछेकी  
चौर भी हट जाता या भुजक जाता है। पंडुमें दर्द (जरायुके  
स्थानमें) दस्त पेशाबमें दुःख होना, श्वेतप्रदर, रक्तस्राव या  
रक्त की चम्पना। कभी बाधक, बन्ध्यात्व, इत्यादि इन रोगके  
प्रधान लक्षण हैं।

निपिया १० ।—इन रोगकी उत्कृष्ट दवा है।

वेनेडोना ६, फेरस पायोड ३५ चुर्ण, मिर्केली ६, स्ट्रेनाम  
६ लक्षणानुसार समय समय प्रयोजनीय होते हैं।









ब्रायोनिया ३x ।—बेलेडोना लक्षणसे अधिक कड़ा और स्तनोर्मे भयानक दर्द ।

फाइटोलैका २x ।—यदि दो दिन ब्रायोनिया फायदा न हो तो इसे देना ।

हिपार सल्फर ६x । पीप होने पर ।

सिलिका ३० ।—फोड़ाके बाद नामूर (Sinus) होनेपर ।

### (ग) स्तनमें अर्बुद ( Tumour ).

फाइटोलैका ३x ।—पुराने अर्बुद रोगकी बढ़िया दवा है ।

वाह्य प्रयोग ।—फाइटोलैका एक भाग बीस गुने पानीमें मिलाकर स्तनके उपर पट्टी रखना ।

### स्तनमें दूषित अर्बुद (Cancer).

हाईड्रैटिम १x ।—यह दूषित अर्बुद बढ़िया दवा है ।

वाह्य प्रयोग ।—हाईड्रैमटिस् ० एक ड्राम, चार औंस पानीमें मिलाकर धोना चाहिये ।

कनायम ३, या साइकिडटा ३ ।—लगातार दो महीने आर्मेनिक खानेसे फायदा न होने पर इसे देना चाहिये ।

स्तन प्रदाह या टुनका देखो ।

### (घ) मेरुदण्डका उपदाह ।

( Spinal Irritation ).

शरीर घीप होनेमें मेरुदण्डके स्थानमें विशेषमें निबद्ध दर्द



होते हैं। इसीको मेरुदण्डका उपदाह कहते हैं। दर्द होनेवालास्थान दर्शानेमें दर्द बढ़ना यही इसका प्रधान लक्षण है।

आणिका १ ।—आघात जनित उपदाह मिमिमिफिउगा

१ ।—जरायुके किन्हीं रोगके साथ उपदाह ।

रसटक ६ ।—पामवातके साथके उपदाहमें ।

पार्नेनिक ६ ।—छायुगूलके साथके उपदाह में ।

नियम ।—सुसुप्त गर्भ पानीसे पौष्ट धीमा और माफ इसमें टहनना उपकारी है।

( ८ ) पिकचसु-अस्थि प्रदेशमें दर्द ।

( Coccygodynia ).

पिक चंसु हड्डी \* को पेशी और विधान तन्तुमें कभी छायुगूल ( Neuralgia ) के तरह तेज दर्द मान्य होता है, इसीका नाम पिकचसु अस्थि प्रदेशका दर्द कहते हैं। उठने, बैठने, मनत्याग, कर्तु और मगम कालमें दर्द होना यही इसका प्रधान लक्षण है। चोट जगहर लगनेसे यह रोग पैदा होता है।

चिकित्सा ।—चोट आदि लगनेसे हुई दर्दमें—  
आणिका ३ या कटा ३५ उपकारी है।

\* मेरुदण्ड आसपासकी पिकचसु अस्थि कहते हैं ।



पदार्थ खाना अधिक भोजन या उपवास चपकारो है। दूध, डाल, फरही, चिवड़ा, पूरी आदि पुष्टिकर और इनका भोजन करना चाहिये। मोधा मिट्टीके बरतनका टुकड़ा आचार खराब चीका बनाया पदार्थ खाना मना है। जो मव द्रव्य खानेसे अजीर्ण होनेको सम्भावना हो उसे विष भांति देखना, कारण अजीर्णके दस्तके साथ गर्भका बालक भी निकल सकता है। गर्भावस्थामें नाना प्रकारके वस्तुको खाने की इच्छा होती है, जिस द्रव्यके खानेसे गर्भस्थ शिशुके खराबीका डर न हो वैसा पदार्थ अवश्य खानेको देना चाहिये।

(ख) पोशाक ।—कपड़ा ठीका पहिरना चाहिये, कारण कमर को खूब कस कर कपड़ा पहिरने से बालक विकलांग या मराडुआ बन्त पैदा होता है। तथा भींगा और मैला कपड़ा भी पहिरना अच्छा नहीं है।

(ग) मैदुनत ।—रोज माफ हवामें टहनना और नियमित परियम करना उचित है। अधिक परियम करने से गर्भपात होता है और बिलकुल खानभीके भांति बैठे रहने में प्रसवके समय प्रसूतीको कष्ट और बालक निम्नेत्र होता है। गर्भावस्थामें ( खामकर प्रथम तीन महीने में ) गाड़ी, पानकी, क्रिश्नी या रैनकी मशरी करना, दाडना, भारी चीज उठाना, कूदकर या एक पैरमें खनना खामो महवाम

आदि मना है कारण इस से गर्भपात होनेका डर है । गर्भावस्थाके दस महीने एक जगह रहना चाहिये ।

(घ) मन ।—मन सर्वदा निरुद्धेग और प्रसन्न रखना चाहिये । माताके मनका भाव गर्भस्थ शिशुके मनके उपर काम करता है ; गर्भावस्थामें नारीका मन भयान्त रहनेसे भावी सन्तानभी डरपोक होती है । गर्भिणीका मन लदाम होनेसे—विषम स्वभाव लिये पैदा होती है । ( इस अध्यायमें पहिले गर्भावस्था और पीछे प्रसववस्था के बारेमें लिखा जायगा ) ।

गर्भावस्थामें गर्भिणीको बड़ी सावधानीसे रखना चाहिये । गर्भ मंदारसे प्रसवकाल तक साधारणतः नाना प्रकारके उपसर्ग होते हैं और उससे गर्भिणीको अतिशय कष्ट भोगना पड़ता है । नीचे प्रधान उपसर्गके विषयमें लिखा जाता है ।

मूर्च्छा ।—मूर्च्छा होते ही मुख पर ठंडा पानीका छीटा देना और मस्कस ० या स्प्रिट कैम्फर मंथाना चाहिये । मूर्च्छा छूट जाने पर नीचे लिखी दवाये दी जाती हैं । रस रक्तादि चयसे हुई मूर्च्छामें चायना ६, ३० ; डर जानेसे हुई मूर्च्छामें—पोपियम ६, शोकि दुःखादिजनित मूर्च्छामें—इग्नेमिया ६ ; हृत्पिण्डकी क्रिया सीगकी मूर्च्छामें—डिजिटैलिस ६ ; सायबिक दुर्बलता के कारणकी मूर्च्छामें—मैग्नोफम ६ ।

शिरका भारी एन और घुमना ।—रक्ताधिक्य से हुए माया घुमने और पांखके सामने काला कासा दाग दिखाई देनेसे ऐकोनाइट ६ । दप् दप् शिरःपीड़ा, पांख और मुख मंडल लालरंग तथा कानमें भौं भौं शब्द होनेके लक्षणमें वेलेडोना १ । माथेमें रहरह कर दमक और दर्दमें नक्सममिका १० । जहरत होनेपर “शिरःपीड़ा” चिकित्साकी दवायोंमें चुनकर प्रयोग करना चाहिये ।

दांतमें दर्द ।—दातके दर्दके साथ बुखार होती ऐकोनाइट १ । स्नायविक उभेजना या चर्बीर्ण दोषके दन्त-गूलमें कैलकेरिया-फ्लोरेटा ६, मार्कियूरियाम ६, नक्सममिका १०, कैमोमिला १२, पाण्डिम-कूड ३ और क्रियोजोट १२ लक्षणा-नुसार प्रयोग करना चाहिये । “दन्तगूल” देखिये ।

शोथ ।—गभावस्थामें रक्त मन्वात्मन क्रियामें बाधा होनेमें पैर जघा और स्त्री जननेन्द्रियमें शोथ होता है । चार्मेनिक ३०, चायना १, एपिस ६ और फेरस ३० लक्षणानु-सार देना चाहिये । “शोथरोग” देखिये ।

वमन और वमनच्छा ।—गभावस्थामें वमन, वमनच्छा और मुँहमें पानी जाना यह तीनो उपसर्ग प्रायः प्रातःकालकी उठना है । थोड़ाटिन इसी तरह होता रहता है फिर चापचा चाप बन्द हो जाता है । यदि मज्जमें



गिरमें दर्द, अग्निमान्द्य या वमनच्छा रहें तो नक्षभमिका, त्रायोनिया और भिपिया, उदगमय हो तो, चाररिम और भिरादूम । कमर और पेटमें ऐठना होनेसे कनोमिन्य, किड-ग्राम, नक्षभमिका, माथकी पेट फूला रहें तो लाइको-पोडियम ।

कजियत ।—कलिन मोनिया ३० इसकी प्रधान दवा है । दूसरी दवायें —नक्षभमिका ३०, त्रायोनिया ६, मन्फर ३०, थोपियम ३०, ग्राम्बम ६ । कोष्ठवह रोग देखिये ।

उदगमय । भाकिथुराम मन्फर ६, चायना ६, एमिड-फम ६ मन्फर ३० और पोंडोफाइनम ६ ।

हामोंकी ज्वल ।—एथमेटिमा ६ और कैपमिकाम ६, इस दुखदायी रोगकी प्रधान औषध है । अथपित्त रोगमें दृढ़ हामोंके ज्वलनमें कल्केरिया काय ६

एनिडा नोटि न चाता ।। कफिटा ६ इसकी प्रधान दवा है । एनिडा रोगकी नोटि चाता और पिचुली रोगकी नोटि न चाता मन्फर ३० । एनिडाके माथ ऊपर भी चाता ही तो एकोन'इट ३० । रैरका थैथन या दृढ़के मन्फर नोटि न चाता केमोमिन' ६ या भिरादूम ६

एथि'रिक्ता माथ'मि'या टिकरा चाटि खानेकी दृष्टि । अधिक रोजम काब'भत्र ६ । मकंद मिर्ही खानेकी दृष्टि । रोजम कल्केरिया काय ६





ज्वर ।—गर्भावस्थामें पहिली कई एक महीने ज्वर थोड़ा रहनेमें दवा देनेकी जरूरत नहीं है । यदि ज्वर न बूटे तो एकोनाइट ६ देना चाहिये ।

दर्द ।—पैर या पैरोंके तलवोंमें एकाएकी, ऐंठन, स्पैजम या दर्द हो तो किउग्राम ६ या जैसिमिमियम ३ देना उचित है ।

पायस्थानोंके जगहमें खुजली हो तो बोराक्स ३ और पेट्रु ६ इसकी बढ़िया दवा है । मोहाना पानीमें सिन्काजर दिन-भरमें दो तीन बार खीं रहने धोना चाहिये ।

पेट बड़ा होनेके चखत्ता कष्टमें ।—बैनेडोना ६ और लक भूमिका ६ ।

पेटमें बालक हिमनेके कष्टमें ।—पॉपियम ६ चार्निंका ३ ।

धानुका बिमारी ।—दूधके तरह धानु बचनेमें कैल्केरिया ६ इसकी या पानीके तरह धानु बचनेमें, सिपिया १२ । धानुके बचनेमें चखत्ता जगहोंके होने पर, चायना ६ । यदि धानु बचने समय गालिबे बर बुराबट हो चखत्ता संगम करनका धुब इन्हा हो ना, ब्राटिना ६ । "मन प्रदर" देखा

स्तनमें दूध स्तन बड़ा, लाल, भाग चोरे दूध हो तो बैनेडोना ३ । स्तन ऊँचा, भाग त्रिभु लाल न हो तो इस चखत्तामें बायोनिडा ३

स्तनके बोटोंमें जलन या पाव पाट स्तनमें बोटोंमें

दाह हो, तो चार्निफा । भोजन करना चाहिये और चार्निफा  
कममें मिलाकर धोना चाहिये बौटोने घाव होनेमें  
साइन्डाटिम । भोजन करना चाहिये और साइन्डाटिम घानेमें  
मिलाकर लगाया चाहिये ।

मन बड़ा होनेमें दारुण दस्तगा ।—दुग्ध देदनाई तब  
तबलीफ होनेमें, चीनायाम् । दाहयुक्त दस्तगामें, डेल  
होना । और हायोनिडा ।

मानसिक बह ।—अभिर्णी मदा उदाम रई हो, मिर्चि  
मिपिडगा । शीतल हो, इम्पेडिया । हृत्पूर हो, एकी  
माइट । बृह रुभाव हो, पैमोमिना ।

अमृतत प्रसव देदना । अर्भावस्याई काय काय प्रसव  
देदनाई बराबर जो देदना देहां कामो है । अमृतत देदना  
अमृतत प्रसव देहां पैमोमिना । इन्की इन्की होय  
है । अमृतत । मिर्चि दा बलीयाइलम । अमृत  
अमृत दा तबलत होनेमें देहा रईक

अर्भावस्याने रत काय ।—अभिर्णी देहिक  
हामे, मिर्चि होयने देहा मिपिडने, हायुके होयने  
एकी मायव दुग्ध । अमृतत अमृतत कामो है  
होय इन्की अमृतत होय कामो होय है ; अमृतत ।  
इन्की इन्की होय है ।

। अमृतत अमृतत मिपिड दुग्ध अमृतत मुपुला  
अमृतत अमृतत होय अमृतत होने ।

है, उस समय रोगिणीको अत्यन्त कष्ट होता है । इस लिए अच्छे वैद्यको देख लाना चाहिये यह रोग गर्भावस्था के प्रथमभागमें या ठीक प्रसव कालमें होता है । ऐसे समय पर रक्तस्राव होना ही इसका विशेष लक्षण है ( स्वाभाविक प्रसव वेदनासे श्रेयावत् पदार्थ मात्र निकलता है, कभी भी रक्तस्राव नहीं होता “प्रसवकी प्रवस्था” देखो ) ।

**धातुदोष ।— ( Diathesis )** ।—माता पिताकी कोई रोग होनेसे संतान पर पसर करता है । गर्भावस्थाके प्रभूतिकाको निम्न लिखित रोगों पर प्रत्येक मासमें एकवार सेवन करानेसे भावी संतान मजबूत होती है :—

**कौस्तुभिका-कार्य १० ।**—पिता या माताको गण्डमांसा ( Scrofula ) या धातुप्रसूत होनेपर ।

**त्रैमिनिनाम २०० ।**—यक्ष्मा या क्षय रोग कुलज होनेसे ।

**मोहिनाम ३० ।**—पिता या माताको दुर्गन्धयुक्त चर्मरोग रहने ।

**मिनिनाम ३० ।**—पिता या माताको अस्मि विह्वल रोग ( Rickets ) होने पर ।

**वैराट्टिका-कार्य ३०, चाइयोडियम ३०, युजा ३०, मार्क्युरियम ३०, कटिकाम ३०, सिपिया ३० और सल्फर ३०** रोगके लक्षण अनुसार प्रयोग करना चाहिये ।

## गर्भपात या गर्भस्राव (Abortion).

गर्भ संचारने छः मास तक गर्भस्थ शिशु पतन होनेको “गर्भस्राव” कहते हैं। इस अवस्थामें लड़का बच नहीं सकता। अच्छी तरह उपचार न होनेसे प्रमूतीके जीवन नाशकी प्रायंका रहती है अर्थात् सात महीनेके बाद और नौ महीनेके पहिले जो मन्तान होती है उसको “अकाल प्रसव” कहते हैं। ऐसी अकाल प्रसूत मन्तान दीर्घायु भी होती है।

कमर और पेटमें दर्द होनेसे समझना होगा कि लड़का पेटके नीचे खमक आया है, रक्त या श्लेष्मा निकलना यह गर्भपातका पूर्व लक्षण है। गर्भावस्थामें कमकर कपड़ा पहिरना, अधिक परिश्रम करना, गाड़ी, पालकी, नौका, रेल इत्यादि पर चढ़ना (विशेषकर गर्भावस्थाके प्रथम चार महीनेमें), दौड़ादौड़ करना, गिर जाना, भारी चीज उठाना, घंगूठके बल खड़ा होना, तमबीर टांगना या खटिया पर सम-हरी लगाना, शरीरमें सेचकका होना, ज्वरमें पीड़ित रहना, स्वामी महबान, तीव्र शौषध सेवन इत्यादिमें स्त्री जननेन्द्रियमें पीड़ा होती है। अतिशय भय, भावना, शोकादि कारणसे गर्भस्राव होता है इस लिये उपरोक्त विषयमें खूब सावधान रहना चाहिये। जिसका एक मरतवे गर्भपात हुआ है फिर उसकी गर्भपात होनेकी संभावना रहती है, इस लिये

गर्भ संचार होतेही खूब सावधान होना चाहिये । यह रोग बड़ा कठिन होता है, इस निचे विवेचना महित चिकित्सा करना अत्यावश्यक है ।

### गर्भपात निवारण चिकित्सा ।

स्वाशर्दना ३ ।—गर्भावस्थाके प्रथम तीन महीने तक गर्भ छाव होनेका सम्बेद रहता है ( अर्थात् दर्द होनेसे या रक्त दिखार्द देनेसे ही ) ।

सिकेलि ३ ।—गर्भावस्थाके चतुर्थ या पंचम मासमें गर्भ-पातकी आशंका रहती है ( अर्थात् दर्द होनेसे या रक्त दिखार्द देनेसे ही ) ।

घानिका ३ ।—गिरना, भारी चीज उठाना, चोट लगना, इत्यादि कारणोंसे गर्भपात होनेकी आशंका है ।

कैमोमिला ३ ।—क्रोधादि मानसिक उत्तेजना होनेसे गर्भपातकी संभावना होती है ।

बारबार गर्भपात निवारण चिकित्सा ।—पूर्वमें जिस समय गर्भपात हुआ हो, उससे निदान एक मास पहिले प्रति सप्ताह लक्षणानुसार निम्नलिखित औषध सेवन कराना चाहिये :—

अरायुके दोषसे गर्भपात होने पर ऐपिस ३, स्वाशर्दना ३ या सिकेली ३ ; फ्लूका ( Placenta ) दोष होनेसे फ्लू-



मूत्रिकादि रोग उत्पन्न होनेसे गर्भवतीका प्राणतक जा सकता है। फूल गिरनेमें देरी हो तो, पन्धमेंटिना ३० या मिर्च ३० देना चाहिये और जो कुछ रोज रक्तादि बहता रहे चायना ६ देना चाहिये।

### प्रसवावस्थाके उपसर्ग ।

प्रसवकाल ।—पहिलेही कहा है कि गर्भ संचारके दिन प्रायः २८० दिनमें ( अर्थात् दसवें महीनेमें ) सम्पन्न हो है। नौ महीने तक गर्भिणीका पेट बढना है। उसके बा ( अर्थात् प्रसव होनेके दस दिन पहिले ) पैरू भूख लगता है, कमर भारी होती है, अनेकवार पिशाच होता और कमरके नीचेवाली कडीमें वेदना उपस्थित होती है ये सब लक्षण दिखाई देनेमें मूत्रिका गृहका बन्दोबस्त करना चाहिये।

मूत्रिका गृह ।—घरमें जो सबसे उत्तम घर हो— अर्थात् जो घर बड़ा साफ, गुनामेदार, दुर्गन्ध रहित, हवादार और जिसमें धूम्र न पावे या धूँआ न जमें ऐसी घरके मूत्रिकागृह बनना चाहिये। मूत्रिका गृहके दोष माना य सम्पन्नके प्राणघातक होते हैं।

प्रसव बैठना ।—जरायु याक्रांका परिवर्तन होना स्त्री जननस्थि आदं होना और नमीका टोना पडना, मान

सिक चिन्ता होना इत्यादि प्रसवके होनेके पूर्व लक्षण है। फिर जब बारबार दस्त और पिशाव करनेकी इच्छा हो, वमन हो, वमन होनेसे शरीरकांपे, जल निकले ( अर्थात् योनिसे फेनके तरह श्लेष्मादि बहने लगें ) तथा कमरसे दर्द शुरू होकर पेटके तरफ आकर मिल जाय तो प्रसव वेदना जानना चाहिये। अनेक समय प्रसव वेदनाका निर्णय करना कठिन हो जाता है, इसके प्रकृत और अप्रकृत पृथक् २ लक्षण नीचे दिये गये हैं।

**प्रकृत लक्षण ।**

**अप्रकृत लक्षण ।**

१।—पीठ, कमर ( कभी जंघे तक दर्द हो।

२।—हर वक्त दर्द नियमित रूपसे ( जैसे प्रति पन्द्रह, बीस, तीस मिनट अन्तरके क्रमसे ) आती और जाती हो।

३ - हर वक्त दर्दके साथ जरायु मुख घोडा घोडा फैलता जाय और जल बहता रहे।

१।—केवल पेटमें दर्द (ठेंठन या गुड़ गुड़ करना) बनी रहे।

२।—दर्द उठनेका कोई नियम नहीं जैसा, कभी दस मिनट और कभी पांच मिनटके बाद दर्द होता हो और कभी दर्द अद्विरामभावमें होता रहे।

३।—दर्दमें न जरायु मुख फैलता है और न पानी बहता है





## स्वाभाविक प्रसवके समयमें कई अवश्य पालने योग्य विधि ।

पहिली अवस्था ।—प्रसवकी पहिली अवस्थामें गर्भिणी जिततरह रहना और जो काम करना चाहे उसमें बाधा देनेकी आवश्यकता नहीं है । इस अवस्थामें उसे सुतिका गृहमें लेजाने या कांखनेकी आवश्यकता नहीं । बीच बीचमें गरम दूध या गरम पानी पिलाना अच्छा है इससे दुर्बलता दूर होती है । ठंडा पदार्थ खिलाना अपकारी है ; इसे खिलानेसे प्यघा बढ़ सकती है ( अर्थात् प्रसव वेदना बन्द होजाती है ) । पहिले अवस्थामें कोई औषध देना अच्छा नहीं ; और यदि मानूम हो कि पहिले बच्चेका मिर बाहर न निकलकर यदि दृमरा कोई अड़ बाहर निकलेगा तो, एन्टेस्टिना : : दो तीन भावा खिलाना चाहिये—इस औषधके गुणमें शालकका मिर धुनकर नैचके तरफ आसना है । “प्रसवकालके उपमर्श” देखें

द्वितीय अवस्था ।—इस अवस्थामें अति मावधानसे कार्य करना चाहिये । जब बच्चा शुरू होवे तब मूत्रिका की मूत्रिका गृहमें लेजाना चाहिये, और पहिलेके तरह बीच बीचमें गरम दूध उगैर पिलाना चाहिये । यदि अठ थोरे थोरे कम होवे तब तो गलेमें दगुले डालकर या नकमें मोक डालकर या केड खिलकर या जिसे मांसान्य उपार्थ







तीन हाथ लम्बा और आध हाथ चौड़ा कपड़ा प्रसूतिके पेट पर १० रोज तक कमरबंदकी तरह बांध रखना चाहिये। किन्तु प्रसवके उपरान्त दो घण्टा यदि दोनो हाथ प्रसूतिका जरायुकी पेड़में दाब रखा जाय तो फिर पेटी बांधनेकी आवश्यकता नहीं होती है।

प्रसव होने पर और तीन घण्टातक प्रसूतिकाको चित सुना रखना चाहिये, तथा कपड़ा ढोड़ना और दस्त पिमाव भी पड़ेही पड़े करना चाहिये; हिलने डोलनेमें भयानक रक्त-सावकी विलक्षण आशंका है। तीन घण्टा स्थिरभावमें रहे तो सहजही सुनिद्रा आकर प्रसूतिका सहजहीमें स्वस्थ हो जाती है। प्रसवके आठ दस घण्टा बाद प्रसूतिकी जब थोड़ा आराम मिले तब शिशुकी बोडी (स्तनकी) घीसनेकी देना चाहिये; बोडी घीसनेमें स्तनमें जलदी दूध आने लगता है, और जरायु संकुचित होकर रहताव नहीं होता। यदि प्रसवोपरान्त विमेष कोई उपद्रव न हो तो आदिवा : चार घण्टे बाद तीन दिन प्रसूतिकी भ्रमन कराना अच्छा है। आदिवा भ्रमन करानेमें प्रसूतिका जब प्रसूति अनन्तर तरकीबी प्रसूतिके थोड़ा नहीं होने पाती है।

प्रसवोपरान्त यदि अधिक परिमाणमें बहतावादि हो तो "प्रसवके अनन्तर उपद्रवादि" देखो।

प्रसूतिका घरमें प्रसूतीकी सेवा :—शरीर प्रिये रुटे निद्रमकी विमेष ध्यानमें देखो।



जलके साथ मिलाकर रोज तीनवार धोना चाहिये ) देना चाहिये ।

**रक्तसाव ।** ( Haemorrhage ) प्रसवके बाद रक्तसाव होनेमें, प्रसूतिके जानका डर रहता है । ख्याल रहे कि प्रसवकालमें रक्त थोड़ा जाना चाहिये । खूब बिशी या सालवर्ष रक्त, स्रोतके तरह बराबर बहनेमें, निम्नलिखित उपायमें उमी दम करना चाहिये ।

प्रसूतिकी सोलाकर सिर नीचा और जंघा ऊंचा करना चाहिये, बाद उमी वक्त उसके पेट पर हाथ रख जरायुकी मुट्ठीमें इस कदर धरना चाहिये कि वह संकुचित हो जाय, और गरम जल ( १२० ) उसके जननेन्द्रियमें पहुँचाना चाहिये । मिल सके तो बरफका टुकड़ा प्रसूतीके पेट पर और जननेन्द्रियमें रखना चाहिये और बरफ खानेके लिये भी देना चाहिये, बर्फ भी रक्तसावकी बन्द करता है ।

प्रसवकालमें, सेवादना ३X या हेमोमेलिस ३X और रक्त बहनेमें यदि सुस्ती मालूम हो तो चायना ६, और सावसे मस्तकमें पीड़ा हो तो, फेराम् ६ देना चाहिये ।

**मूर्च्छा ।**—प्रसवकालमें या प्रसवके बाद किन्ती किन्ती स्त्रीको मूर्च्छा आकर उसके प्राणतक नाश होते हैं, इसलिये खूब सावधान होकर चिकित्सा करना चाहिये । मूर्च्छाके साथ सर्वाङ्ग बर्फके तरह ठंढा होनेपर, रुविन'का केम्पर : मूर्च्छाके साथ कपालमें ठण्डा पर्माना हो या सामान्य हिलनेमें मूर्च्छा



चागई हो तो, भिंगादाम एन्ज ६, रक्तसाधनी मूच्छा होने पर नायना ६ या कार्बोमिज ३०, यदि बारंबार मूच्छा आवे या बहुत देरतक रहे तो इामीनियम ३५, चायात जलित मूच्छा पर थानिका ३, अथवा मूच्छा होनेपर एकोनाइट १५ या कफिया ६ उपकारी होगा। औषध निगलनेको सामर्थ्य न हो तो निर्दिष्ट औषध मंथाना चाहिये। गरम चार्बी इत्यादि हलका द्रव्य लेना चाहिये, फिर ताकत देनेवाला भोजन करना चाहिये।

**हिंठन या चाँदप** — (Convulsion) प्रसवके बाद ( यदिसे अथवा प्रसवकालमें ) अर्धाङ्गमें घोंड़ा होना यह बड़ा ही विपत्तिका कारण है। विरमें कभी दंटे होना, उन्मत्ता चाँदपमें कम होना होकर अमय अङ्ग बढ़ाना, चाप पैरमें दंटे होना, लम्बा मानस होना, क्रममें चाँदपकी पुनर्भी पुनर्भी, मूत्र कभी इस कर्ममें नरक कभी इस कर्ममें नरक होना। अन्धकार बाहर होना अन्तर्द्वारा नरक अर्धाङ्गमें दंटे होना और अर्धिकाका कर्मों का होना। जिस दो बार मिश्रित होकर चाँदप होना तथा चाँदप दार्जिल बाहर प्रसूनीका विरमें बड़ा होना, इस नरक का चाँदप पर चाँदप होना और चाँदप बड़ा होना यह सब लक्षण अलग है।

प्रसवकाल में चाँदप दंटे

दो विपत्तिका अन्तर्द्वारा

१११. दो चाँदप होना यह सब चाँदप का कारण है।



पांथाघण्टा चक्कर पर देना चाहिये । तीनचार इलेक्ट्रोनेके प्रयोगमें पिशाच न हो तब इकुर्रसेटम् १x देना चाहिये ।

**फोष्टयह** ।—प्रसवके बाद अरायु रक्तादि 'यन्त्रीकी' काम बन्द रहता है इसमें प्रथम तीन चार दिन प्रभूति का पाखाना नहीं होती, इस अवस्थामें चौपच सेवन करानेमें बीमारी बढ़नेकी संभावना है । यदि पांच छः दिन पर्यन्त पाखाना न होकर कट मानूस हो तो कलिनोत्रिया १x या मीराडाम एल्बम ६ देना चाहिये ।

**उदरामय** ।—प्रसवके बाद उदरामय की ती हाईपोमयेमाम ६ या पल्मेटिना ६ देना चाहिये ।

**चर्म** ।—प्रसवके बाद कभी कभी चर्म होता है; पल्मेटिना ६ सेवन करना और हेमामेल्मिन् तीसगुने जलके साथ मिनाकर धोना चाहिये ।

## मृतिका-ज्वर (Puerperal fever).

मृतिका-ज्वर यह एक खतरा विचार है; किन्तु यहाँ स्थिरांशों पोंडामि हो मतभव है । मृतिका-ज्वर अति भयानक और खटदायक रोग है । इसका कारण एक प्रकारका विष है । प्रसवके बाद माना कार्बोमि अरायुका दूषित होना, प्रसवके बाद छूनका कुछ हिस्सा अरायुके भीतर रहजाना,

यही रोगका कारण है। प्रभवके ३।४ दिन बाद प्रसूतिका ज्वर होता है। पहिले सामान्य ज्वर आकर फिर धीरे धीरे बढ़ता है; तब शीत, कंपकंपी और शरीर गरम होता है; शिरकी पीड़ा; नाड़ीका वेग; प्यास; पेटका दर्द; और १०६ डिग्री पर्यन्त ज्वर रहता है, परन्तु पसीना नहीं आता; और प्रायः स्तनसे दूध आना बन्द होजाता है। तथा ७।८ दिनमें मृत्यु होती है। जरायुमें सुगन्ध पीपके तरह निकलना यह अशुभ लक्षण है।

**चिकित्सा।**—एकोनाइट ३५।—पीड़ाके प्रथम अवस्थामें अत्यन्त ज्वर; शीत और कम्य, नाड़ी द्रुत और कठिन, शरीर सूखा, पेट फूला और वेदनायुक्त, अत्यन्त प्यास, जरायुमें दर्द (डाक्टर लडलामने इस अवस्थामें मेराट्रामभिरिड १, व्यवहार कराकर बहुतेरीकी जानकी बचाया है।

**वैलेडोना ३०।**—उदरमें अत्यन्त पीड़ा; अस्थिरता, स्तनमें दूधका न रहना; मन्तकमें दप् दप् पीड़ा, इसी तरह नेत्र और मुखमण्डल लालवर्ण।

**नक्सभमिका ६।**—जरायुकी विमारी बढ़ने पर।

**कलोमिन्य ६।**—ज्यादा पेट फूलनेमें।

**व्येलिमायेनेट्राम ३०।**—एकाएकी चिड़क मारती हुई पीड़ासे यदि रोगिणी रोते रोते सुन्त होजाये।

मार्किन्डवियाम कर ६।—उद्गमं काटनेके गरज पोडा  
 होनेके कारण रोगिणी घटपर जाय न रहने देतो ही;  
 चखल प्यास हो रक्त या पात्रस्थिये पाखाना ।

अनेकविध ६।—पेटमें चत्तिका बिदना हो। घोंग (मिदना)  
बाद घोंग हो।

रमटका ६।—जरायुमें यमन हो विजिपकर गर्भरसे  
मौचिते यममें कठिन पीड़ा हेतक तदनु रहनेवाला या  
पीर मासिप्रातिक कर लक्षणमें।

पार्श्वोन्मेष ३०, ३००।—पार्श्वोन्मेष कावचमे रक्तमे विकार  
 हो तो देना चाहिये (Pyæmia Condition) प्रथम  
 वेगमे क्षर हो यदि शीघ्र जीवभोजनिका लाग करे, तो पार्श्वो-  
 न्मेष ३० या पार्श्वोन्मेष ६। पार्श्वोन्मेष ६ पर्यायक्रममे  
 प्रयोग करना चाहिये।

दुर्गा श्रीवर्धन-आशुषोभिता ६, वल्लभटिका ६, ईसा  
मिथिल १, नाथना ६, गरिम ६, वेदमं योका ईशमं सु  
मयम वल्लभम वेदमं वल्लभम नाथना

[illegible]

रोग" स्वयंसे संक्रामित नहीं होता, या किसी प्रकारके दूषित दिग्गते उत्पन्न नहीं होता. इसलिये यह मृतिका स्वरकी पुरानी अवस्था या आकार नहीं। प्रसवके बाद यदि प्रभूतिकी अच्छी सेवा न होनेसे शरीर घीरा होकर रहर्हीन होता जाता है, और पुराना स्वर उदरामय, मूजन इत्यादि होता है; इसीको पुरानी मृतिका रोग कहते हैं।

**चिकित्सा ।**—इस कठिन पीड़ाके लिये नेडाम-मिडर ३०, चार्मेनिक ३०, चायना ६, फेराम-मेट् ३०, एलु-मिना ६, सिपिया ३०, प्राफाइटिस् ३०, पलसेटिन्ना ३०, नक्तभमिका ३०, दिया जाता है, किन्तु फेराम चार्मेनिकम ३०, इस रोगका उत्तम औषध है। मागुर महलीका घोरवा पीना चाहिये। "रक्तस्रवता" रोगकी चिकित्सा देखी।

**अंतड़ीकी वाई ।**—(Puerperal Insanity) ।—प्रसवके बाद ( या पहिले ) मन्दबुद्धि होनेके कारण कोई कोई स्त्री पागल होजाती है। यह वायुरोग दो प्रकारका है:—  
(१) उल्काट ( Mania ) और (२) विशाद-वायु ( Melan-

१. उल्काट रोग बुद्धि के अभाव में, अत्यंत इच्छा, प्रिय मनोरंजनों के लिये दौड़ना इत्यादि "उल्काट रोग" के प्रधान लक्षण हैं। मन्त्रालय पत्रिका में यह

सुग्रीवे भाव ऐसे लक्षणमें, हाथपीमायेसम् १, घोर उन्माद ( यथा भयंकर प्रमाथ, क्रोध, काटनेकी जाना, एकान्त अथवा अत्यन्तारमें रहनेकी अभिच्छा, निर्वृज भाव इत्यादि ) लक्षणमें, डामोनियास १, उच्च भावपूर्ण प्रमाथ अथवा एकान्त घोर अत्यन्तारमें रहनेकी इच्छा, किंवा रङ्ग रहकर शारीरिक घोर मानसिक क्रियाका बन्ध होना ( Catalepsy ) ऐसे लक्षणमें, केनोसिम इन्डिका ६ देना चाहिये ।

(२) विषाद वायुनीग ।—मनन विमर्ष वा जड़भाव, हृदयमें शून्यताका अनुभव, अथवा आत्महत्या आदि “विषाद वायुनीग” का विशेष लक्षण है । सिमिभिकिउमा ३ इसका एक उल्लेख दीया है । आत्महत्याकी इच्छा बनवनी हो ती, चरम भ्रष्ट ६ देना चाहिये, डाटिना ६, एनर्भिटिना ६ वा एम्मानफाटाम ३ क्रिमी क्रिमी समय उपचारों कोमकरता है ।

वायुधमना कीका मन क्रिममें जग भी उमेजिन न की रिमा प्रबल करमा चाहिये । दूध आदि हलका घोर मानस वर दलर्वा अथवा करमा चाहिये, कोई कोई मोमेने मिहहहा शोया उपचारों कहते हैं ।

मेल्गुदर । *17 Melgudar 217-218* । क्रिमी क्रिमी कीका दीर समरंज हद धुन जगता है हा मरिद की जगता है । देहमे दीर लह, हट्ट, जग “रज्जवहना” ( *17-218* )

स्तनका दूध कम होना यही कटकर पीड़ाका उपसर्ग है। पलसेटिला ६ और हेमोमेलिन ३x इसका उत्कृष्ट औषध है, एपिस : और रसटक ६ मौके मौके पर देना चाहिये। साफ रुई पैरमें बांधना चाहिये, हलका और ताकतवर आहार करना चाहिये।

वस्त्रिकोटरके कौशिक भिन्नी प्रदाह (Pelvic cellulitis) अस्त प्रयोग या आघातादि कारणसे यह प्रदाह उत्पन्न होता है। पैडूमें दर्द, ज्वर और जननेन्द्रियका फूलना इन रोगका प्रधान लक्षण है। एपिस ६ और रसटक ६ यह रोगका औषध है, जोरका ज्वर होनेसे भिरादाम-भिरिड १x देना चाहिये।

वस्त्रिकोटरमें पौला फोड़ा (Pelvic abscess)।—यदि “वस्त्रिकोटरकी कौशिक भिन्नी प्रदाह” उपरोक्त औषध प्रयोगसे अच्छा न हुआ तो क्रमसे फोड़ा होता है (अर्थात् पीप होना आरंभ होता है) ऐसा होनेसे (पकानेके लिये) हिपार नलकर ३x देना चाहिये और इसी तरह अगर पीप निकलता हो तो मिलिका ६ इसकी व्यवस्था है।

पेटका भुल पड़ना।—प्रसवके बाद किसी किसीका उदर नीचेके तरफ भुल जाता है। यह देखनेमें भद्दा मालूम होता है, नहीं तो कोई रोग नहीं है। केलरेरिया ३० या मिलिका ३० प्रतिमान एकवार करके देना चाहिये।



**सिरका वाल छड़ना ।**—प्रसवके बाद दुर्गन्धारे कारण किसी किसी स्त्रीके बाल झड़ने लगते हैं। कम्पोजि एमिड ६, घायना ६ या फार्मेनिक ६ इसकी चोखे है।

स्तनरोग ।	}	प्रसवके बाद स्तनकी
स्तनदुग्ध रोग ।		पौड़ा देखो ।

### प्रसवके बाद स्तनकी पौड़ा ।

प्रसूतिका स्तन मध्यस्थमें कई एक बाले नीचे लिखी जाती हैं।

१। गर्भके दिन चारमास बादमें स्तन बढ़ने लगते हैं, उसी समयमें स्तनके घोंड़िका चोर ध्यान देना चाहिये। आजकालके "मध्यताके" अनुसार ऐसी कमी चर्गिया बगर न पहिरने चाहिये जिसमें स्तनकी घोंड़िकाके उपर दाब पड़कर उसके बढ़नेमें बाधा हो।

२। यह पहिलेकी लिखा गया है कि प्रसवके पाठ इस बगला बाद मल्लानकी स्तनपान कराना चाहिये, इसमें नक मल्लानकी सामानासि पावना होता है और प्रसूतिका ज्वरादि नहीं होता।

३। हमेशा मल्लानकी स्तन देनेके समय पहिले घोंड़िका दूध निकालकर फिर मल्लानकी स्तनका घोंड़ो देना चाहिये।

४। प्रसूतिका पादार्थके दोषमें स्तनका दूध पारा हो सकता है, और यह दूध पान करानेमें मल्लानकी पेटमें दर्द पड़ानेका आदि रोग होते हैं, अतएव पादार्थ नियममें प्रसूतिका कुछ सावधान रहना चाहिये।

५। स्तनकी बोड़ीको घाव होनेसे या माताको पेटकी बिमारी अथवा ज्वरादि हो तो शिशुको स्तनपान कराना नहीं चाहिये ।

६। कठिन शारीरिक परिश्रमके बाद या क्रोधादि मानसिक उत्तेजनाके समय, या ठीक स्वामी सहवासके बाद स्तनका दूध खराब होता है, और ऐसी अवस्थामें मंतानको स्तनपान करानेसे उसको अत्यन्त पीडा तथा च्युतक हो सकती है ।

**दूधज्वर ( Milk fever )** ।—प्रसवके कुछही घण्टा बाद दूध पैदा होनेके समय किसी किसी प्रभूतिको स्तनमें कांटा चुभनेकी तरह दर्द होता है और दो-एक दिनमेंही दोनों स्तन कड़े होकर सामान्य ज्वर होता है इसीको दूधका ज्वर कहते हैं । इसमें कोई औषध देनेकी आवश्यकता नहीं है, केवल जबतक ज्वर हो तबतक मंतानको स्तनपान कराना नहीं चाहिये, तथा स्तनमें ठण्डी हवा न लगने पावे । किन्तु दूधका ज्वर भयानक होनेके कारण यह बीम घण्टेमें अधिक हो तो, एकोनाइट ३x देना चाहिये और ज्वर छूटनेके बाद यदि स्तन नरम न हो तो (स्तन नरम होनेतक) ब्रांड्योनिया ६ देना चाहिये ।

**स्तनप्रदाह** ।—इसका प्रसवके बाद किसी समय स्तनमें प्रदाह और माघ ज्वर होता है । तब प्रभूतिके स्तनमें दर्द होता है, इन कारणसे वह मंतानको स्तनपान नहीं करा सकती और उसकी भारी कष्ट होता है । स्तन

## १५ बालरोग ।

**गिग्ग धानन ।**—मन्तानकी नाम काटने और धानकरानेके कुछ देर बाद थोड़ा गरम दूध (दूध और पानी बराबर (बर्फीमें कुलकुला गरम करके) पिनाया चाहिये; मन्तानकी सज सूख होने और प्रभुतिको आराम मानूम होनेके बाद मन्तानकी धान धान कराना चाहिये । मन्तान पैदा होनेके बाद उसमें इकौस दिन तक चित्त मीथाना न चाहिये; डा० प्रिंसर कहते हैं कि मन्तानकी पहिले ही तीन सप्ताह तक ज्यादातर बाँध और सुथानेके उपेक्षा दाहिनी और सुथाना चाहिये नहीं तो, धनुष्टम्भार रोग होनेका डर है ।

मन्तानकी रोक बंदनेके लिये मीदि मकरो के और इमीलिये पैदा होनेके बाद थोड़े दिन तक अधिक सोना है । इस धान-तमें उसके गरीब घर कपड़ा दोड़ कर सुथाना चाहिये; बुधा मरसीका रीज सज करके धूममें सुथाना अच्छा है । और इस समय उसके गरीबमें सेब क्या न लगनी चाहिये, पहिले कुछ कुछा गरम सज और बाद ठण्डी प्रथम धान करनेकी आदत डालनी चाहिये; इस तरह धानने से मदीं धाना होनेको कम आता रहने है । धान करने के समय पहिले हिल्टर थोड़ा सज डालना और बाद हिल्टरके लियेना वह कमसेमिथे अच्छी बात है; डा० प्रिंसरमें देखाये कहते हैं ।

जब तक शिशु माता दूध पीता है तब तक प्रसूतिको रातका जागना, देरसे खाना, ज्यादा खटा, तीता चीज खाना, मनमें क्रोध करना इत्यादि मना है ऐसा करनेसे शिशुको नाना प्रकारके रोग होते हैं। सन्तानको रोग होने पर माताको खूब सावधान रहना चाहिये ; नहीं तो सन्तानका रोग बढ़ सकता है ।

यदि माताको रोग हुआ हो या उसके स्तनमें ज्यादा दूध न हो तो घरके किसी स्त्रीका दूध अच्छा होनेमें सन्तानको पिलाना चाहिये ; अगर दूध न मिले तो गदहे या गौका दूध पिलाना चाहिये । गौका दूध गाढ़ा होनेमें, दूधके बराबर पानी मिलाकर और कुछ दूधकी चीनी (sugar of milk) मिलाकर गरम करके सन्तानको पिलाना चाहिये । ज्यादा दूध पिलाना, या ज्यादा रातको पिलाना अथवा सोनेके हान्तमें या जगाकर दूध पिलाना अच्छा नहीं । यदि सन्तानको भूख न हो तो दूध न पिलाना चाहिये ; साधारण रीतसे सन्तानका पेट नरम भालूम हो तो भूख है समझना चाहिये । एकसालतक सन्तानकी स्तन पान कराना चाहिये ।

शिशु आठ दस महीनेमें रंगने लगता है, और एक बरसमें चलना सीखता है ; किन्तु यदि पन्द्रह महीने तक चलन न सके, तो उसको उपयुक्त चिकित्सा करनी चाहिये । सन्ता-

नके सब दांत आने पर, पुराने चावलका खूब नरम भात थोड़ा थोड़ा खिलानेकी आदत डालनी चाहिये ।

मिथकी दवा जसमें न मिलाकर घटिका (Pillules) या घमूवटिका (Globules) मस्तानकी मीवन कराना चाहिये ।

**टीका ।**—मस्तान भूमिष्ट होनेसे एक सालके भीतर गोबीजसे हृषान। यह राजविधि है । जिस जगह पच्छा गोबीज न मिलनेके कारणसे क्षाप नहीं सक्ती तथा चारों तरफ रोग फैला हुआ हो तो ऐसे समय भैक्स्तिनिनाम २०० (जब तक चैक्का जोर रहै तब तक) हर सप्ताहमें मस्तानकी एक बार खिलाना चाहिये ।

**मृतवत् मस्तान ।**—बहुत देरतक प्रसव वेदना या प्रसूतिके जरायु हीघमें मस्तान मृतवत् उत्पन्न होती है । रक्त सञ्चालन यन्त्रकी क्रिया बन्द होनेसे प्रसव प्रसाम बन्द हो जाता है, और मस्तान नहीं आती । ऐसे समय मौसे निम्नि उपायकी करना चाहिये - मस्तान उत्पन्न होने पर उमकी नाभि नाडो न काटकर मूँघ और गलेका रूँघा इत्यादि जन्टी साफ करना चाहिये । तथा नाक पड़नीये दवाकर उमके मूँघमें दम तरह फूँकना चाहिये जि वायु उमके छातीमें प्रवेश हो, और उमकी पजरी एम दवाजा

चाहिये कि वायु छातीमें होकर बाहर निकल जाय । हर मिनटमें १४।१५ बार इन तरह वायु प्रवेश कराने और निकालनेमें, १० मिनटमें सन्तानकी श्वास क्रिया आरम्भमें लगेंगी । यदि दस मिनटमें कुछ फायदा न हो, तब सन्तानके मुख या पेटमें पहिले गरम जलका और पीछे ठण्डा जलका बार-बार छौटा देना चाहिये । और सुखे हाथसे उसका हाथ, पैर और पीठ घिसना; शिशुके मुखमें हवा लगनेमें बाधा न होने पावे ।

शिशुके नाभिका रोग ।—नार काटनेके पांच दिन बाद नाभि सुखकर अलग होजाता है । यदि नाभि न सुखकर रस या मवाद गिरे किम्वा घाव हो जाय, तो नाभि को गरम जलसे धोकर केलेष्टिडला (दन बूंद, एक छटांक सरसोंके तेलमें मिलाकर) को पट्टी नाभिके ऊपर लगाना चाहिये और सिलिका ६ सेवन [ किन्तु मवादमें दुर्गन्ध हो तो मिलिकाके बदले आर्मेनिक ६ देना चाहिये ] । यदि दाह (अर्थात् नाभि नाल होकर फूली हो और टट भौ हो,) तो बेलिडाना ६ या आर्मेनिक ६ देना चाहिये ।

नार अच्छी तरह न बाधनेमें या नारका बन्धन टूट जाने में यदि रक्त बहे, तो हेमोमेलिन्, कपडेल नगाकर रक्त निकालनेके स्थानपर रख छोड़ा दवा रखनेमें रक्तका बहना बन्द हो जाता है, बार-बार इस तरह रक्त बहनेमें आर्मे-

निक ६ सेवन कराना चाहिये । काशना, ज्वादा छाँसी या रोना, पेट दखना इत्यादि कारणोंसे नाभि पर ज्वादा दाब पड़नेसे यदि नाभिका चमक बाहर ( Umbilical hernia ) हो जाय, तो चार्निका ६ या मासफिडरिज-एमिड् ६ सेवन, और रुईकी एक छोटी गद्दीसे नाभिको इस तरह दाबकर बांधना चाहिये कि चमक बाहर न हो सके । मिग प्रायः दुबला होनेसे बेलकेरिया ६ देना चाहिये ।

गौड़ ।—घाव सुखनेके बाद यदि नाभि उंची रहे तो उसके ऊपर रुईकी गद्दी रखकर एक कपड़ेसे बांध देना चाहिये और नक्कलमिका ६ खिजाना चाहिये ।

स्तन न रूँचिना ।—यदि दुर्बलताके कारण मस्तान स्तन न पौ सके तो बसबसे दुध गारकर मस्तानको पिमाना चाहिये, इस तरह दो तीनवार गारकर पिमानेसे मस्तान चामानीसे स्तन रूँचिने लगती है । ऐसा करने पर भी यदि मिग स्तन मुखमें न ये, तो वायना ६ को एक छोटी गोर्मी उसके मुखमें देना चाहिये ।

मस्तानको पोसापन । मस्तान पदा होनेके दो एकदिन बाद कभी कभी उसका गंगर पाव नखला मकेद भाग हलदुआ नख पाया हो जाता है । मासफेरियाम ६ १० ग्राम देना है । कौटुबह होनेसे नक्कलमिका २०





सन्तान स्नान नहीं छोड़ सकती, कमसे बोझार १०१।१० डिग्री हो जाता है और हाथ पैरमें खैचन होकर पीठ टेढ़ी जाती है और मृत्युकी सम्भावना होती है। वेलेडोना ६ इन्च डन्लुष्ट पीपध है। (विशेषकर नाभिमें दाह होनेमें) माता ज्यादा थोकेसे थपथप कोधके कारण दूध खराब हो गया और वह सन्तानको पिलाया जाय और उसमें यह रोग हो। ऐसी दयामें माता और शिशु दोनोंको इन्जेक्शिया ६ दे चाहिये, “धनुष्टकार” देखो।

सन्तानकी हिचकी।—कभी कभी सन्तान हिचकी होती है। कई एक बूंद मिथ्रीका गर्भत १ नक्षत्रमिका १० स्थितानसे हिचकी बन्द होता है।

सर्ही खांसो।—ठण्डा लगनेसे सन्तानके नाक मर्दी भरती है, कभी खांसो या ज्वर भी होता है, कभी नाक बन्द होजाती है, कभी सन्तान हांकने लगती है और रुक नहीं पकड़ सकता। छातीमें मर्दी जमनेसे दूर रहता है मर्दी भरती रहे तो पल्मेटिका ६। नाक बन्द होनेमें स्नान खींच मर्के तो नक्षत्रमिका ६। ठण्डमे भई मर्दी यदि किर्मांमे चण्डी न हो तो मार्कुरियाम् ६। मर्दी गिरनेके सब नाक या घोंठमें घाव होनमे चार्मनिक ६।

सन्तानका नेत्र प्रदाह। भूमिठ होनेके कई एक दिन बाद किर्मां किर्मां सन्तानके नेत्रमें दाह होता है

नैव फूल कर लाल हो जाते हैं, मवाद गिरता है, दोनो पलक मिल जाते हैं और कभी कभी नैवमें घाव तक हो जाता है। इसी तरह घोंड़े दिन मवाद गिरनेसे नैव नष्ट होने की सम्भावना है, इसलिये इसकी पहिलेहीसे चिकित्सा करनी चाहिये। नैवकी पपनी फूली या लाल होनेसे और कभी कभी रक्त बहनेसे बसेडोना है। नैवकी पपनी फूली हो और किनारे फुमरी और ज्यादा मवाद इकट्ठा होता हो तो, मार्क मम् ६। चार्जेन्टाम-नाइंडिक ३, और कैल्शेरिया-कार्ब ६ कभी कभी दर्दकी आवश्यकता पडती है।

तड़का (येहीशो)। शम्भाइल्लामें घादुमएल्लकी बिदा  
महजहामें उतेजित होकर यह रोग होता है ऐसा  
मोग कहते हैं। यह रोग कभी और हिटिरिदाकी  
तरह है। दांत निश्चलनेके समय हान या समान रोग  
बच्ची तरह दर्दके बाहर न निश्चलने, एकाएक  
उंचे परमें गिर जानेके और बिनि दोष होनेके यह रोग होता  
है। ज्वर, बुल्लिरता, निद्राशून्यता, भयमें बालेय पैदा  
हो तो एकी-जार्जट ३। नेत्र और मुखमें ज्वर, एहमारा  
विज्ञात, मन्त्रक मरम, एनकर उठना या उठकर  
उठना इन सब मरममें, दर्दहोना ६ मुखमरम, मरम  
और ज्वर मरममें कल्पन उठ उठ मरम, एह उठ  
उठ उठ मरम, उठ उठ मरम मरम उठ उठ

१०। दांत निकलनेके समय तड़का होनेसे कैमोमिला  
६। हाथ, चेहरेक चप्पड़ी तरह बाहर न निकलनेसे यदि  
कठिन तड़का होय, तो जिह्वा ६ चप्पड़ा है ।

**शिशुकी अनिद्रा ।**—मस्तिष्कमें रक्त अधिक होनेसे  
या रक्त संचयसे, प्रसृतिके अयोग्य भोजनसे या किमि  
रोगसे सन्तानको निद्रा नहीं आती, जिस कारणसे निद्रा नहीं  
आती उसकी चिकित्सा करना उचित है ।

समस्त गरम, बिना सबब ज्यादा रोना, सोनेको चप-  
खामें एकाएक चिन्नाकर रोना ऐसे लक्षणोंमें बिलेडोना  
६। रह रह कर शरीर कोपना, शरीर गरम, चिड़ चिड़ा  
स्वभाव और हमेशा गोदमें लेकर पुमनेकी इच्छामें  
कैमोमिला ६। सन्तान इसे और खेले किन्तु शरीर गरम  
हो, और बीच बीचमें कांसे तो, कफिया ६। प्थर और  
बीच बीचमें भयके कारण चिन्नाकर उठनेसे एकोनाईट  
६। किमि रोगके कारण निद्रा न होनेसे, मिमा १८।  
कोष्ठग्रह होनेके कारण निद्रा न आनेसे नखभमिका ६।  
वे चन्दान भोजन करनेसे या पानी पीनेसे निद्रा न आवे  
तो, पल्मेटिना ६।

**सन्तानका रोना ।**—शिशु रोने हो मे कोई कष्ट  
या रोग समझना चाहिये । किम कारण शिशु रोता है उसकी  
जांच करना जरूरी है, रोनेके समय कानमें हाथ लगावे तो



लक्षणके साथ जिह्वा मादी और सेपयुक्त हो तो पार्लिम-  
मुड ६। इसके साथ दुर्गन्ध मलयुक्त उदरामय होनेमें  
कैल्केरिया कार्य १०। दूधके साथ पित्त या मारके तरह कफ  
गिरनेमें इयिकाक् ६। चरुचि और कीष्ठबद्ध होनेमें,  
मक्ष्मभमिका १०।

**दांतनिकलना ।**—बालकके दांत ६ठें मासमें  
सेकर ८। १० मासमें निकल पाते हैं; पहिले दो मीचेके तरफ  
बाद ऊपरकी तरफ दो, इसी तरह क्रमसे तीन बरसमें  
दूधके सब दांत निकल पाते हैं। ज्वर उदरामय, कीष्ठबद्ध,  
पाक्षेप इत्यादि उपसर्ग दांत निकलनेके समय होते हैं।

इन सब उपसर्गोंमें, कैमोमिला १२ ग्रेठ पोषध है;  
ज्वर होनेमें, एकोनाईट ६। अधिक उदरामय होनेमें, कैमो-  
मिला ६। आमोग्रय होनेमें, मार्क कर ६। कीष्ठबद्ध  
होनेमें, मक्ष्मभमिका १०। तड़का होनेमें, बेलेडोना ६। दांत  
निकलनेमें देर होनेमें, कैल्केरिया कार्य १०। यदि दांत  
गहरी फाड़कर बाहर न निकल सकता हो तो गहरीको धोड़ा  
घीरकर फिर मिला देनेमें दांत जल्दी बाहर निकल  
पाता है।

**छासी (Croup)** पुण्डोंके दो प्रकार—(१) लखिम  
और (२) प्रकृत। लखिम पुण्डो शिशुकी एकाएक



जीमें घार्मेनिक ६ । दांत निकलनेके समय मुखमें घाव, मुख या गिरमें पथीना कठिनमस, पैर ठण्डा होना इत्यादि लक्षणोंमें, कैसकेरिया-कार्य ६ । जीभ फूली और दाहयुक्त हो, दन्तमूलमें घाव और इसी कारणसे रक्त बहता हो, मुखमें दुर्गन्ध हो, मुखसे नार विगेष बहतो हो, घामागधसे तरफ घेचायुक्त घतनामल हो तो, मार्कमन् ६ । मुखमें चारो तरफ फुमरी और मड़ा मस, मुखमें घाव करनेवाली नार बहे तो, एमिड नार्पटिक ६, (पिला माताके पाराके दीपमे, मन्ता-मकी दूरे फुमरीके निधि भी यह उपयोगी है।) मफेड मेप युक्त जिह्वा, मुखमे बड़ी बड़ा फुमरी, मुखमें रक्त मिथो दूरे नार गिरना, गुदाके चारो तरफ फुमरी, निद्राका व्याघात इत्यादि लक्षणोंमें, मन्कर १० ।

**मन्तानिका फोड़ा ।**—कभी कभी मन्तानके गिरमें, गलेमें कानके पीछे, बगलमें बाहुके मथिमें फोड़ा होता है । कैसकेरिया कार्य १० । घाय. घाव (घाँघनाममें अधिक) होनेसे, कार्बी-मित्र १० । घाव चारो तरफ छोटी छोटी फुमरी होनेके कारण मन्तानकी हमेशा मज्जभोक्त हो तो, कैसी-मिना ६ । कानके पीछे कानगुहा घाव, दुर्गन्ध युक्त घाव होकर रक्त बहने और खोटाह होनेसे, नार्कोपटियम १० । मिमें एक्जिन् दो दन्त फोड़ा हो बाट भुमका रस लद कर सप्तरमें अधिक फोड़ा हो तो मन्कर १०, दिपार





पतला मस और हाथ पैर ठण्डा होनेके लक्षणमें कैमोमिला  
 ६। गिणु दस्त होनेके लिये कांयता है यह मेला न निकला  
 वायु भरती है। या बहुत थोड़ा मस निकलनेमें मिना १०  
 उपकारी है। रोज कोई एक वक्त घेठमें ददं होनेमें चायना  
 ६। सड़ा खट्टी गंधका मधुररस पतलादस्त, वमनेच्छा  
 या वमन लक्षणमें इपिकाक ३०। मलवहके मयवमें घेठमें  
 ददं हो तो मसभमिका ३०। भारी भोजन करनेमें कुछ ददंमें  
 गायकादूध पिनाला बन्दकरना चाहिये। कशईनको घोटनो  
 गरमकर नाभिपर मेंक करनेमें ददं चाराम होता है।

**गिगुका उदरामय ।**—गुरुद्वय भोजन, क्रिमि  
 या दांत निकलनेमें बच्चाको उदरामय होता है। यदि  
 ठण्ड लगनेमें उदरामय हो और मासको लवर भी रहे तो  
 एकोनाइट ६ देना चाहिये। गुस्साक भोजनमें हुए उद-  
 रामयमें पन्मटिना ६। दांत पानेके समय चयवा मई  
 लगकर उदरामय होनेमें लामकर बच्चा छेदियाला हो तो  
 कैमोमिला ६। उदरामयके साथ वमन या वमनेच्छा हो तो  
 इपिकाक ६। खट्टी गन्धवृक्ष चटवटा या किनोला अधिक  
 मस और मासको घेठमें ददं करनेमें रिउम ६। (लाम-  
 कर दांत पानेके समयमें) लीचइके भाति दस्त और घ्याम  
 हो तो मार्किंडियाम इपिमिस ६। चायकादस्त और मास  
 हो लून पानेमें मात्रेमस ६। वायवके भोजनके भाति दस्त



नहीं है । यदि पिशाच ३६ घंटे न हो गया शिशु घेनेम हो जाने लगे तो एकानाइट १ दो एक खुराक देना । घेने-जाना ६ कैल्शियम ६ या ओपियम ३० देने की कभी कभी आवश्यक पड़ती है ।

अधिक उमरके बालकोंको कभी कभी पिशाच बन्द हो मुखल्लभां फूल जातो है, बदन गरम और हृदयमें परेशान हो जाता है । पेटमें गरम पानीका भेक देनेमें पिशाच उतरता है । इसमें कायदा न होनेमें "मूत्र प्लाथ", "मूत्रनाश" और "मूत्र रुद्ध" देखो ।

**शिशु-यक्ष्म ।**—कैल्शियम चार्मेनिजम ३० ।—इसकी प्रधान दवा है । आहारके तरफ ध्यान रखना कुशल न होने पावे । इस पुस्तकका "यक्ष्म प्रदाह" देखो छोटे बच्चे का मूत्र गरम कर यक्ष्म में भेक करना अच्छा है । जायों निया ६, मार्शेजिनियम ६, चार्मेनिजम ६, मक्खर ३० की कभी कभी आवश्यक पड़ती है ।

**एक छोर ।**—कभी कभी शिशुका अर नही बूटना । कैल्शियम ३ इसकी बढ़िया दवा है । पाश्चात्यमें गरुड की तेल एन्थ्रैडिमा ६ ; जैम सफेद भेदक होनेमें चार्मेनिजम ३६ ६, त्रिभि होनेमें मिया ६ या व्याइजिनिया ६ ; बदन बहुत गरम, बमक उठना या खल्लःखल्लःजि बसनेमें बमहोना ६ इत्यादि है । कभी कभी रोनेका अर बिमो तरफ

नहीं छूटता, कब्जियत रहना, नाभिके चारों तरफ दर्द, जिनि पेटमें रहे चाहे न रहे तौ भी नाक खुजलाना आदिमें मिना २५—३० ; मिनामें फायदा न हो तो स्याइजेलिया ३१ देना । जल वार्नि आदि लघुपथ देना ; मुखारमें दूध मना है । प्रसूतीके भी खान आहारमें ध्यान रहना चाहिये । “एक स्वर” मलेरिया जनित मधिराम स्वर और “माद्रीपातिक विकार” देखो ।

**तोतलापन ।—(Stammering).**

घामोनियम ६ कुछ दिन खानेमें फायदा होता है ।

**चर्मरोग ।—(Erysipelas.)** ठंड मगना

आदि कारणोंसे शिरके इदनके किमी स्थानमें पहिले सामान्य ज्वर होता है फिर मर्मांड साम रंग हो जाता है, मादरी स्वर, प्रदाहित स्थानका फूल जाकर घाव हो रक्त गिरने लगता है । यह एक जठिन रोग है । बेन्जेडोना ३५, एडिस ६, रोग रक्तक ६ इसकी इदिया दवा है । “डिम्प” देखो ।

**पाना (Eczema) ।—**यह चर्म रोग बहुतों

स्थानोंमें हुआ करता है । यह एक प्रजायकी खुजली है, देखनेमें भी यह खुजली की तरह होता है । इसका रोग जगहोंमें लगकर कुछ स्थानोंमें बड़ा बड़ा हो जाता है, जो

नहीं है । यदि पिशाच ३६ घंटे न हो तथा मित्त वेचन हो रोने लगें तो ऐंकोनाइट ३ दो एक चुराक देना । वेने-डोना ६ कैथारिस ६ या प्योपियम ३० देने की कभी कभी जरूरत पड़ती है ।

अधिक उमरके बालकोंको कभी कभी पिशाच बन्द हो मूत्रस्यन्तो फूल जातों हैं, बदन गरम और दर्दमें परिणाम हो जाता है । पैरुमें गर्म पाथोका मेंक देनेमें पिशाच उतरता है । इसमें फायदा न होनेमें "मूत्र म्नाथ", "मूत्रनाम" और "मूत्र कण्ट" देखो ।

**गिगु-यकृतस् १**—कोलक्रेरिया-थार्जेनिकम ३० ।—इसकी प्रधान दवा है । आहारके तरफ़ ध्यान रखना कुपय्य न होने पावे । इस पुस्तकका "यकृत प्रदाह" देखो छोटे बच्चों का मूत्र गरम कर यकृत में मेंक करना अच्छा है । लायोनिया ६, मार्किउरियाम ६, थार्जेनिकम ६, मलफर ३० को कभी कभी जरूरत पड़ती है ।

**एक ज्वर १**—कभी कभी गिगुका ज्वर नहीं बढ़ता । अल्पमिदिम ३ इसकी बढ़िया दवा है । पाश्चात्यमें गड़बड़ हो ती पल्मिटिका ६ ; जीम मवेद लेपयुक्त होनेमें थान्द्रिम मूड ६, त्रिमि होनेमें मिना ६ या प्वाइजेनिया ६ ; बदन बहुत गरम, चमक उठना या हल्काहल्काके अचलमें बेनेडोना ६ उदकाग है । कभी कभी रोमांका ज्वर त्रिमो तरफमें

नहीं दृष्टा, कइजियत रहना, नाभिके चारो तरफ दर्द,  
जिसे छेदने रहे चाहे न रहे तो भी नाक खुलनामा पाटिने  
मिना ३५—३६ ; मिनासे फायदा न हो तो ब्याइजेनिया ३४  
देना । जल वालि पाटि मध्यम देगा . पुछारमें दूध मन्ना  
है । प्रसूतीमें भी खान पाहारमें ध्यान रहना चाहिये । “एक  
कर” महेरिया जनित सजिराम खर खोर “माद्रीगर्भा  
विकार” देखो ।

तोतलापन । Stammering ).

दामोनियम ६ कुछ दिन खाने में पायदा होता है।

चर्मरोग ।—Erysipelas,)

पादि कारणोंसे शिग्रहें बदलकर किमी दूर हैं  
मान होता है फिर सर्वाङ्ग धाम रंग से  
स्वर, मदाहित स्थानका फल लाकर दान  
है। यह एक कठिन रोग है। ईश्वर  
पौर रम-रुक्म ६ समर्पण दृष्टि दान ६

पासा Eczema) —

सबको दुसा करता है। एक —

भरे फफालेसं मार्किउरियाम ६ चण्णो दवा है ; रोग पुराना होनेमें पेंफाइटिस ६ देना चाहिये ।

**गिगूके बदनका चमड़ा निकलकर घाय होना ।—( Intertrigo )** गिगूका चमड़ा बहुत गरम होता है इसलिये सामान्य कारणसे भी चमड़ा निकलकर घाय हो जाता है । सला जमना, जोरसे बदन धुसनेमें चमड़ा फट जाना आदि कारणोंसे गिगूके कानके पीछे या गर्दन, पहा और बगलका चमड़ा फूल जाता है फिर लाल हो जलनसे माथ रुम गिरता है । कैमोमिला ६ इसका बढ़िया दवा है । फट दायक घाव में खुन निकलने पर मार्किउरियाम जल् ६ चण्णो दवा है । रोग बारबार होनेमें लाक्त्रीयडियाम १२ देना चाहिये ।

**गिगूका सृगीरोग ।—( चण्णार देखो )** चण्णर वह रोग बच्चोंको होता है । कैम्बेरिया काल्म ६ इसको बढ़िया दवा है । रोग पुराना होनेमें बमकर ३० देना चाहिये ; किन्नराम ६, शिउकी ६, निम्बिका ३० देना चाहिये ।

**हृषमांसौ (Whooping Cough) ।—**यह बच्चों को एक बड़ा ब्याधिकास ज्ञाया है, इस खांसो के होनेमें बच्चों मांस में जैसे "हुट" आवाज होता है । यह रोग तीन बार बच्चेमें केहर ३ बारोंमें लख रहता है । बहुत दिन तक





इन्द्रिय मय बेकाम हो गिर गन्धुको प्राप्त होता है। कैल्केरिया ३०, चौर समयपर ३० इसकी बढ़िया दवा है। बेहोगीके साथ पिगाव बन्द होना; बालक पानीके भिनाय और कुछ खानेकी मसाले इस चक्कायमें जैसेबोरम ३ उपकारी है।

**बाल्मास्थि विकृति ( Rickets )** :—गिरुन हड्डी में चुनेका भाग कम रहनेमें हड्डी चपटो तरह तयार न हो कर कोमल, बिगड़, विकृत और पतली होती है। पतला दमा, कपाजमें घसीना, समय पर दांतका न निकलना, हाथ पैरके जोड़ोंमें दर्द, मांसकी हड्डी-फूलकर बड़ी होना और पैंठकी हड्डीका टेढ़ा होना इस रोगका प्रधान लक्षण है। इस रोगमें मोटा बालकको कैल्केरिया कम् ६५ विबूर्न और दुबला बालक को फार्मेनिक ६ देना चाहिये। मिथिका ६ और कम्पकरम ६ समय समय पर उपकारी है। मक्खि मिर्ही पैदा होनेवाले दिग्गमें जवा बदननेके लिये बालकको भिजना अच्छा है। दूध बढ़िया दिजाना उचित है।

**धातु दीप या कुलत्र रोग** :—भीने लिये तीन रोग चक्कर दिना मानात्र दीपमें गिरुकी भोगना पडता है :—  
(१) ज्वर रोग, (२) मंडसाया, (३) उग्रदंश।

१। **युधरोग** । ( Tuberculosis ) पुमपुम, मलिन्य चक्कादि चाहे जिस यन्त्र या तन्त्रमें बालकको ज्वर ( tubercles ) पैदा होता है। यह ज्वर पहिले मटर बराबर

हो फिर कड़ा हो सूट कर घाव होता है, तब यह घाव घुनर या हल्का पीले रंगका हो उसमें असंख्य छोटे छोटे बीड़े (tuberculous bacilli) होजाते हैं। पुनः पुनः घाव होनेसे "फ्यूसिस" (phthisis) रोग पैदा होता है; मस्तिष्कमें होनेसे "तुबरकुलर मेनइंगीटाइस" (tubercular meningitis) रोग पैदा होता है।

फन्फूरीय ६ इस रोगकी प्रधान दवा कहना फन्फूल नहीं है। मिय अत्यन्त दुर्बल या रक्तहीन होनेसे कैल्शेरिया-फन्फूरिका ६५ शुरू देना चाहिये। मुखसे खून बहने या नाकसे खून गिरना, ज्वर, कठुकाहने रहना न निकलना आदि लक्षणोंमें फेरान-फूस ६५ या ६ अच्छा है। ज्वर, पतना, दस्त, बेहोशी, खांसी (सबेर और शामकी दृष्टि) पुनः पुनः तीव्र दर्द (हिलने होलनेसे बढ़ना) आदि लक्षणोंमें फार्मेनिक ६, हियार सल्फर ६, सिलिका ३०, मलफर ३०, साइकोपेडियाम १२ और साइपोडियम ६ कमय कमय पर बरत पड़ती है। कैमिलियामटिड्यारकिडिलियाम और साइरोमिनियाम देकर डाक्टर किमारकी कोई सलाह नहीं हुआ।

पुष्टिकर आहार, विविध वायु लेवन, सुखे और नखे बीड़े मजानमें रहना आदि स्वास्थ्यविधि धालन करना चाहिये।

रोगमें उपकारी है, चर्मरोगकी दवा देनेमें कोई ग्राही फल पानेकी आशा नहीं है ।

धार्मिक-आत्मव्रत. १० ( या धार्मिक-चारयोडियाम ६५ बूने) कई हफ्ते बिमार्गमें रोग धीरे धीरे चाराम होजाता है । यदि बहुत दिन तक धार्मिक देने पर भी कायदा मानुस न हो तो ( खास कर छाती धक्कड़ करना और खास परागमें बाधा पड़नेकी जानकारीमें ) कमकरम ६ देनेमें फलर गुण दिखाई देता है । चिटिरिया ( मूत्रां ) पक्ष दुर्गता क्षियां ध्वज रोगमें रूमिया ६ पच्छी दवा है । मलदा १०, घृता ६, कैमजरिया कार्य ६, कैमजरिया कम ६५ बूने, पार्ण्डम टाट ६, त्रिहम ६, पोर रम-टम ६ समय समय पर काममें आता है । उपरम जगनेकी कोई दवा की जरूरत नहीं है ; लेकिन बकुचो दाना, पोषण पेड़की जड़ बड़बड़े मूलमें पोष कर भेज देनेमें एक बाधकता ध्वज रोग जमाने अच्छा किया या लेकिन पाठ सर्वज्ञ बाद फिर उसकी "ध्वज" दिखाई दिया ।

बालककी श्वेत भुज नीचे और हजम करनेकी ताकत बढ़े दिया रूमिया करना चाहिए । दूध, कई निमर पदम, पेटोनिम रूममदन, मोटा पका कम और पुटिकर पापरा ( त्रिमर्ष खाद और रज पेदा हो ) कराना, घाल्यकर पकाही जगद या मदीके शिवाय पाद दवा बदनमें निध कुडदिन दवा रहना अच्छा है । रोग रोगकी मिही मराना



**चोट ।**—कटकर, घिसकर, चिरकर, कुचनकर, मुरककर आदि कई प्रकारमें चोट है। चोटमें चमड़ा फटकर फोड़ा या घाव होता है।

**चिकित्सा ।**—चोटमें खून जाना बन्द करना चाहिये चोटका मुँह उपरकर ठंडा पानी या बरफकी पट्टी रखनेमें फायदा होता है। चोट नमकर घाव होनेसे चार्निका ० एक ड्राम एक चौन्स पानीमें मिलाकर इसी पानीमें कपड़ा भिगो कर पट्टी रखना। भोयर चमड़े के घावमें चार्निका बहुत उपकारी है। तेज चमड़ेका घाव या बारदसे जल कर हुआ घाव कैलेण्डियुलाका मूल चर्क ३० बूँद एक चौन्स पानीमें मिलाकर उपर लिखे अनुसार पट्टी लगाना। घाव होकर पौर पौर लक्षण प्रकाश होने पर नीचे लिखी दवायें देवन करना चाहिये। ज्वर, शीत, प्यास, चवड़ाहट, मृत्युभय और मस्तक गरम होनेसे एकोनाइट ३५। एक जगह चोट लगाकर सर्वाङ्गमें दर्द होनेसे चार्निका ६, चोट लगकर अधिक खून जानेसे कुर्र नाताकलीमें चायना ६ या चार्मेनिक ६, देना चाहिये। चोटमें चीनी या मद्यक पूर्ण लगा कर बांधनेसे खून बन्द हो चोट धाराम होता है।

**माथेमें चोट ।**—यदि चमड़ा न फटे तो उपर लिखे अनुसार चार्निकाकी पट्टी लगाना, यदि फट जाय तब कैलेण्डियुला ६० बूँद एक छटाक पानीमें मिलाकर पट्टी



हो और वह स्थान कामा हो तो हैमामित्तिम ० एक भाग पानीमें मिलाकर चार्बिकाके तरह पट्टी लगाना चाहिये । पीप पैदा होनेकी सम्भावना हो तो द्विपार मलफर १० । सड़ने लगे तो थामेनिक १० और माइनिमिया १० ।

**सवारो पर चलनेके समयका यमन ।—**

गाड़ी, पास्की, रेल, जहाज आदिकी सवारीमें किसी किसीकी प्रति कष्टकर यमन होता है, "कन्जिउमन" इसकी बहुत बढ़िया दवा है ।

**फोड़ोका काटना ।—**बरे, बड़का, बिच्छू आदि काटनेमें, काटे हुये स्थानके जहरको पहिले खुरीमें निकाल लेना, फिर स्पिरिट कैम्फर चयवा मरमीका तेल या कैरोलिन तेल या तमाखू या पियाज काटकर लगाना, ज्यादा फूलनेमें एपिस ६ पिमाना । गुयाकौड़ा लगनेमें गुजरका घटा घिसकर चूना लगा देना । मक्कड़ीके जहरमें घी और ममक फेट कर लगानेमें उपकार होता है । चूड़ा काटे तो लंडाम ६ घिमाना चाहिये । कूत्ता, गीदड़ आदि काटे तो मोहा गरम कर दागना और दामोनिका १५ कई गुराक पिमाना चाहिये । बिच्छूका त्रिष भूषण या घुइयाका रस लगानेमें दूर जाता है ।

**उदामरोध ।—**पानीमें डूबने, कामों लगाने, जहरीली





छटांक पानीमें मिलाकर चाँख पर पड़ी बांधे; खाली पानीमें चाँख न धोवे, चाँख खराब हो सकती है ।

कौड़ा काममें घुमनेमें, तैल गरम करके कानमें डाल देनेमें कौड़ा मर जाता है । गुठली या घीर कोई छोटी वस्तु कानमें घुस जानेमें मरधान पूर्वक चमीटी द्वारा बाहर निकाला होगा ।

**सर्प दंशन ।**—घाँपक काटनेकी पर काटे हुई ग्लानके कुछ ऊपर रक्ती ( डोरी ) चयवा कपड़ेमें मजबूत एक धागा बांधे; बंधन इस तरह होना चाहिये, जिसमें बंधनके नीचे रक्तका आना जाना न होमर्ने । ( तथापि जाड़ी जिसमें न मिले ) तत्पश्चात् चाकू या घीर कोई तीव्र चक्रेमें जिस जिस जगह दाँतीका घाव है, उस पर दो दस नब्बे घीर बांध दसो महरा घीरकर दोनी तरफ चक्रेकीमें थोड़ा र र्क्षिचकर छोड दो । इस जगहमें विष रहनेमें, वहाँमें लाल पानीमा पतला निजमेगा ( अधिक रक्त गिरनेमें दोनी तरफमें घीर घीर दाव देनेमें लौड बन्द होगा ) तत्पश्चात् तीन घेन चन्दान्न पार्माइनेट-चब-पटाम ३५० वून, पानीमें मिला कर काटे हुई ग्लान पर चन्दो तरह विभे; इस प्रकार कई मिनिट जिसनेमें वह जगह कायो हो जायगी । तत्पश्चात् दमनके ग्लान पर चन्दो तरह ऊपड़ा लपेट कर बांध देने चोर ऊपरके धागाको चमक कर दे रोतीकी इस तरह देस देखर बेठा कर रखना चाहिये, जिसमें वह



बन्ध होजाना, हृदय रोग, पानीकी तरह दस्त या डरा और काले रंगका जलनयुक्त दस्त, बौच बौचमें वमन, अतिमार वा हैजा, (विमूचिका) मूत्रिकाञ्जर, पाकस्थलीमें चमड़ा जलन-युक्त वेदना, पियाम, बारंबार थोड़ा थोड़ा पानी पीनेकी इच्छा । पाकस्थलीमें चत, त्वकमें जलन सहित खुजली और खुजलानेमें छपरकी छानका उठना, मुखमें चारों तरफ जलन सहित खुजनाइट, इसी खुजनाइटमें सादा पानी का निक्षलमा ; पुराने भविराम ज्वरमें कुनैन लाभदायक न होने पर वा कुनैनके अधिक काममें नानेसे जलन होकर साँधोंमें पोड़ा होना, शोथ, पुराना मड़ा घाव ; अनिद्रा ; रात स्वल्प होना ; सायुका शून्य, जीवन की शक्तिका कम होना ; शरीरकी सब कारक रोग समूहोंका होना आदिमें ।

**एकोनाइट ।**—भावा और पीठकी रंगों पर इसकी प्रधान किया होती है । प्रदाहमें उत्पन्न बुधा ज्वर ; प्रायः सब प्रकारके नये रोग ; न्यूमोनियाके पहिली अवस्थामें ज्वरके साथ शीतलाका होना, सर्दी, हाम, सूखी खाँसी, कुकर खाँसी, तरुणवात, गठिया वात, बहुत पियाम, शरीरका मुखना और गरम होना, उद्देगवित्त, नाडीका कठिन, तीक्ष्ण, और पुणता, मुखमण्डलका जाल होना, भ्रमके घाने जानेमें कठिनता, पेशाबका माल होना, रुदकप, रजका रुक जाना ।



**क्यासीमिला ।**—छायुमण्डनी, यज्ञत, पाकायय और दैहिक भिक्षीके ऊपर इसकी प्रधान क्रिया है । बालकी के दांत निकलनेके समयके रोग यथा ।—पीना और हरे रंगका दस्त होना, तड़का, पतला छिड़ड़ा मम, सड़े घण्टेके तरह दुर्गन्धयुक्त पतला दूरा और पीले रंगका घाव मर्दित मल, दांत उठनेके समय अत्यन्त कष्ट, पेटमें कैचीमें काटनेके दर्द होना, दांत उठनेके समय एक तरफका गाल गरम और लाल होना और कष्टदायक अस्थिरता होनी । गलेमें सूजन और उसके साथ सामान्य ज्वर, गरम जल पीनेमें दांतोंकी पीड़ाका बढ़ना, छायागून, चतुके समय रक्त लालाके समान और कासा, गर्भावस्थामें स्त्रीमार्गोंके चङ्कना पकड़ना, बालक सदैव चिड़चिड़ापन और खोदेहीमें क्रोध करना, गोदीमें लेकर चलने फिरनेमें दर्द कम होना ।

**चायना ।**—अधिकी छायागून पर इसकी प्रधान क्रिया है । पसीना, रक्त अल्पता, रक्तमें जलियां अधिक, दुर्बलता, उदरामय, यज्ञत और ग्रीहामें रक्त मध्यके हेतु विटर्षि, मलेरियामें उत्पन्नभया सविराम ज्वर । ( जिम ज्वरमें शीत, गर्मी और पसीना स्पष्टरूपसे जान पड़ता है ) ; सूजन, भयानक भूख, माया चढ़कर माथेमें दर्द मानो, माया फटा जाता है ऐसा जान पड़े, पेट फूलना, दुर्बल करनेवाला स्वप्नदोष, अधिक स्त्रीप्रसङ्गमें ध्वजभङ्ग, शरीरमें अधिक रक्त और गूँकका गिरना वा दूधके गिरनेमें दौर्बल्य ।



बूंद बूंद पेशाबका गिरना, मूत्रस्थानमें पचाघात, यकृतकी पीड़ा, शराब पीनेके हेतु जिनके हाथ पांवमें कम्प हो ।

**नेट्रिस मिउरियटिकस ।**—रक्त, अमिकामण्डल, परिपाकस्थलकी शैथिल्य भिक्षी, यकृत और ग्रीहाने ऊपर इसकी प्रधान क्रिया होती है । अनिवाय्य विषम ज्वर, अधिक मात्रामें कुनेल वा भंखियाका अपष्यवहारसे उत्पन्न ज्वर, शीर्षता, रक्त खल्यता, दस्तकज, ग्रीह, और यकृतका बढ़ना, प्रमेह, श्वेतप्रदर, मर्दों, नाकसे रक्त गिरना, ज्वरदूटा, कड़ुआ वा नुनखरा खाद भयवा फीका मुख रहना ।

**पलसेटिला ।**—शरीरका शैथिल्य भिक्षी, अद्विज भिक्षी, शिरा, शोष्ण, कान और जननेन्द्रिय पर इसकी प्रधान क्रिया है । गरिष्ठ वस्तु खाने पीनेके कारण चर्मीर्ण, जीभ, सफेद वा पीले मैलसे भरी, पित्त और कफका वमन, छड़ी टकार, छाती जलना, श्वास सहित पेट पीड़ा, ह्राम, शीतला, कानकी पीड़ा, कानमें पीप बढ़ना, वात, गठिया वात, खल्य विराम ज्वर, माथामें शीतलगना, उसीके साथ नाकसे गाढ़ा कफ गिरना, आँखोंमें कौचर आना, ह्रामके पश्चात् अधिकता, अममयमें मामिक चतु होना, चतुका रक्त असलसा और काला, पोंडाके साथ चतु होना, श्वेत प्रदर, अण्डकोष में जनन, चतुका बढ़ होना, प्रमेह, पसल पाडा होनेके समय खिलाने शीघ्र लडकेका भूमिष्ठ होना और शून्य शरीर दूमकर





और हृणकी प्रथमावस्थामें) स्रायुशूल, जन्तातड़, चामरक्त, स्वल्प रज, अति रज, पसव वेदना, खांसी, चारक ज्वर, धिमर्प, कौडा, मन्दास आदि रोगमें ब्रेलेडोना व्यवहार होता है। किसी तरहका दर्द चकम्मात होकर चकम्मात उपशम होना, ब्रेलेडोनाका एक विशेष लक्षण है।

**ब्राइचीनिया ।**—पुमपुमवेष्ट, मस्तिष्क, और यकृतके ऊपर इसकी प्रधान क्रिया। वायुनासीमें जलन, पुमपुममें जलन, ( प्रथमावस्थामें ) वक्षस्वन्ममें शीत लगनेमें दर्द, ( खांसे और सांस लेनेमें ही दर्द होना ), सूखी खांसी, गठिया वात, ( त्रिमेघकर हिलने डुलनेसे कष्ट हो ), कमर वात, वातज ज्वर, न्यासा, पित्तसे ज्वर, और माथेमें दर्द, पित्त वमन, छातीमें जलन, कड़वी टकार, दस्त-काज, धिरधिरा मित्राज, अनुकल्प रज और मूत्रिका ज्वरमें, सूई गड़ने वा कटनेके समान दर्द होना, और हिलने डुलने से रोगकी हडि ब्राइचीनिया प्रयोगका प्रधान लक्षण है।

**भैराट्टम आलवम ।**—मस्तिष्क और पीठके स्रायु मंडलके ऊपर इसकी प्रधान क्रिया समझी जाती है। हैजा ( आलवमके धोमसा पतना अधिक रीतिमें दस्त और वमन ), सब पद ठंडा, पाचिप, शूल, कमजोरीके साथ ठंडा पसीना, स्रायुशक्तिकी सुप्ती प्रलाप और उन्माद रोगमें, जामचलाना वा वमनके साथ "निनाटमें ठंडा पसीना" और कठिन दर्द इसके प्रयोग करनेका प्रधान लक्षण है।







यमे छाया और पेयीकी ( रंगों ) उत्तेजना हो,  
( Irritation ) ।

उपादान ।—जिम जिम वस्तुमें कोई पदार्थ गठित हो,  
( Ingredients ) ।

जीवाणु ।—नयनातीत चति सुदृ पानी, अणुबीक्षण यन्त्रकी  
सहायतासे मलेरिया, डेग, हैजा आदि रोगोंमें  
इन्हे रक्तमें संचरण करते देखा जाय इस निम्न  
इसे रोगोत्पादक कहते हैं, ( Bacti ) ।

भित्री ।—नरम पारीक जालके समान स्पर्श टकना, ( Mem-  
brane ) ।

पीड़िका ।—बुल, फोड़ा, पुनमी ।

पूर्ववर्ती कारण ।—किसी पीड़ाके गठनका कारण, ( Predi-  
sposing cause ) ।

प्रदाह ।—जीव शरीरके किसी अङ्गमें वेदना ( जलन इत्यादि )  
युक्त, उत्तप्त, चारल या मूजन होना, ( Inflamma-  
tion ) यथा ।—पाव कटने, हाथ टूटने पर उंगली  
में कौन धुमने पर गर्दनमें फोड़ा होनेमें जलन  
होता है ।

विधान ।—शरीर यन्त्रका निर्माण वा गठन, ( Structure ) ।

विधान तन्तु ।—जीवदेहके गठनेके उपयोगी सूत्रके समान  
उपादान समूह, ( Tissue ) ।

रक्तमस्य ।—जीवदंष्ट्रकं किमी म्यानमें वा दन्तमें अधिक रधिर  
का एवतित होना, ( Congestion ) ।

रक्तमस्य ।—जीवदंष्ट्रकं किमी चट्टमें अधिक प्रमाणमें दार  
शीघ्रता पूर्वक रक्तका चमना, ( Determination  
of Blood ) ।

स्पर्शक्रामक ।—दूनेमें लगना, ( Contagious ) ।

इति ।



